

01. Bourgui, 6.408

1250, - les 6 vol. compl.

6-NOON

290



53.05 (0.068)

LEÇONS DE PHYSIQUE

EXPÉRIMENTALE.

Par M. l'Abbé NOLLET, de l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, de l'Inftitut de Bologne, Maître de Physique des Enfans de France, Professeur Royal de Physique Expérimentale au College de Navarre, & à la nouvelle École d'Artillerie de la Fere.

TOME PREMIER.

CINQUIEME ÉDITION.



A PARIS,


Chez Hippolyte-Louis Guerin, & Louis-François Delatour, rue S. Jacques, à S. Thomas d'Aquin.

M. DCC. LIX. [1759]

Avec Approbation & Privilege du Roi;

4002631

Axo 51





A

MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.



ONSEIGNEUR,

Ayant conçu le dessein d'écrire & de donner au Public les Leçons de Physique expérimentale que je fais de vive voix depuis plusieurs Tome I.

EPITRE.

années, pourrois-je les lui offrir dans une circonstance plus heureuse que celle où Vous voulez bien les honorer de votre présence & de votre attention? En mettant au jour cet Ouvrage, je suis dispensé maintenant de vanter l'utilité de son objet, & d'en faire connoître la dignité; l'une & l'autre sont prouvées, dès que cet objet est de votre goût, & qu'il a été approuvé par le sage Conseil qui régle vos études: un tel exemple apprendroit, si l'on ne le sçavoit pas, que la connoissance des effets naturels convient à tous les états; on pourroit en conclure aussi qu'elle convient à tous les âges, si vous n'aviez fait que des progrès ordinaires dans les autres sciences, & si l'on ignoroit les preuves que

EPITRE.

vous avez données d'un génie prématuré.

Depuis dix ans que je travaille à former & à perfectionner une Ecole de Physique, ce qui a le plus animé & soutenu mon zèle dans cette laborieuse entreprise, c'est, MONSEIGNEUR, de m'être flatté que je pourrois un jour vous en offrir les fruits; je touche ensin au terme de mes désurs & de mes espérances; vos ordres m'appellent. *

Le Public qui apprendra mon bonheur par cette Epître, verra fans doute avec plaisir, qu'en faisant usage de mes foibles talens, vous honorez de vos regards

^{*}La premiere édition de cet Ouvrage fut faite en 1743. lorsque l'Auteur fut appellé à la Cour pour donner des Leçons de Physique à Monsteur le Dauphin.

EPITRE.

O de vos faveurs un établissement auquel il a bien voulu applaudir; O tout le monde sentira comme moi-même, combien je suis heureux d'avoir une occasion si favorable d'exercer mon zèle, O de donner un témoignage public de l'attachement inviolable, O du profond respect avec lesquels je dois O je veux être toute ma vie,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble, très-obéiffant, & très-fidéle Serviteur, J. A. NOLLET.



PREFACE.

NE science qui n'embrasse que des questions frivoles, ou qui ne termine celles qui paroissent être de quelque importance que par des probabilités, & en s'appuyant sur des hypothèses, n'intéresse ordinairement qu'un petit nombre d'esprits; il est rare qu'on y prenne goût, & le tems ne peut guère en étendre les limites, s'il n'en réforme l'objet; parce que le désir de sçavoir, qui naît avec nous, & qui peut seul exciter notre attention, nous porte naturellement vers le vrai, & ne peut nous y fixer que quand nous y prenons quelque intérêt.

vj PREFACE.

L'histoire de la Physique, si l'on se rappelle les révolutions qu'elle a éprouvées, est très-capable de justifier cette réslexion.

Pendant près de vingt siécles; cette science n'a été presque autre chose qu'un vain assemblage de systèmes appuyés les uns sur les autres, & assez souvent opposés entre eux. Chaque Philosophe se croyant en droit d'élever un pareil édifice à sa mémoire, s'est efforcé de l'établir sur les ruines de ceux qui l'avoient précédé; de tems en tems l'on a vu qu'une vraisemblance en essaçoit cent autres.

Ces exemples tant de fois renouvellés, ne devoient pas donner beaucoup de crédit aux opinions philosophiques; l'effet le plus naturel qu'on devoit en at-

PREFACE.

tendre, & qu'ils ont eu, c'étoit de tenir les hommes dans la défiance sur la doctrine des Physiciens; & l'on ne doit pas être surpris que leur curiosité n'ait été que médiocrement piquée par des connoissances où ils voyoient régner tant d'incertitudes. L'obscurité du langage a dû les rebuter encore plus. Dans ces tems de barbarie, comme si les sciences rougissant de leur état, n'eufsent osé se montrer à découvert, ceux qui faisoient profession de les posséder, affectoient des expressions qui n'offroient que des idées confuses, & dont la plûpart étoient absolument inintelligibles pour quiconque n'étoit pas encore convenu de s'en contenter. On donnoit pour des explications certains mots vuides de

viij PREFACE.

sens, qui s'étoient introduits sous les auspices de quelque nom célébre, & qu'une docilité mal entendue avoit fait recevoir, mais dont un esprit raisonnable ne pouvoit tirer aucune lumière.

Enfin la Physique si mal cultivée jusqu'alors, & si peu connue, parut au grand jour, & se sit goûter lorsqu'elle offrit des découvertes utiles, des vérités évidentes, lorsqu'elle put se faire honneur d'être entendue de tout le monde. Descartes, son premier réformateur, après l'avoir tirée de l'obscurité des Ecoles, où elle avoit vieilli fous l'autorité d'Aristote, ne lui laissa, pour ainsi dire, que le nom qu'elle avoit coutume de porter, & la rendit telle que les Ecoles réformées ellesmêmes peu à peu, ont adopté

depuis ce qu'elle a reçu de nouveau, & l'enseignent présentement en termes intelligibles.

Cette réforme porta principalement sur la manière d'étudier la Nature. Au lieu de la deviner, comme on prétendoit l'avoir fait jusqu'alors, en lui prêtant autant d'intentions & de vertus particuliéres, qu'il se présentoit de phénoménes à expliquer; on prit le parti de l'interroger par l'expérience, d'étudier son secret par des observations assidues & bien méditées, & l'on se fit une loi de n'admettre au rang des connoiffances, que ce qui paroîtroit évidemment vrai. La nouvelle méthode fit de véritables Sçavans; & leurs découvertes excitant de toutes parts l'attention & la curiosité, on vit naître des amateurs

PREFACE.

de tout sexe & de toute condition.

Le goût de la Physique devenu presque général, fit souhaiter qu'on en mît les principes à la portée de tout le monde. Bientôt on vit paroître en différentes Langues des Traités élémentaires, qui remplirent à cet égard les défirs du Public. Mais la science dont ils traitent, se persectionne tous les jours; les découvertes se multiplient, les erreurs se corrigent, les doutes s'éclaircissent : les mêmes motifs qui ont fait écrire ces élémens, doivent porter à les renouveller de tems en tems, pour y faire entrer les augmentations, les corrections, les éclaircissemens qui intéressent nécessairement ceux qu'une louable curiofité rend attentifs aux pro-

grès de cette science. D'ailleurs il est à propos que ces sortes d'ouvrages soient proportionnés au génie & à la portée des personnes à qui on les destine: j'en connois d'excellens en ce genre qui réussissent en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, & qui, s'ils étoient traduits dans notre Langue, n'auroient peut-être pas un aussi grand nombre de Lecteurs en France, parce que les principes y sont serrés, & qu'il faut, pour les entendre, une attention trop suivie de la part de ceux qui ne voudroient que s'amuser utilement; & parce qu'on y a employé plus de géométrie que les gens du monde n'en sçavent communément.

Il y a environ cinq ans, que publiant le Programme de mon

Cours de Physique expérimentale, je rendis compte de la maniére dont j'avois formé cet établisfement, & des progrès qu'il avoit faits depuis sa naissance. J'offris alors ce petit volume au Public, comme une Table * des matiéres que je me proposois de rassembler dans un Ouvrage plus considérable, pour lui être présenté, s'il continuoit de m'accorder ses suffrages, & si j'avois lieu de me flatter que mes leçons fussent encore de son goût. Cette condition a été remplie au-delà de mes vœux: lorsque je la fis, c'étoit un motif, & en même tems une régle que je prescrivois à mon zèle; mais je ne regardois alors qu'autour de moi; attentif au ju-

^{*} Programme, ou idée générale d'un Cours de Physique, dans la Préf. p. xxxIII.

gement qu'on porteroit de mes efforts & de leurs succès, je n'étendois pas mes vues plus loin que l'enceinte de Paris. Je ne présumois pas que mes foibles talens se feroient connoître audelà des Alpes; * & que j'aurois l'honneur de les aller exercer dans une Cour étrangère.

Je ne préfumois pas que mon Ecole feroit non-feulement applaudie, mais imitée dans nos Provinces * * par les Colléges,

^{*} En 1739. je fus appellé à la Cour de Turin, où je restai plus de six mois pour donner des Leçons de Physique à S. A. R. Monseigneur le Duc de Savoye. Après quoi le Roi de Sardaigne sit placer à l'Université tous les instrumens que j'avois portés, afin que les Professeurs pussent s'en servir dans la suite pour cultiver & pour enseigner la Physique par voie d'expérience.

^{**} Depuis la publication de mon Programme, plusieurs Colléges des Jésuites, des PP. de l'Oratoire, de la Doctrine Chrétienne, & de Saint Lazare, se sont mis dans l'usage de représenter les preuves d'expérience dans

par les Universités, par les Académies même. Enfin je ne préfumois pas que nos Princes honoreroient * mes Cours & de leur présence, & de leur attention; qu'ils voudroient bien unir leur voix à celle du Public, & que l'épreuve qu'ils feroient de ma maniére d'enseigner, me vaudroit ensin l'honneur de travailler sous les yeux & pour l'utilité de

les exercices publics.

L'Université de Reims en use de même; & j'y ai envoyé une collection d'instrumens qui

est déja très-considérable.

L'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Bordeaux, s'est aussi meublé depuis quelques années un beau Cabinet de Machines & d'Instrumens de Physique, dont elle m'a fait l'honneur de consier l'exécu-

tion à mes soins.

* En 1738. Monseigneur le Duc de Penthièvre voulut voir un de mes Cours de Physique, auquel S. A. S. assista avec beaucoup d'assiduité & d'attention; peu de tems après j'eus l'honneur d'en faire un à Versailles pour S. A. S. Monseigneur le Duc de Chartres, à la clôture de ses études.

PREFACE.

XV

Monseigneur le Dauphin. Ce dernier avantage excitoit mon zèle; mais je le désirois plus alors que je n'osois l'espérer.

Ces événemens que je ne rappelle point ici par un fentiment de vanité, quoiqu'ils soient bien capables d'en inspirer, m'assurent en quelque sorte du succès de mon entreprise, & de l'approbation que l'on veut bien lui continuer. C'est donc pour m'acquitter de la promesse que j'ai faite sous cette condition, que je publie aujourd'hui cet Ouvrage. Je ne m'excuserai pas d'en avoir différé cinq ans l'impression; si j'ai quelque reproche à craindre, c'est peut-être de l'avoir donné trop tôt; car s'il est tel que je le fouhaite, les personnes à qui je le destine, ne me sçauront pas

xvj PREFACE.
mauvais gré d'y avoir employé
tout le tems qu'il me falloit pour

le rendre digne d'elles.

Le titre de l'Ouvrage annonce ce qu'il est; ce sont mes Lecons telles que j'ai coutume de les faire depuis neuf ans, à des Compagnies qui s'affemblent pour les prendre en commun. Je suppose toujours que le plus grand nombre n'est pas en état d'entendre les expressions d'Algébre ou de Géométrie, & certains détails qui s'écartent trop des premiers principes; je pense aussi que l'utilité qu'on en peut attendre, ne seroit point appercue par ceux qui ne font que s'initier, ou qui ont résolu de ne donner à cette étude que des momens de récréation, qui ne prennent rien sur des occupations plus

PREFACE. xvij
plus nécessaires relativement à
leur état ou à leur goût. C'est
pourquoi, plus occupé du soin
de me faire entendre, que du reproche qu'on me pourroit faire
d'avoir abandonné le langage des
Sciences dont il est assez ordinaire de se parer, je tâche de parler
& d'écrire comme ont fait avant
moi quantité d'Auteurs reconnus
pour bons, & dont les Ouvrages
pour la plûpart peuvent être mis
entre les mains de tout le monde.

Ce n'est pas que je n'estime, comme on le doit, ces saçons de s'exprimer qui sont certainement plus précises, plus abrégées, & qui mettent en état de suivre plus loin une grande partie des connoissances qui sont l'objet de mes Leçons; je m'en sers même sort utilement, lorsque je travaille en Tome I.

xviij PREFACE.

particulier avec des personnes qui veulent faire une étude plus férieuse de la Physique, & qui s'y sont préparées par celle des Mathématiques; mais ayant égard au plus grand nombre de mes Lecteurs, je n'ai pas cru qu'il fût à propos de faire entrer dans le même Ouvrage ces calculs & ces détails, dont ils pourront absolument fe passer, & qui exigeroient d'eux plus d'efforts & d'application qu'on ne peut, ou qu'on ne doit en attendre ; j'ai mieux aimé les réserver pour des volumes séparés, que je pourrai donner dans la suite par forme de Supplémens, & fous le titre d'Annotations.

Quoique je me sois abstenu d'employer aucune expression d'Algébre, aucun signe de Géométrie, par ménagement pour le

PREFACE.

XIX Lecteur à qui ce langage ne seroit point affez familier; je n'ai pourtant point porté ces sortes d'égards jusqu'à m'interdire l'usage des termes confacrés; j'ai conformé ma diction à celle qui est généralement reçue, afin que la lecture de mon Ouvrage puisse servir d'introduction à celle des autres Livres de Physique; mais j'ai eu soin de distinguer ces mots par le caractère italique, la premiere fois qu'ils sont employés, de les définir & de les expliquer le plus nettement qu'il m'a été possible. Et pour ne point interrompre aufsi le discours par des définitions trop fréquentes, & qui seroient inutiles pour quantité de personnes, j'ai mis à la tête de ce premier Volume un petit Dictionnaire & une Planche où les Com-

bij

mençans trouveront l'explication des termes qui se rencontrent sréquemment dans le cours de l'Ouvrage, & que j'ai supposé être connus du plus grand nombre.

Je ne me présente ici sous les auspices d'aucun Philosophe; ce n'est ni la Physique de Descartes, ni celle de Newton, ni celle de Leibnitz, que je me suis prescrit de suivre particuliérement; c'est, sans aucune préférence personnelle, & fans distinction de nom, celle qu'un accord général & des faits suffisamment constatés me paroissent avoir folidement établie. Pénétré de respect, & même de reconnoissance pour les grands hommes qui nous ont fait part de leurs penfées, & qui nous ont enrichis de leurs découvertes, de quelque Nation qu'ils soient, &

PREFACE.

dans quelque tems qu'ils aient vécu, j'admire leur génie jusques dans leurs erreurs, & je me fais un devoir de leur rendre l'honneur qui leur est dû; mais je n'admets rien sur leur parole, s'il n'est frappé au coin de l'expérience ou démontré selon les régles; en matière de Physique, on ne doit point être esclave de l'autorité; on devroit l'être encore moins de ses propres préjugés, reconnoître la vérité par-tout où elle se montre, & ne point affecter d'être Newtonien à Paris, & Cartésien à Londres.

Pour me renfermer plus exactement dans les bornes de mon Titre, je me suis dispensé de rapporter les différens systèmes qui ont été proposés sur le méchanisme de l'Univers, & qui ont partagé les Philosophes tant anciens

xxij PREFACE.

que modernes. Quoiqu'on puisse absolument ignorer tous ces efforts d'imagination, qui pour la plûpart, ne font point affez d'honneur à l'esprit humain, & dont le plus beau ne peut passer que pour un ingénieux peut-être; cependant on ne peut guère se refuser la connoissance de ceux qui ont eu le plus de crédit, & je rapporterois volontiers ici ce qu'ont penfé Descartes & Newton à cet égard, si je n'avois été prévenu par un Auteur, dont l'Ouvrage * est entre les mains de tout le monde, & qui a traité cette matiere avec le même agrément qu'on rencontre dans tous ses écrits.

C'est encore pour ne point passer au-delà d'une Physique sensible & appuyée sur des faits, que * Hist. du Ciel, Liv. 2. processes de la Vérité.

J'ai suivi, en écrivant mes Leçons, la même méthode que j'ai coutume d'employer quand je les fais de vive voix. Je choisis dans chaque matière ce qu'il y a de plus intéressant, de plus nouveau, & qui me paroît le plus propre à être prouvé par des expériences. J'explique, avec le plus de précision & de netteté qu'il m'est possible, l'état de la question, j'en rappelle l'origine, & j'indique, autant que

xxiv PREFACE.

je le sçais, les Auteurs qui passent pour l'avoir traitée avec le plus de succès : je la prouve ensuite par des opérations dont je fais connoître le méchanisme, ayant foin d'en écarter tout ce qui pourroit s'y mêler d'étranger, pour ne point partager l'attention. Enfin je raméne, soit à la question même, soit aux faits qui m'ont servi de preuves, tout ce qui peut y avoir rapport dans les Phénoménes de la nature, dans les procédés des Arts, dans les machines le plus en usage pour les commodités de la vie civile. C'est ainsi que j'en ai toujours ufé depuis l'établissement de mes Cours; & quoique j'aye étudié avec attention le goût du Public à cet égard, je n'ai rien apperçu qui pût me déterminer à changer cet ordre: i'ai

PREFACE. xxv
j'ai cru voir au contraire qu'il avoit tout l'effet que je m'étois proposé qu'il eût. Il m'a semblé que des principes assez souvent abstraits, & que l'on ne pourroit apprendre de suite sans une application laborieuse, s'insinuoient plus aisément dans l'esprit, lorsqu'ils étoient ainsi entrecoupés par des expériences intéressantes, qui obligent d'en reconnoître & la vérité & l'utilité.

Dans la distribution des Matiéres qu'on doit regarder comme le fond de cet Ouvrage, je me suis attaché à rassembler, sous un même titre, celles qui sont nécessairement liées ensemble; & j'ai eu soin de faire précéder les propositions qui peuvent s'entendre plus facilement, & qui doivent servir comme de princi-

xxvj PREFACE.

pes pour l'intelligence des autres; ainsi quoiqu'on puisse à la rigueur prendre chaque Leçon séparément, & que la plûpart ayent entr'elles une espece d'indépendance, je conseillerai toujours au Lesteur qui voudra les suivre avec plus de facilité & de prosit, de les voir dans l'ordre où elles sont, parce qu'il trouvera dans les premieres des notions qui pourront l'aider pour la suite.

Les faits dont je me sers pour prouver mes propositions, ne sont pas toujours ni aussi nombreux ni aussi nouveaux qu'ils pourroient l'être. Ceux qui ont vu l'appareil de mes Instruments, en assistant à mes Cours, seront peut-être surpris de ne retrouver dans les gravûres de cet Ouvrage, qu'une partie de ce qu'ils ont vu dans mes

PREFACE. xxvij cabinets; il est juste d'exposer les motifs qui m'ont fait supprimer ce qu'on pourroit peut-être desirer de plus, si j'annonçois ces volumes comme un recueil de mes Démonstrations.

Depuis que j'enseigne la Physique expérimentale, j'ai eu tout lieu de reconnoître que le moyen le plus fûr de captiver l'attention, & de faire naître promptement les idées, c'est de parler aux yeux par des opérations sensibles. En conséquence de cette vérité, je me suis pourvu de certaines machines que j'ai imaginées pour faire entendre mes pensées aux personnes qui n'ont des Sciences qu'une teinture très-legere, & pour leur faire prendre plus facilement & en moins de temps, certaines notions sans lesquelles on xxviij PREFACE.

ne saisiroit pas bien l'état d'une question, ou les preuves qui en établissent la théorie. Mais comme ces moyens n'ont de force que dans l'usage même qu'on en fait, & que les pieces qui les composent n'expriment rien, si elles ne sont en jeu, il eût été inutile d'en donner la sigure ou la description; c'eût été multiplier, sans aucun avantage, des planches qui sont déja assez nombreuses.

Une autre raison pour laquelle je me suis dispensé de représenter dans cet Ouvrage tout ce qu'on voit dans mon Ecole, c'est que je n'ai pas cru devoir y faire entrer plus d'expériences qu'il n'en faut pour prouver solidement la doctrine qu'il renserme. Je l'ai déja

PREFACE. XXIX dit ailleurs *; je n'ai jamais prétendu faire de mes Leçons un fpectacle de pur amusement, où l'on vît répéter, sans dessein & fans choix, un grand nombre d'expériences capables seulement d'occuper les yeux. Je crois être plus en état que personne en France, de satisfaire les Curieux par l'affortiment des machines dont je suis muni: mais je serois peu flatté qu'on ne vînt chez moi que pour voir; & je suppose toujours une curiosité plus raisonnable dans mes Auditeurs. C'est pourquoi de tous les saits que je suis en état de produire pour prouver chaque proposition, je n'emploie jamais qu'un certain nombre qui soit suffisant; & par

^{*} Program. où Idée gén. d'un Cours de Phys. dans la Préf. p. x.

XXX PREFACE.

cette économie je gagne du temps pour des choses plus nécessaires, & je me mets en état de varier agréablement & utilement mes preuves, pour des personnes qui assistent plusieurs fois à mes Cours. J'ai eu la même attention en écrivant; je n'ai point voulu que le Lecteur, ébloui d'un nombre superflu d'opérations, pût perdre de vue les vérités qu'il s'agit d'établir : en lui rapportant des faits dignes d'attention, j'ai compté mettre sous ses yeux des preuves qui affermissent ses connoisfances. En un mot, foit en ouvrant mon Ecole au Public, foit en lui offrant mes Leçons écrites, mon intention a toujours été qu'il y trouvât un cours de Physique expérimentale, & non pas un cours d'expériences.

PREFACE. XXXI Par la description que j'ai donnée des instruments sous le titre de Préparation, je n'ai pas prétendu mettre suffisamment au fait de leur construction ceux qui voudroient les imiter : il auroit fallu entrer dans un détail de proportions, de choix de matieres, de précautions à prendre, & bien souvent de connoissances un peu étrangeres à mon objet, qui auroit grossi considérablement les volumes, & cela en pure perte pour la plûpart des Lecteurs, à qui il suffit de voir en gros, qu'un tel effet peut être produit par une certaine méchanique. Mais comme je sens de reste combien il seroit utile qu'il y eût de bonnes

instructions sur le choix des Instruments de Physique, & sur la manière de les construire, pour xxxij PREFACE.

aider le zele des Amateurs ou des Savants qui s'appliquent à cette Science, & dont le nombre s'accroît tous les jours; j'ai résolu de rassembler, dans un Ouvrage séparé, ce qu'un long usage aura pu m'apprendre touchant cette matiere. Ce dessein s'exécute actuellement, & l'on en peut voir quelques fragmens dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour les années 1740 & 1741, où j'ai seulement supprimé les pratiques qui regardent l'Ouvrier.

Quant au choix des expériences, j'ai quelquesois préséré celles qui sont connues depuis longtems, à d'autres plus récentes, parce que je leur ai trouvé un rapport plus direct aux propositions que j'avois à prouver, ou parce qu'elles donnoient lieu à des apqu'elles des apqu'elles des apqu'elles donnoient lieu à des apqu'elles des apqu'elles des appu'elles d

PREFACE. xxxiif plications plus intéressantes, ou bien ensin parce qu'elles m'ont paru trop belles pour être omises; leur date alors m'a semblé d'autant plus indissérente, que, comme cet Ouvrage n'est point fait pour des Sçavans de profession, la plûpart de ceux qui les y verront, leur trouveront encore tout l'agrément de la nouveauté: & d'ailleurs les choses n'ont-elles de mérite qu'autant qu'elles sont nouvelles?

On me reprochera peut-être d'avoir fait entrer dans les Applications quelques remarques d'une mince utilité; foit que l'objet en mérite peu la peine, foit qu'elles fe présentent d'elles-mêmes à tout le monde. Mais on doit faire attention que cet Ouvrage n'est pas fait seulement pour des

xxxiv PREFACE.

personnes qui ont déja vécu un certain tems dans le monde, & à qui l'usage a donné quelques idées obscures & confuses, à la vérité, mais avec lesquelles on peut fentir les causes prochaines de ces effets les plus communs. Je le destine principalement aux jeunes gens de l'un & de l'autre fexe, qui passent les premieres années de leur vie dans des Colléges ou dans des Pensions, pour qui tout est nouveau dans la Nature, dont l'esprit est naturellement avide de ces sortes de connoissances, & qu'il convient d'accoutumer, par des exemples faciles & familiers, à des idées claires & diffinctes, & à des inductions judicieuses; car, c'est la réflexion d'un Sçavant bien refpecté, & bien digne de l'être,

PREFACE. xxxv qu'il est toujours utile de penser juste, même sur des sujets inutiles. *

Au reste il faut prendre garde de confondre l'effet avec sa cause; l'un pourroit être connu du Paysan le moins instruit, pendant que l'autre ne le feroit pas du plus sçavant Philosophe. Quelqu'un ignore-t-il qu'une éponge, une pierre tendre, un morceau de sucre se mouille entiérement avant que d'être tout-à-fait plongé? mais sçait - on bien pourquoi cela se fait? D'ailleurs les phénoménes les plus communs ne le paroissent pas toujours également, quand on les considere par toutes les faces. Tout le monde sçait qu'une pierre tombe en

^{*} M. de Fontenelle, Hist. de l'Acad. des Sciences, 1699, dans la Préf. p. x1.

xxxvj PREFACE.

vertu de sa pesanteur; mais tout le monde ne sçait pas qu'en tombant elle doit parcourir des espaces qui répondent aux quarrés des tems de sa chûte. En faisant application de ce dernier effet, après l'avoir prouvé, si je dis qu'une bouteille ou un verre peut se casser en tombant, assûrément je n'instruis personne; si je dis encore qu'en tombant de plus haut, les corps fragiles courent un plus grand risque, cette vérité ne paroîtra pas plus neuve que la premiere: mais si j'ajoute qu'un Corps grave en tombant se brise en vertu de sa chûte accélérée, & qu'on peut prévoir l'effort qu'il sera capable de faire à la fin de cette chûte, en mesurant la hauteur du lieu d'où il tombe; je ne crois pas que cette observation PREFACE. xxxvij

foit inutile pour tous ceux à qui
je la propose; & si quelqu'un après
l'avoir lue se plaignoit que j'aie
voulu lui apprendre qu'un verre
peut se casser en tombant, ou qu'il
se brise plus sûrement en tombant
de plus haut, il feroit voir qu'il a
peu de discernement, ou beaucoup de mauvaise humeur.

Graces au bon goût qui regne dans notre siecle, je pourrois me dispenser de prouver que la Physique est utile, & qu'il n'y a personne qui ne puisse prendre part aux découvertes dont elle s'enrichit tous les jours. Quoique cette Science porte un nom Grec, on sçait maintenant que son objet n'est point étranger; que les connoissances qu'elle offre intéressent tout le monde, & que lorsqu'elle prononce par la voix de l'expé-

xxxviij PREFACE.

rience, elle peut être entendue à tout âge & en tous lieux. L'étude de la Nature étoit encore, pour ainsi dire, au berceau; la connoissance qu'on avoit de ses phénoménes & de leurs causes, méritoit à peine le nom de Science, qu'un des plus grands hommes de l'Antiquité la vantoit déja comme une ressource pour l'esprit humain, comme une occupation dont il pouvoit tirer avantage dans tous les tems & dans toutes les circonstances de la vie *. Avec combien plus de raison ne pourroit-on pas la recommander comme telle, à pré-

^{*} Hæc sludia adolescentiam alunt, senestutem oblestant; secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium præbent; delestant domi, non impediunt soris: pernostant nobiscum, peregrinantur, russicantur. Cic. pro Archia Poet. n°. 16.

PREFACE. xxxix fent qu'elle occupe dans tous les états policés des compagnies de Sçavans, que les Princes honorent de leur protection, & qu'ils entretiennent par leurs libéralités; à présent, dis-je, que ses progrès s'annoncent tous les ans par des volumes, où chacun peut puiser selon son goût, ou selon ses besoins, des connoissances, dont le moindre avantage est d'orner l'esprit.

Quelque état que l'on prenne dans le monde, il est bien rare que l'on n'ait pas à résléchir sur la force des Corps qui se meuvent par leur poids, ou autrement, sur celle des animaux, sur l'impulsion & le mouvement des suides, sur l'action & sur les esfets d'une infinité de machines, nouvelles ou anciennes, touchant le choix desquelles on a souvent intérêt de sçavoir décider à propos. Est-il possible de voir ces effets admirables des télescopes, des lunettes, des microscopes, dont l'usage est aujourd'hui si commun, sans desirer d'en connoître la méchanique, & les propriétés sur lesquelles la construction de ces instrumens est fondée? A qui peut-il être inutile d'apprendre ce qu'il y a de nouveau dans une Science d'où dépendent nos amusemens les plus raisonnables, nos commodités, nos besoins? A qui peut-il être indifférent de sçavoir ou d'ignorer des choses qui peuvent occuper, au moins agréablement, dans des tems, dans des lieux où les douceurs de la fociété nous man-

Mais

PREFACE. xlj

Mais l'avantage le plus précieux, & que toute ame bien née ne manque pas de ressentir en étudiant la Nature, c'est la nécessité où l'on est de reconnoître par-tout l'Etre suprême qui a formé ce vaste univers, & qui préside sans cesse à ses propres œuvres. Plus on avance dans cette étude, plus on est convaincu que ce qui en fait l'objet, n'est point une production du hazard; tout y annonce une puissance infinie qui étonne, une sagesse profonde qu'on ne peut assez admirer, des intentions & une bonté qui méritent toute notre reconnoissance. Ces merveilles que nous avons fous les yeux parlent au cœur, autant qu'à l'esprit; en éclairant l'un il est naturel qu'elles touchent l'autre : ce que nous en apprenons Tome I.

xlij PREFACE.

en nous rendant moins ignorans que le vulgaire, peut aussi faire naître en nous des sentimens plus viss, & nous rendre plus sideles à nos devoirs.

Un illustre Prélat *, en saisant l'Histoire de l'Education d'un grand Prince, qui lui avoit été consiée, me sournit un exemple & une preuve bien authentique des bons esfets qu'on peut attendre de la Physique, lorsque les principes de cette Science sont enseignés avec dessein & avec choix, & que celui qu'on en instruit est capable de réslexions. Je sinis cette Présace par la traduction de ses propres paroles, telle qu'on la trouve dans celui de ses

^{*} M. Boffuet, Evêque de Meaux, dans la Lettre Latine au Pape Innocent XI. touchant l'éducation de feu Monseigneur le Dauphin p. 16.


PREFACE. xliij Ouvrages qui a pour titre, Politique tirée de l'Ecriture Sainte, p. 41. * » Pour l'expérience des cho-» fes naturelles, dit-il, nous avons » fait faire devant le Prince les » plus nécessaires & les plus bel-» les. Il n'y a pas moins trouvé » de profit que de divertissement; » elles lui ont fait connoître l'in-» dustrie de l'esprit humain & les » belles inventions des Arts, soit » pour découvrir les fecrets de la » Nature, ou pour l'embellir, ou » pour l'aider. Mais ce qui est plus » confidérable, il y a découvert » l'art de la Nature même, ou plû-

^{*} Experimenta verò rerum naturalium sic exhibere secimus, ut in his Princeps ludo suavissimo atque utilissimo, humanæ mentis historiam, præclaraque artium inventa, quibus naturam & retegerent & ornarent, interdum adjuvarent; ipsam denique naturæ artem, immò summi Opificis & patentissimam & occultissimam Providentiam miraretur. Bossuet, loco citato.

xliv PREFACE.

» tôt la Providence de Dieu, qui » est tout à la fois si visible & si » cachée. »





DISCOURS*

Sur les dispositions & sur les qualités qu'il faut avoir pour faire du progrès dans l'étude de la Physique expérimentale.

N peut dire des Esprits qui s'appliquent aux Sciences, ce qu'un Poëte célebre nous fait observer touchant les dissérentes terres que l'on cultive; comme elles ne sont pas également propres à toutes sortes de productions (a); nous ne devons pas non plus nous attendre que chaque génie réussisse dans quelqu'étude qu'il s'engage: s'il en est d'assez heureusement nés pour pouvoir se flatter d'un succès universel, ce sont de ces exemples rares, qu'il faut moins attendre qu'admirer, quand ils se rencontrent: selon le cours ordinaire de la nature, nous naissons presque tous avec une

(a) Nec verò terra ferre omnes omnia possunt. Visg. Georg. lib. 2.

^{*} Ce Difcours a été prononcé le 16 Mai 1753 le Roi, & publié ensuite par ordre de l'Université.

Discours xluj

aptitude particuliere pour quelque objet: heureux celui qui n'en est pas détourné par un choix forcé, ou par des circonftances contraires à fon inclination! Il est donc raifonnable d'examiner d'une part d'equelle forte d'application un homme est capable, & de l'autre, ce qu'exige de lui l'espece d'étude à laquelle on voudroit l'appliquer, afin d'affortir le travail au goût & au pouvoir de celui qui l'entreprend, & de ne point tomber dans le défaut d'un laboureur qui ensemenceroit de froment une terre destinée par la

nature à porter une forêt.

C'est pour faciliter un tel examen, que je me suis proposé de rassembler dans ce Difcours les différentes parties d'un Physicien qui s'applique à Part des Expériences, & de faire comprendre par-là les dispositions & les qualités avec lesquelles il peut espérer de réufsir. Il entre dans mon dessein de montrer les difficultés & les peines qui accompagnent cette étude; mais je ne diffimulerai pas les avantages, ni les agrémens qu'on y peut goûter : ce vaste champ est parsemé de fleurs, comme il est hérissé d'épines; si j'en éloigne ceux qui ne seroient point propres à le parfur la Physique expériment. xlvij courir avec fruit, je desire plus que personne qu'il ne soit point abandonné, que les richesses qu'il renserme, se découvrent de plus en plus, & qu'elles

soient recueillies de même.

L'objet de la Physique expérimentale est de connoître les phénoménes de la nature, & d'en montrer les causes par des preuves de fait : elle differe de l'Hiftoire naturelle, en ce que celle-ci, sans rendre raison des effets, a pour but principal de nous donner en détail la connoissance des corps dont l'univers est composé, de nous en faire distinguer les genres, les especes, les variétés individuelles, les rapports que ces êtres ont entr'eux & leurs différentes propriétés. La premiere de ces deux Sciences entreprend de nous dévoiler le méchanisme de la nature; la derniere nous offre, pour ainsi dire, l'inventaire de nos richesses: l'une & l'autre sont tellement liées ensemble, qu'il est prefqu'impossible de les séparer : un Physicien qui n'est point Naturaliste est un homme qui raisonne au hasard & sur des objets qu'il ne connoît point; le Naturaliste, qui n'est pas Physicien, n'exerce que sa mémoire. S'appliquer à la Phyfique exxlviij Discours

périmentale, c'est donc s'engager à étudier la Nature, non-seulement dans ses essets, mais encore dans les dissérens matériaux qu'elle employe pour les produire; c'est l'examiner dans tout ce qu'elle a fait, pour se mettre plus en état d'apprendre de quelle maniere elle

agit.

Je vois principalement deux choses à faire pour quiconque voudra parvenir à cette double connoissance. La premiere, & par laquelle il faut commencer, est de se mettre bien au fait de certaines vérités qui sont reçues comme principes, & de s'instruire de toutes les découvertes qui ont été faites avant nous. La seconde, est de travailler à augmenter ce premier fond de connoissances, par ses propres recherches, ou en profitant de celles des contemporains. Nous n'osons prétendre, nous ne devons pas même desirer, que tous nos Auditeurs se fassent Physiciens de l'une & de l'autre maniere; l'intérêt commun des Sciences demande que les hommes fe partagent pour les cultiver; la plûpart de ceux qui auront suivi nos Leçons, entraînés par d'autres goûts, ou privés des moyens. nécessaires pour se livrer à de nouvelles recherches,

sur la Physique expériment. xlix recherches, s'en tiendront sans doute au premier degré d'instruction, se contentant de bien entendre & de sçavoir ce que le travail d'autrui leur aura offert. Mais en même-tems, nous nous flattons que dans le grand nombre, il s'en trouvera plusieurs à qui nous ferons naître le désir de porter plus loin cette étude, & qui s'y livreront dans la fuite entiérement, ou du moins dans les momens de loisir que leurs professions & leurs affaires leur pourront laisser. Comme les uns & les autres doivent commencer de la même façon; je vais d'abord tracer la route que doivent suivre ceux qui veulent s'initier en Physique.

Voulez-vous apprendre ce que l'on sçait aujourd'hui en Physique, vous mettre au fait des principes de cette Science, & en état de raisonner sensément sur les effets naturels? Fréquentez les Ecoles; informez-vous de ce qui se passe dans les Compagnies de Sçavans qui étudient la Nature; soyez attentif aux découvertes particulieres qui viendront de bonne part; lifez les bons Auteurs; voilà les moyens: vous pourrez les employer avec fruit, si vous êtes assidu, si vous avez l'esprit libre de préjugés & une juste désiance

Tome I.

Difcours
contre l'erreur & l'illusion.

Graces à la méthode introduite par Descartes, & à la réforme qu'elle a mise dans notre maniere de philosopher, on peut dire que dans presque toutes les Ecoles de Philosophie, il n'y a plus maintenant qu'à profiter pour la jeunesse qui les fréquente : on ne l'affujettit plus à ce langage inintelligible, qui déshonoroit la raison; on lui donne pour regle de ne se rendre qu'à l'évidence, & de ne croire que ce qu'elle comprend; on ne lui offre pour expliquer les effets naturels que des causes palpables & vraiment physiques: ou si quelquesois on employe des conjectures pour deviner ce que l'on ne voit pas, on ne les présente que comme des probabilités que l'autorité la plus grave & la plus respectable ne défend pas contre un doute légitime.

Il est certain que cette nouvelle saçon de traiter & d'enseigner la Philosophie, est plus propre qu'aucune autre à éclairer l'esprit humain: maître absolu de ses pensées sur des matieres abandonnées à la dispute des hommes, il peut d'autant plus compter sur les connoissances qu'il acquiert en ce genre, que le choix de ses opinions a été plus libre: dès qu'il

sur la Physique expériment. n'y a plus ni honneur ni mérite à suivre avec une aveugle docilité des routes, dont la plûpart avoient été ouvertes par l'ignorance, & frayées par l'habitude on doit beaucoup plus espérer des efforts de la raison; les conceptions étant variées suivant les différens degrés de lumiere que chacun a reçus, & la nouveauté n'étant plus un reproche que la vérité ait à craindre. Ainsi l'expérience nous prouvet-elle que depuis centans ou environ que cette heureuse liberté regne dans les Ecoles, la Physique a fait beaucoup plus de progrès que dans les siecles précédents; quoique de tout tems il y ait eu des hommes occupés, ou par goût, ou par état, à dévoiler & à contempler les merveilles de la Nature.

La nouvelle méthode ayant donc rendu les Ecoles profitables, on ne sçauroit mieux faire que de les fréquenter ayant toutes choses, pour y prendre les premieres notions, pour se former des principes, & pour y apprendre à traiter les matieres ayec ordre.

Dans la Physique, comme dans toute autre science, les commencements sont épineux; les premieres idées ont peine à s'établir; la nouveauté des termes,

autant que celle des objets, fatigue l'efprit par l'attention qu'elle demande: pour applanir ces difficultés, les leçons qui fe donnent de vive voix, ont un avantage considérable sur celles qu'on voudroit prendre dans les livres; un Maître qui parle à ses Eleves, & qui sçait se souvenir à propos des peines qu'il a eues en étudiant à leur âge, ou du foin qu'on a pris de les lui épargner, cherche pour se faire entendre, les expressions les plus propres; il les répete & les varie, jusqu'à ce qu'il ait lieu de croire qu'il a été entendu: le ton, le geste, un coup de crayon, & plus encore que tout cela, la liberté avec laquelle il permet, il recommande qu'on le questionne, sont autant de moyens qui secondent son zele, & avec lesquels il parvient à faire prendre des idées claires & distinctes de ce qu'il enseigne.

Quelle facilité ne trouverez-vous pas encore à vous initier, si l'Ecole où vous ferez admis a l'avantage de posséder une collection suffisante d'Instrumens, avec lesquels on vous mette sous les yeux presque toutes les vérités qu'on se propose de vous faire entrer dans l'esprits Les idées peuvent-elles manquer de fur la Physique expériment. lij naître & de se persectionner à la vue de ces images sensibles? Soyez sûrs que ce que vous verrez ainsi, avec intérêt, avec attention, sera plus d'impression sur vous que tous les discours qui auront précédé; & que ce dernier moyen ne manquera pas de dissiper vos doutes & d'affermir vos connoissances:

Segniùs irritant animos, demissa per aurem, Quàm quæ sunt oculis subjecta sidelibus... Horat, de Arte Poët, 180.

Mais en vain notre maniere d'enseigner seroit-elle devenue meilleure; en vain ferions-nous parvenus à rendre nos Leçons plus instructives & plus faciles, si ceux qui les y prennent n'y assistoient avec affiduité, & à dessein de se rendre Phyficiens, ou du moins de se disposer à le devenir; si se permettant des absences ils perdoient le fil des questions que nous avons à traiter; ou si ne se rendant ici que par la vaine curiosité de voir des Expériences, ils refusoient leur attention aux connoissances que nous avons en vue de leur faire acquerir. Ces connoissances doivent être liées entr'elles comme les parties d'un édifice ; les premieres fervent de fondement pour en établir d'autres sur lesquelles on continue de bâtir,

liv Discours

fi par les vuides qu'on aura laissés, les appuis manquent, l'assemblage imparfait n'aura aucune solidité. Ce n'est donc que par une application suivie, qu'on peut se flatter de mettre à prosit ce que nous enfeignons dans nos Ecoles; ce n'est aussi qu'à cette condition, que nous nous engageons à donner dans l'espace d'un an, les principes d'une science qui embrasse tant d'objets, & dans laquelle il y a tant

à apprendre.

Je dis les principes; car c'est là seulement ce que les Commençans doivent chercher dans les Ecoles, c'est-à-dire, ces vérités sondamentales qui sont comme la source des autres, & qui doivent les précéder, soit pour les faire désirer, soit pour les rendre intelligibles. Les connoissances de détail ne doivent venir qu'après; quiconque s'en occuperoit avant que de s'être suffisamment instruit des principes généraux, travailleroit infructueussement; comme un homme qui voulant arracher un arbre le saissiroit par les seuilles, plutôt que de porter ses efforts sur les racines & sur le tronc.

C'est encore dans les Ecoles qu'on apprend à traiter les questions dans un ordre convenable, & à rappeller les matie-

sur la Physique expériment. lu tes à certains chefs; afin que ce que l'on a étudié dans un tems puisse faciliter les autres Etudes qu'on fait après, & qu'appercevant avec un peu de réflexion les rapports que les objets ont entr'eux, on foit plus en état de juger d'où l'on doit partir pour les attaquer. Sans cela quelle confusion dans lesidées, & que de peines inutiles ne se donneroit-on pas! Jugeonsen par un exemple; comment pourroiton comprendre le méchanisme de l'ouie ou celui de la vision, si l'on n'avoit pas appris auparavant les propriétés de l'air, & celles de cette matiere dont l'action nous éclaire ? De quelle maniere s'y prendroit-on pour étudier ces effets, si l'on ignoroit que les sons & l'illumination des objets dérivent des mouvemens de ces deux fluides? C'est donc par ces connoissances primitives, que nous sçavons rapporter les effets dont il s'agit à leurs vraies causes; c'est sur elles que nous nous appuyons pour les expliquer.

Après la fréquentation des Écoles, rien ne convient mieux, rien n'est plus propre à persectionner les connoissances, que de s'instruire des découvertes qui se sont faites & qui se sont tous les jours dans ces Compagnies que l'amour des

loj Discours

Sciences a formées pour travailler en commun, que la faveur & la libéralité des Princes a mises en état de faire ce que des particuliers isolés ne pourroient pas même entreprendre. Heureusement nous vivons dans un siécle & dans un Royaume où ces secours ne manquent point à quiconque en veut profiter; il n'y a presque pas de grande ville en France, où il n'y ait maintenant une Académie; si la Physique n'en est pas toujours l'objet principal, le goût de cette Science est tellement répandu, qu'elle y entre comme accessoire: & parce que ces Aréopages ne comprennent pas tous ceux qui feroient dignes d'y être admis, on peut compter encore fur le travail d'un grand nombre de Sçavans dispersés, qui se sont connoître tous les jours par des productions très-instructives. Les connoissances qu'on tire de pareilles fources, ont l'avantage d'être plus détaillées & plus approfondies que les autres, parce que ceux qui nous les offrent ont donné toute leur application à des fujets particuliers qu'ils ont choisis par goût, ou à la faveur de quelques circonstances, qui les mettoient à portée de travailler avec plus de succès. Ce que vous aurez appris de nos con-

sur la Physique expériment. luis temporains, vous ferez très-bien de le comparer avec ce que nous tenons des Sçavans qui ont vêcu avant nous. La lecture bien réfléchie de leurs Ouvrages, vous apprendra les routes qu'ils ont frayées les premiers, & dans lesquelles nous fommes entrés après eux; les découvertes qu'ils ont, pour ainsi dire, ébauchées, & qui se sont perfectionnées depuis; les écarts dans lesquels ils avoient donné, & dont on est revenu dans la suite. En suivant ainsi la marche de l'esprit humain, on s'instruit plus profondément & avec plus d'exactitude; on voit d'où naissent les illusions, & ce qui peut les dissiper; on apprend à douter à propos, & à sufpendre son jugement, jusqu'à ce que le tems & l'évidence nous autorisent à croire.

La connoissance des langues est un moyen également commode & utile, pour s'instruire de tout ce qui se fait en Physique; parce qu'il y a quantité de bons Ouvrages, dont les Auteurs ont employé l'idiôme du pays dans lequel ils ont écrit; lotsqu'on ne l'entend pas, on ne peut s'en dédommager que par des traductions qui ne se sont pas toujours, ou qui, si elles se sont, ne sup-

pléent presque jamais parsaitement aux originaux. Mais une Langue qu'il est indispensable d'apprendre, c'est celle de l'Algebre & de la Géométrie; ces deux Sciences se sont heureusement introduites dans la Physique; par-tout où elles peuvent s'appliquer, elles y portent l'exactitude & la précision qui leur sont propres, elles répandent la lumiere dans l'esprit, elles le sont raisonner juste; avec leur secours il chemine plus vîte, plus sûrement, & peut aller plus loin; il saut de nécessité se mettre en état de suivre les Auteurs qui marchent à la lueur de ces slambeaux.

Mais dans quelque fource que l'on cherche à puifer des connoissances, soit en étudiant les Auteurs, soit en recueillant ce que les Sçavans nous offient chaque jour de nouveau, rien n'est plus nécessaire que de renoncer à tout préjugé; car un esprit livré à la prévention, ne manque guere de suivre dans ses décisions le penchant secret qui l'entraîne, & le vrai ne se trouve pas toujours du côté vers lequel il se laisse aller; semblable à l'œil malade dont les humeurs se sont teintes, il voit rarement les objets sous leurs vraies couleurs. Combien de

fur la Physique expériment. lix gens ne reconnoissent pas la vérité où elle est, combien d'autres croyent la voir où elle n'est pas, parce qu'ils se sont déclarés pour ou contre une Nation, parce qu'ils entendent mal le respect & la sidélité qu'on doit à la Religion, parce qu'ils ont épousé des haines ou des affections particulieres, parce qu'ils cedent aux impressions invétérées d'une mauvaise éducation!

On ne peut donc apprendre de trop bonne heure que tous ceux qui cultivent les Sciences, dans quelque partie du monde qu'ils vivent, ne forment qu'une seule & même République; qu'il leur convient de se traiter avec tous les égards que des Concitoyens se doivent; que travaillant à s'éclairer réciproquement, ils ne peuvent se permettre qu'une honnête émulation, qui leur fasse désirer de fe furpasser les uns les autres, fans songer à s'effacer ni à se confondre. Il faut confiderer de plus, que la vérité, de quelque part qu'elle vienne, est un bien que nous devons chérir, comme le diamant qui est précieux par lui-même, & que nous estimons, sans avoir égard à celui qui l'a tiré de la terre : & s'il arrive qu'une vérité évidente nous semble ne pas s'ac-

corder avec une autre vérité qu'il nous est ordonné de croire, souvenons-nous qu'elles viennent toutes deux de la même fource; que l'Etre fuprême qui a révélé les articles de notre foi, est aussi le Dieu, le Législateur de toute la nature, & incapable de se contredire en rien. En pareille conjoncture, que la raison religieusement soumise à la révélation, ne fe refuse cependant pas au trait de lumiere naturelle qui l'éclaire; qu'elle ne prenne pas le parti de regarder comme faux, ce que l'évidence lui montre être vrai; mais qu'elle rejette fur la foiblesse de l'entendement humain & sur sa propre ignorance, la contradiction apparente qui l'embarrasse; qu'elle attende sans impatience, que de nouveaux efforts & une nouvelle lumiere lui découvrent ce qui est encore caché, & lui apprennent à concilier ce qu'elle voit avec ce qu'elle est obligée de croire.

N'est-ce pas s'imposer une gêne bien peu raisonnable, & en même-tems bien nuisible au progrès des connoissances humaines, que de vouloir tout rapporter aux pensées d'un Philosophe dont on a épousé les principes, assez souvent sans les connoître, & presque toujours

sur la Physique expériment. lxj avant que d'être en état d'en juger? Hé! pourquoi vouloir être d'un ton décidé & en toute occasion, Cartesien, Newtonien, Leibnitien, &c? Quelqu'un de ces grands Hommes, dont l'autorité à tant de poids, a-t-il eu l'infaillibilité en partage? Ne peut-on pas respecter leur mémoire, admirer leur génie, profiter de leurs découvertes, sans s'attacher particuliérement à un seul, sans s'interdire la liberté d'examiner leurs opinions, de s'en écarter même, lorsque de nouvelles lumieres viennent nous éclairer sur ce qu'elles ont de défectueux? Pourquoi prendre indistinctement tout ce qui est renfermé dans un même trésor, quand il nous est permis d'en ouvrir plusieurs, pour nous enrichir avec choix? Ces préférences dans lesquelles on s'engage, produisent encore un mauvais effet dont nous n'avons que trop d'exemples; chacun voudroit que le parti qu'il a embrassé fût suivi du plus grand nombre; on parle, on agit en conféquence; il naît de-là des altercations, des plaintes, des injures, des inimitiés; & c'est, selon moi, porter jusqu'à la folie l'amour d'un Sage qu'on veut élever au-dessus des autres.

lxij Discours

Je ne parlerai point des préjugés qui viennent d'une éducation mal conduite; l'énumération en feroit trop longue, & presque inutile : je dirai seulement que l'esprit humain, en se livrant à l'étude de la Philosophie, doit commencer à user du droit qu'il a de penser librement fur les effets de la nature; que le premier acte de cette liberté doit être de s'élever au-dessus de toutes ces opinions vulgaires qu'il a reçues dans un tems où l'autorité & l'exemple lui tenoient lieu de raison; & que prenant pour regle de ne rien admettre que de certain ou de trèsprobable, il doit se dépouiller généralement de ces premieres impressions, qui portent presque toutes un caractere de fanffeté.

C'est déja beaucoup pour un Commençant d'avoir écarté les vieilles erreurs dont il étoit préoccupé; mais ce n'est point assez: à cette premiere précaution, il faut qu'il ajoute une juste défiance qui le tienne en garde contre les nouvelles illusions qui pourroient le séduire; & combien n'en a-t-il pas à craindre, tant de sa part, que de celle des autres! L'amour du merveilleux est un poison séduisant dont les meilleurs

sur la Physique expériment. lxiij esprits ont peine à se garantir ; il fait peut-être autant de mauvais Physiciens, que l'étude & les plus heureuses dispositions en forment de bons: & ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que, si l'on aime à produire des découvertes d'éclat, ceux qui les apprennent, les reçoivent aussi avec beacoup d'avidité; de forte que si quelqu'un a la foiblesse de mentir ou d'exagerer, en annonçant des nouveautés singulieres, il est presque sûr qu'on n'aura pas le courage d'en douter. Il est donc d'un homme sage d'examiner de fang froid ce qu'on lui présente d'extraordinaire, d'attendre que les faits ayent été vérifiés dans toutes leurs circonftances, de peser les raisons sur lesquelles on appuie ses jugemens, & de n'y adhérer qu'après une mûre réflexion & une pleine connoissance.

Défions-nous sur-tout des Auteurs qui ont des systèmes à soutenir; désions-nous de nous-mêmes, si nous les avons adoptés. Nos pas se tournent naturellement vers l'endroit où nous serions bien aises d'arriver; si nous n'y prenons garde de fort près, nous courons risque d'interpréter en faveur d'une opinion favorite, des essets, des observations, des senti-

laiv Discours

mens qui, mieux examinés, la détruiroient peut-être plutôt que de l'appuyer:
nous nous dissimulerons des dissicultés,
qui nous feroient revenir de nos erreurs,
si nous y étions moins attachés; nous
abandonnerons légérement des vérités
bien fondées, parce qu'elles nous paroîtront incompatibles avec une doctrine

que nous aurons goûtée.

Ayons donc de la défiance autant qu'il en faut pour ne point donner dans l'illusion; mais d'un autre côté, n'oublions pas que, fi nous en avons trop, nos foupcons feront injure à ceux qui travaillent à nous instruire, & que notre obstination à douter nous remplira l'esprit d'incertitude. Oui, c'est un abus & une ingratitude, que de se montrer toujours incrédule, & de se persuader que toutes les découvertes que les Physiciens nous vantent, ne produisent aucune connoisfance nouvelle de la Nature, aucune explication de ses effets. Ce langage est celui d'une ignorance ou d'une paresse orgueilleuse, qui méprise ce qu'elle ne connoît pas, & qui trouve plus commode de le nier, que de prendre la peine de s'en instruire. On entend rarement parler ainsi des gens raisonnables & initiés

fur la Physique expériment. Ixv tiés dans les Sciences; il est plus ordinaire d'en trouver qui reconnoissant les avantages de la Physique en général, affectent de révoquer en doute tout ce qui ne vient pas d'eux ou de leurs amis. Ce Pyrrhonisme marque de l'humeur, ou quelque intérêt particulier; mais quelle qu'en soit la cause, on ne peut s'appliquer ni trop tôt, ni avec trop de soin, à s'en défaire: car tant qu'il subsistera, il rendra suspectes les vérités les mieux prouvées; l'esprit frappé de cette maladie flottera fans cesse entre le oui & le non, & ne sera jamais fixé par aucune connoissance certaine; il travaillera beaucoup, fans jamais rien sçavoir de ce qu'il aura appris, il ne fera tout au plus que s'en douter.

Il coûtera sans doute & du tems & des peines pour entrer dans ces dispositions, si l'on ne les a pas naturellement, & pour employer avec fruit les moyens dont j'ai parlé: mais est-il une science qui n'en exige de la part de ceux qui s'y appliquent? & de toutes celles que l'esprit humain cultive, n'auroit-on pas raison de dire que la Physique expérimentale est la plus propre à le dédommager de ses fatigues & de tout ce qu'il

Tome I.

Ixvi Discours

auroit pû lui facrifier. En se mettant en état d'étudier la Nature & de la suivre dans ses opérations, que de ressources agréables & utiles ne peut-on pas se flatter de trouver, dans des tems & dans des lieux où l'on feroit privé des douceurs de la société! Le Physicien trouve par-tout l'objet de ses recherches & de ses amusemens; la campagne & la ville, les élémens, les saisons, ce qui respire, ce qui végéte, ce qui naît, ce qui périt, &c. tout lui offre de quoi méditer, de quoi s'instruire, de quoi profiter. Compterons - nous pour rien l'avantage qu'il a fur les autres hommes, de ne point se livrer comme eux à de frivoles espérances, à de vaines terreurs, à de superstitieuses pratiques, & d'admirer tranquillement des phénomenes ou des êtres que le vulgaire ne voit qu'avec émotion, & toujours en raisonnant d'une maniere fort étrange? S'il est bon citoyen, ne fera-ce pas pour lui une grande fatisfaction, de pouvoir tourner au profit de la société des découvertes dont il aura pris connoissance, ou les remarques qu'il aura faites lui-même? Tels feront les avantages d'un homme qui sera devenu Physicien en profitant

fur la Physique expériment. Ixvij seulement des instructions d'autrui: nous en promettons de plus grands à celui qui le deviendra par son propre travail; mais il aura plus à faire pour les mériter.

L'observation & l'expérience sont les moyens les plus sûrs, je dirois presque les seuls que puisse employer un Sçavant qui s'applique à étendre les progrès de la Physique. Par la premiere on épie, pour ainsi dire, la Nature à dessein de lui surprendre son secret; par la seconde, on lui fait violence pour la forcer à le dire: mais, soit que l'on sasse l'un ou l'autre, il y a maniere de s'y prendre; & c'est un Art assez dissicile à exercer, pour lequel il saut des dispositions naturelles, des qualités & des attentions particulieres, des secours qu'on n'est pas toujours en état de se procurer.

Un observateur, dans quelque partie que ce soit de la Physique, doit avoir une patience à toute épreuve, une attention à laquelle il n'échappe aucune circonstance, une prompte & vive pénétration, une imagination sage & modérée, beaucoup de réserve & de circonspection dans ses jugemens.

Quel courage ne faut-il pas pour furmonter les ennuis, les difficultés, les Axviij Discours

dégoûts de tant d'entreprises qui trompent nos espérances par un mauvais succès, ou qui les flattent long-tems fans jamais répondre à nos défirs! Le Physicien Botaniste obtient avec peine & après une longue attente, des Plantes exotiques qu'il est curieux de voir & d'examiner dans tous leurs états; elles ont réfisté aux fatigues du transport; à force de soins & d'attentions, on a empêché que la différence du climat ne leur fût nuisible; elles alloient fleurir enfin, lorsqu'un insecte en vient ronger les racines, & les fait périr sans ressource. Un Astronome zélé se fait un plaisir singulier de voir une éclipse qu'il attend depuis dix ans : le jour tant défiré approche, il fait deux ou trois cens lieues pour aller observer ce phénomene dans l'endroit où il doit être visible, il prépare ses instrumens; mais quelle fatalité! au moment même où les deux astres vont se joindre, le ciel se couvre, & les nuages qui l'ont obscurci ne se dissipent que quand il n'y a plus rien à voir (a).

⁽a) Tel fut le sort de M. Delisse, lorsqu'il alla de Pétersbourg à Berezou, ville de la Syberie, près l'embouchure de l'Oby, pour voir le passage de Mercure sur le Soleil, le 2 Mai 1740a

Jur la Physique expériment. Ixix A combien de pareilles difgraces les Anatomistes & les Chymistes ne sont-ils point exposés, les uns, par l'extrême délicatesse des préparations, ou par les progrès trop rapides de la putréfaction; les autres, par l'infidélité des drogues, par la fragilité des vaisseaux, & par la plus légere inattention ! Si de tels accidens peuvent dégoûter, nous en avertifsons dès-à-présent ceux qui ne se sentiroient pas le courage de les supporter, ils y feront souvent exposés: encoren'estce point-là ce qu'ils auront de plus dur à fouffrir; la jalousie de leurs rivaux exercera bien autrement leur patience,

Si quelqu'un est assez heureux pour faire une découverte, l'honneur qui s'y trouve attaché est une récompense qui lui est légitimement dûe, & rarement doit-il en espérer d'autres: mais qu'il ne s'attende pas à l'obtenir de son vivant; ou s'il l'obtient, en jouira-t-il en paix? Ceux qui auront sait la même recherche que lui, & qui ne seront pas arrivés au même but, s'essorceront de

M. le Monnier eut autant de courage, mais plus de bonheur, en allant observer en Ecosse l'éclipse annulaire du Soleil, qui arriva le 25 Juillet 1748. lxx Discours

dire & de faire croire, qu'il n'a pas rencontré juste; & parmi ceux-là même qui ne cherchent rien, & qui ne sont pas en état de juger de la question, il s'err trouvera qui prendront parti contre lui, & qui lui disputeront le succès de son travail. Que fera l'homme fage? il se souviendra qu'un Physicien doit être Philosophe: sans mépriser ses Critiques, sans fe chagriner de leurs déclamations, il examinera de sang froid tout ce qu'on lui oppose; il y répondra sans aigreur; & s'il a lieu de croire que la raison soit de fon côté, il attendra tranquillement que la vérité qu'il a trouvée, dissipe par son éclat les mauvaifes difficultés par lesquelles on a tâché de l'obscurcir : comme c'est pour elle plutôt que pour lui-même qu'il a travaillé, il nes'affligera que médiocrement, s'il prévoit qu'il ne sera jamais témoin de ce triomphe.

Sans une attention scrupuleuse, l'Observateur le plus assidu, le plus dévoué
à la Physique, ne voit qu'imparfaitement son objet; tout ce qu'il en pourra dire n'instruira pas sussissamment, induira même en erreur ceux qui en jugeront d'après lui : le tems, le lieu, l'état actuel de l'Atmosphere, la quantité,

für la Physique experiment. Ixxi la durée, la forme, la couleur, l'odeur & les autres qualités fenfibles, font autant de circonstances aufquelles il faut avoir égard, & dont on doit tenir compte, à moins que l'on n'en voye évidemment l'inutilité. Combien de connoissances nous ont échappé! combien d'autres ont été retardées, parce qu'on s'est contenté de voir les choses en gros, & qu'on a négligé d'en examiner les particularités, ou d'en faire mention! Aurions-nous été fi long-tems, par exemple, sans scavoir que ces lumieres aërienes appelleés Castor & Pollux par les Anciens, Feux Saint Elme par les Modernes, étoient des phénomenes d'Electricité, si la plûpart de ceux qui en ont parlé, nous les eussent représentées comme des aigrettes lumineuses, qui paroissent en tems d'orage à l'extremité d'une vergue ou d'un mât de vaisseau, & qui y font entendre un bruit semblable à celui de la poudre qu'on allume après qu'elle a été mouillée? Un entre mille (a) fait cette remarque, & lui seul nous met en état de juger sainement de la nature de ces feux. Voilà comme de nouvelles

⁽a) Mém. du C. de Forbin, ann. 1696. Edition d'Amsterdam, 1740.

laxij_ Discours

attentions produisent de nouvelles connoissances: celui qui observe ne doit quitter son objet, que quand il en a considéré toutes les faces, tout ce qu'il renserme, tout ce qui l'environne.

Avec une grande attention, il faut encore dans l'esprit une certaine activité qui le fasse aller, pour ainsi dire, au-devant de la Nature, lorsqu'elle ne fait que la moitié du chemin vers lui; l'Observateur le plus attentif, qui ne sçait point la pénétrer en entrant dans ses vûes, sera dans bien des occasions comme un œil mort, qui est ouvert sur quantité d'objets, sans en voir aucun. Jugeons-en par un exemple. Le Fontainier qui apprit à Galilée que les Pompes aspirantes n'élevoient jamais l'eau audessus d'un certain terme, avoit vû ce phénomene toute sa vie, sans en être touché, sans en tirer d'autre conséquence, que celle d'assujettir son art à un fait que l'usage lui avoit montré. Il n'en fut pas de même du Philosophe; l'action limitée par la Nature même, lui fit soupconner une cause méchanique à laquelle personne n'avoit encore pensé; & Toricelli son Disciple eut l'honneur de la mettre en évidence. Ce fut par cet heureux fur la Physique expériment. Ixxiij reux événement que l'horreur du vuide disparut pour toujours de la Physique, & qu'un grand nombre d'effets qu'on faisoit venir de ce principe chimérique, ont été attribués depuis avec raison à la

pression de l'Atmosphere.

C'est au hasard, dit-on, que nous devons une grande partie de nos découvertes; j'avoue que cela est vrai jusqu'à un certain point : mais quoique le hasard se montre indifféremment à tout le monde, ce qu'il y a de bien fûr, c'est qu'il ne produit rien, si l'on n'a pas l'attention de le saisir à propos, & l'adresse d'en profiter : la vertu qui dirige les pôles de l'aiman, celle qu'il a de communiquer ses propriétés au fer & à l'acier, s'étoient peut-être montrées mille fois avant qu'on les eût remarquées; & quand elles l'eussent été plutôt, quel profit en eussions - nous tiré, si les Phyficiens qui firent ces observations, se repofant sur leurs premieres découvertes, n'eussent pensé qu'il en pouvoit naître un instrument propre à diriger la Navigation? Ces petits animaux que nous nommons des Insectes, & que le vulgaire méprise, parce qu'il ignore ce qu'ils ont d'admirable, ne se cachent pas Tome I.

Ixxiv Discours

plus d'un ignorant que d'un sçavant; mais celui-ci les fuit d'un œil curieux, par-tout où l'autre les écrafe avec une froide indifférence : l'illustre Auteur qui nous a déja donné six volumes de leur histoire, sans avoir épuisé ce que l'on peut sçavoir de leurs structures, de leurs mœurs, de leurs industries, &c. prouve, on ne peut pas mieux, par son exemple, ce que peuvent valoir les heureuses rencontres aux Observateurs attentifs & pénétrans; quiconque a parcouru fon excellent Ouvrage, a dû remarquer dans bien des endroits, que quand le hafard lui a parlé, il n'a été instructif que parce qu'il parloit à qui sçavoit l'entendre.

Cette vive pénétration que je regarde comme une qualité désirable dans un Observateur, touche de sort près à un désaut dans lequel on doit bien prendre garde de tomber: en allant au-devant de ce que l'on ne voit point encore, il est dangereux de se livrer à son imagination, & de se laisser emporter au-delà des bornes d'un sage soupçon, d'un soupçon sondé sur une grande vraisemblance. De grands hommes ont donné dans cet écueil; & ce n'est pas sans regret que nous voyons dans leurs Ouvra-

fur la Physique expériment. Ixxv ges des opinions fort douteuses, ou visiblement fausses, mêlées avec les vérités les plus folides & les plus intéressantes. Un Sçavant qui est parvenu à se faire une réputation brillante, peut risquer bien des choses, parce qu'on n'ose le contredire de son vivant. Il abuse quelquefois de cette espece d'impunité; mais qu'il se souvienne qu'elle n'aura qu'un tems, & que la postérité moins indulgente que ses contemporains, se vengera fur sa mémoire des licences qu'il aura prises: cet avis regarde principalement les Physiciens consommés; mais il est bon de le faire goûter à ceux qui commencent.

S'il est avantageux de penser promptement, d'avoir une vive imagination, parce qu'ordinairement elle accelere & multiplie les connoissances; il n'est pas moins nécessaire d'être circonspect dans ses décisions; de ne se fixer à rien, que l'ont n'ait examiné auparavant le pour & le contre, & que l'on n'ait pris tout le tems qu'il faut pour peser les raisons sur lesquelles on veut sonder ses jugemens; imitant en cela la prudence d'un homme, à qui une excellente vûe fait appercevoir dans un grand éloignement, des objets qu'il ne distingue pas bien encore

lxxvj Discours

& qui, pour en parler avec fûreté, attend qu'il les ait vûs plus long-tems & de plus près; la grande portée de fa vûe fait qu'il découvre ce qui est absolument invisible pour d'autres yeux; mais cette qualité, bien-loin d'être un avantage pour lui, ne feroit qu'une occasion d'erreur, s'il jugeoit avec précipitation de tout ce qu'il

commence à appercevoir.

Les jugemens précipités ne tireroient point tant à conféquence, si ceux qui les portent avoient le courage de les réformer quand ils s'apperçoivent qu'ils se sont trompés, ou de convenir au moins de leurs méprises, quand on les leur fait remarquer. Mais l'amour propre rend opiniâtre; souvent pour soutenir ses erreurs, on employe un tems & un travail dont on pourroit faire un meilleur usage: les mauvaises raisons qu'on s'efforce de faire valoir, séduisent toujours quelqu'un. L'honneur des sciences & la vérité ne peuvent que soussisse de cette malheureuse obstination.

Toutes les qualités dont j'ai parlé, & qui font, selon mon avis, le bon Observateur, me paroissent également nécessaires au Physicien qui s'applique aux Experiences; car il n'entreprend rien qu'il

fur la Physique experiment. Ixxvij n'ait des vûes; toutes ses tentatives demandent à être conduites avec intelligence: les instructions qu'il cherche dépendent des résultats de ses opérations, & des conséquences qu'il en sçaura tirer; dans quel Art faut-il plus de patience, plus d'attention, plus de discernement, plus d'imagination, plus de prudence?

Je dis qu'on a des vûes, & qu'on doit en avoir quand on entreprend de nouvelles Experiences; mais ces vûes ne doivent nous permettre que de simples foupçons, ou tout au plus des suppofitions, pour lesquelles il ne faut prendre aucun attachement, aucune prédilection, afin qu'on soit toujours prêt à les abandonner, si les faits ne concourent point à les vérifier, ou du moins à les rendre très-plausibles. Cependant aujourd'hui que la Physique Systématique est tombée dans un grand discrédit, parce qu'on a reconnu qu'il y avoit beaucoup d'abus, je crois qu'on blâme aussi d'une maniere trop générale & trop févere ce qui s'appelle hypothese: j'ose dire qu'on peut & que l'on doit s'en permettre, si l'on se contente de concevoir des possibilités, pour les soumettre à l'expérience, & apprendre par cette voie

Ixxviij Discours

Je porte plus loin encore mon indulgence pour les conjectures: comme on ne peut pas toujours fuivre par des épreuves, ce que l'on a imaginé qui pourroit être, parce que l'on manque de tems, d'occasions, ou de commodités, je ne voudrois pas qu'on ensevelît dans le filence & dans l'oubli, des pensées ingénieuses qu'on auroit rencontrées: en ne les donnant que pour ce qu'elles sont, en les laissant dans la classe des vraisemblances, on ne fait aucun tort aux vérités bien constatées, & l'on inspire souvent à d'autres qui en ont & le loisir & le pou-

⁽a) Voyez dans un excellent Discours, qui sert de Préface à cet Ouvrage réimprimé en 1749, ce que l'on doit penser des Systèmes.

Sur la Physique expériment. lanix voir, la volonté de les examiner & d'en faire connoître la juste valeur. Si M. Franklin se fût contenté de penser qu'on pourroit peut-être tirer du Feu Electrique d'un nuage orageux par le moyen d'une verge de fer dressée en l'air, & qu'il n'en eût rien dit, comme il n'en a rien fait, selon toute apparence, nous en ferions encore réduits au simple soupçon que nous avions formé avant lui fur l'identité de la Matiere électrique avec celle du Tonnerre, au lieu que nous en fommes fûrs maintenant; parce qu'en entrant dans la pensée de cet ingénieux Physicien, on a pris la peine d'exécuter ce qu'il n'avoit fait que proposer.

Mais après ces ménagemens pour les hypotheses raisonnables, je passe condamnation pour toutes celles qu'une imagination trop hardie prend plaisir à fabriquer & à multiplier de sa pleine autorité, pour en former un corps de doctrine, avant que de sçavoir comment elles quadreront avec les faits que pourront sournir l'Observation & l'Experience. Pour l'ordinaire ceux qui nous offrent de pareils systèmes, s'expriment d'une maniere impérieuse, qui nous laisse à peine la liberté de douter, comme si la force

des mots pouvoit procurer aux pensées la justesse & la solidité qu'elles n'ont pas : le ton & les expressions peuvent en imposer au vulgaire; mais aux yeux des connoisseurs on n'en est que plus ridicule. Que ces exemples, quand il s'en trouvera, nous servent de leçons; qu'ils nous apprennent à ne rien imaginer, ni gratuitement, ni trop légerement, & s'il nous arrive de mêler des probabilités avec des certitudes, ne parlons pas des unes & des autres avec une égale confiance.

Les mêmes intentions qu'on avoit en commençant les Expériences, doivent subsisser pendant tout le tems qu'elles durent; autrement il est impossible de bien conduire son travail. Ayez donc constamment votre objet en vûe; écartez de vos manipulations tout ce qui peut les rendre inutilement plus difficiles, plus embarrassantes, plus dispendieuses, ou vous donner des résultats équivoques. Surtout ne vous rebutez pas de la longueur, de la délicatesse des opérations; de l'assiduité qu'elles exigent, des accidens & des doutes qui vous obligeront à les recommencer.

Il arrive souvent qu'une Expérience

sur la Physique expériment. lxxxj entreprise dans certaines vûes, donne occasion à des remarques d'un autre genre; fi nous nous arrêtions à tout ce qui fe rencontre ainsi, jamais nous n'arriverions à aucune des connoissances que nous nous proposons d'acquérir, parce que dans ces recherches incidentes, comme dans les premieres, il se trouveroit encore des causes de diversion; nous changerions perpétuellement d'objets, sans jamais en suivre aucun. Il est bon de remarquer en passant ce qui mérite attention, pour y revenir une autre fois; mais on doit de préference aller à son premier but.

Toutes les fois qu'une Expérience peut s'exécuter simplement: & à peu de frais, c'est de cette maniere qu'il la faut saire. Un appareil pompeux peut être admis pour représenter avec éclat des essets déja connus; j'approuve beaucoup l'élégance des instrumens, dont on meuble aujourd'hui nos Ecoles & les Cabinets des amateurs: quoique les faits qu'on y démontre ne doivent rien de leur certitude, ni de leur utilité, à la décoration qu'on y met; cependant lorsqu'on les presente avec plus de grace, on peut esperer qu'ils intéressent dayantage. Mais je

Inxxij Discours

parle ici des Expériences que l'on tente dans fon particulier, & dont on ignore encore quel fera le fuccès; plus on y fera entrer de préparations & de moyens, plus on aura à craindre de prendre le change sur la vraie cause des effets. En multipliant les circonstances, on s'engage à partager entre un grand nombre d'objets son attention, qui en devient d'autant plus foible pour chacun d'eux. Si l'on employe une grande quantité de matieres, lorsqu'une moindre suffit; si l'on fait les frais de vaisseaux précieux, de machines bien fines, avant que d'avoir fait des essais qui en garentissent l'utilité, on se jette dans des dépenses superflues, & souvent on se met par-là hors d'état d'en faire d'autres qui seroient nécessaires, ou bien on en perd tout-à-fait le goût.

S'il faut beaucoup de patience pour observer, en faut-il moins pour faire des Expériences, lorsqu'elles demandent à être exécutées avec lenteur, & que leur réussite dépend d'une certaine dose, d'une mesure bien exacte, d'un dégré de seu toujours égal, ou de quelqu'autre précision incommode ou difficile à faisir? La préparation du Phosphore d'urine se

fur la Physique expériment. Ixxxiii trouvoit décrite depuis long-tems dans presque tous les Livres de Physique; malgré cela, cette opération, il y a vingt ans, étoit encore un secret réservé à deux ou trois Artistes, quoique nos plus habiles Maîtres eussent entrepris bien des fois de les imiter : c'est que ce travail est très-long, & qu'il exige les attentions les plus fines de l'Art, & celles qu'on nomme des tours de main parce qu'elles viennent moins de la réflexion que du hasard, de la dextérité, ou de l'habitude (a). Depuis Borrichius l'inflammation des huiles essentielles par l'esprit de nitre passoit pour une Expérience aussi difficile que curieuse; il paroît même que ceux qui réuffiffoient à la faire, ne se renfermoient pas rigoureusement dans les termes du Problême, puisqu'ils mêloient l'acide vitriolique avec l'acide nitreux : à force de réflexions & d'essais, un de nos meilleurs Chymistes (b) nous a appris depuis quatre ans, que pour opérer à

(a) Voyez un Mémoire de M. Hellot, dans le Vol. de l'Académie Royale des Sciences, pour l'année 1737.

(b) Consultez un Mémoire de M. Rouelle, dans le Vol. de l'Académie Royale des Sciences, pour l'année 1747.

lxxxiv Discours

coup fûr, il suffit de verser l'esprit de nitre à plusieurs reprises. Il saut avouer que le succès de cette Expérience tient à bien peu de chose, & que ceux qui l'ont manquée, pour avoir versé tout d'une sois, ont essuyé une disgrace un peu sorte pour une saute si légere. Le dégoût est encore plus grand & moins mérité, lorsqu'ayant surmonté toutes les difficultés qui se rencontrent dans le cours d'une opération, le Physicien la voit manquer par un accident imprévû qui la rend nulle, & qui oblige à la recommencer.

Mais je suppose qu'avec beaucoup de patience, d'attention & d'adresse nous ayons le bonheur d'arriver au but que nous nous étions proposé, nous en tiendrons-nous à une seule épreuve? Quelque certain que nous paroisse un premier résultat, il ne doit pas nous suffire pour former une décision de quelque importance : lorsqu'on veut être bien instruit d'une affaire, se contente-t-on d'entendre un seul témoin, s'il y en a plusieurs qui puissent déposer du même fait? Nous répéterons donc plusieurs fois la même Expérience, pour voir si l'effet qu'elle a montré d'abord se soutient constamment; & nous varierons nos procédés; fur la Physique expériment. Ixxxv pour sçavoir se que nous croyons avoir appris, résulte unanimement des uns & des autres, imitant en cela l'instinct de la Nature, qui fait agir plusieurs de nos sens ensemble, pour nous faire mieux juger des objets qu'il nous importe de connoître.

La vie & les facultés d'un homme ne suffiroient pas pour répéter généralement toutes les Expériences qui viennent à fa connoissance: on est souvent obligé de s'en reposer sur la foi d'autrui : mais, pour ne point donner sa confiance au hasard & trop légérement, il faut la régler suivant le mérite des Auteurs, & le soin qu'ils ont pris de nous motiver ce qu'ils nous proposent à croire. Il n'est pas prudent de se rendre au premier mot de ceux qui ne se sont point encore fait connoître; & quant aux Maîtres de l'Art qui pourroient en imposer par leur réputation, ce seroit en quelque façon en abuser, s'ils se dispensoient de dire comment ils sont arrivés à tel ou tel réfultat. Tout Physicien qui veut faire part de ses découvertes, doit donc exposer en détail de quelle maniere il a conduit ses Expériences, dans quelles circonstances il les a faites, & tous les effets qu'il a apperçus, avec lxxxvj Discours

leur nombre, leur grandeur, leurs différences, &c. & n'en supprimer que ce qui est visiblement inutile & capable de pro-

duire une fastidieuse prolixité.

Si ce n'est qu'à ce prix qu'on peut se faire croire en Physique, on doit sentir combien il est important de ne souffrir dans son travail aucune négligence, aucune manipulation vicieuse, qui puisse le rendre suspect. Ne nous mettons jamais dans le cas de dire, que nous n'avons pas vû par nous-mêmes les effets que nous annonçons: si nous nous faisons aider, soyons témoins de tout; qu'une révision bien exacte nous mette en droit de parler avec certitude de ce que l'on aura découvert en suivant nos vûes & sous notre direction; ne nous fions pas à notre mémoire, encore moins à celle des autres: dans une suite d'opérations, il y a tant à observer, tant à retenir, que le parti le plus fûr & le plus commode, est d'en tenir compte par écrit.

Après avoir exposé les principaux devoirs d'un Observateur & ceux d'un Physicien qui étudie la Nature par la voie des Expériences, je ne dois pas laisser ignorer qu'il faut à l'un & à l'autre, avec beaucoup de loisir & de santé, une

fur la Physique expériment. lxxxvii main adroite, un coup d'œil fûr, une grande connoissance des machines, & des ressources pour s'en procurer. La dépense qu'exige l'acquisition des Instrumens nécessaires, & la difficulté de les faire construire dans les lieux où l'on manque d'Ouvriers capables, est sans doute un des plus grands obstacles que l'on ait à furmonter dans la Physique expérimentale; mais leur choix, leur usage, leur entretien causent un tourment perpétuel à quiconque ne les connoît pas aussibien, je devrois dire, mieux que l'Artiste qui les a faits. Tous ces organes ont été imaginés par des Physiciens qui ont vêcu en différens tems, & qui ont eu différentes vûes; chacun d'eux y a fait les changemens qu'il a jugé les plus convenables, suivant ses lumieres. Il faut donc sçavoir pefer les raisons qui ont déterminé ces Auteurs, pour se fixer à telle ou telle construction; il faut juger qui est celui d'entre eux qui a le mieux penfé.

Ce n'est point assez qu'une machine soit exacte quand on la reçoit; il faut qu'elle soit construite de maniere à conferver sa justesse dans l'usage qu'on en sait. La meilleure balance devient sausse,

Ixxxviij Discours

si le fléau trop foible ou trop chargé; vient à plier fous les poids qu'on lui fait porter, parce qu'il est comme impossible que quand il se courbe, les deux points de suspension, en se rapprochant du centre de leur mouvement, conservent avec lui une parfaite égalité de diftance; un excellent Thermométre devient inutile ou trompeur dans un froid excessif, qui fait fortir l'air contenu dans les pores de la liqueur; cet accident en dérange tout-à-fait la marche. Le Phyficien intelligent ne se contentera donc pas du bon choix qu'il aura fait de ces instrumens; il aura soin de ne péser avec le premier, que des quantités de matiere proportionnées à sa force, & de ne porter l'autre que dans des refroidissemens incapables de le déranger : ou bien il en aura plusieurs du même genre, mais d'especes ou de grandeurs différentes, pour les affortir aux usages aufquels ils feront propres. Les deux exemples que je viens de citer doivent faire comprendre dans combien de cas de pareilles précautions sont nécessaires.

Mais ce que l'on trouvera peut-être de plus pénible & de plus embarrassant dans l'Art des Expériences, c'est l'en-

tretien

fur la Physique expériment. lxxxix tretien & la réparation des Machines. Les unes sont extrêmement fragiles, à cause de la transparence qu'on est bienaife qu'elles ayent. Quand elles périssent il faut attendre long-tems pour en tirer d'autres de la Verrerie; heureux celui qui sçait affujettir son Expérience à ce qu'il trouve tout fait dans le magafin d'un Fayancier, & adapter à la Phyfique des vaisseaux préparés pour un usage plus commun. Les autres sont d'une construction délicate qui demande beaucoup de ménagement : celles-ci font tellement compliquées, qu'il est difficile d'appercevoir par où elles manquent; celles-là doivent leur exactitude à des cuirs gras ou mouillés qui se desséchent; enfin la rouille, le vert de gris, l'action même des matieres qu'on employe, ou fur lesquelles on travaille, sont autant de dangers contre lesquels il faut scavoir être continuellement en garde : de forte que pour n'être pas rebuté des difficultés qui se rencontrent dans la Physique expérimentale, il faut être presqu'autant initié dans les Arts méchaniques que dans la connoissance des effets naturels.

Comme il est à souhaiter que les Commençans qui cherchent à s'instruire Tome I. par la lecture des Ouvrages de Physique; entendent les expressions de Géométrie & d'Algebre, qu'on y employe trèscommunément aujourd'hui; nous devons regarder aussi comme une chose nécessaire à celui qui veut étendre les progrès de la Physique, de posséder assez ces deux Sciences, pour s'en aider dans ses recherches, & pour évaluer ses découvertes: il y aura sans doute bien des occasions où il sera réduit au regret de n'en pouvoir faire usage; mais dans celles - là mêmes l'Esprit géométrique l'empêchera de s'écarter du vrai, en suivant des routes détournées, & lui fera voir les à peu près avec plus de justesse. Partout ailleurs les combinaisons, la mesure & le calcul, lui apprendront d'avance ce qu'il peut attendre de son travail, lui ouvriront de nouvelles vûes, & l'empêcheront de prendre de fausses apparences pour des réalités.

Après avoir recommandé de trèsbonne-foi l'application de la Géométrie à la Physique, après avoir reconnu de même que l'étude de la Nature n'a commencé que depuis cette heureuse union à faire de véritables progrès, oserois-je dire qu'il est dangereux pour un

sur la Physique expériment. xcj Physicien, de prendre beaucoup de goût à la Géométrie? On ne manquera pas de m'opposer des exemples vivans, qui me prouveront sans replique qu'on peut être en même tems excellent Géometre & très-habile Phyficien; mais ces bons modéles font-ils toujours imités ? Pour un petit nombre de ces Génies fages, à qui la gloire d'exceller dans une Science exacte, n'a pas fait perdre le goût d'une étude, où l'on ne trouve presque jamais, ni précision, ni certitude complette, & qui n'ont recours aux calculs, & aux expressions Géométriques, que quand l'importance des questions, la nature & la nécessité des preuves le demandent : combien n'en voyons-nous pas qui ne peuvent plus descendre des hautes spéculations où ils se sont élevés, qui dédaignent tout ce qui est au-dessous! Combien d'autres qui n'ont pas tant de chemin à faire pour fe mettre au niveau du commun, se plaisent à rendre en caracteres Algébriques, des vérités qui ne perdroient rien de leur valeur, quand elles feroient exprimées d'une maniere intelligible à tout le monde! De tels Ecrits bien apprétiés montrent assez clairement, que le peu

hij

xcij Discours

de Physique qui s'y trouve a servi de prétexte à une autre Science, dont on a

voulu faire parade.

Qu'il me foit permis, en finissant ce Discours, de faire des vœux pour certaines qualités du cœur, d'où dépendent, felon moi, le principal mérite & la plus solide satisfaction du Physicien. Je voudrois qu'il aimât la vérité par defsus tout, & que dans ses études, il eût toujours en vûe l'utilité publique : animé par ces deux motifs il ne produira rien qu'il ne l'ait examiné avec la plus grande févérité; jamais une basse jalousie ne lui fera nier ou combattre ce que les autres auront fait de bien : la vanité de paroître inventeur ne l'empêchera pas de fuivre ce qui aura été commencé avant lui; & ne le portera pas à s'occuper de frivolités brillantes, plutôt que de s'abaisser à des recherches utiles qui auroient moins d'éclat aux yeux du vulgaire.

Oui, je fais mille fois plus de cas de ces zélés Citoyens qui appliquent leurs lumieres & leurs talens à rendre potable l'eau qui ne l'est pas, à maintenir dans son état naturel celle qu'on embarque par provision, à purisier l'air dans les

Jur la Physique expériment. xcisj lieux où il est ordinairement mal sain. à rendre la Bouffole d'un fervice plus fûr, à perfectionner la culture des terres, à conserver le produit des moissons, quoique tous ces objets ayent été entamés; que de ces Sçavans orgueilleux, qui cherchent à nous éblouir par la grandeur apparente, mais fouvent imaginaire, ou par la singularité des sujets qu'ils entreprennent de traiter. Est-il un homme sensé qui puisse voir fans admiration, fans reconnoissance, un Philosophe illustré par les travaux les plus applaudis, & jouissant depuis long-tems de la réputation la plus grande & la mieux méritée, appliquer une partie de ses connoissances & de ses talens aux foins d'une ménagerie, quand il croit y voir un nouveau moyen de procurer l'abondance? Au risque de passer pour un simple imitateur dans l'efprit des gens mal instruits, il consacre généreusement à ces utiles recherches, des années de méditations & d'essais, pendant lesquelles il eût pû se flatter de pénétrer les fecrets de la Nature qui piquent le plus la curiofité des hommes.

C'est sur ces grands exemples que je youdrois voir les nouveaux Physiciens xciv Disc. sur la Physique, &c; fe former; si les forces nous manquent pour atteindre à cette supériorité de lumieres qui distingue ces hommes rares, allons aussi loin que nous le pourrons en marchant sur leurs traces, & surtout ayons la noble émulation de les égaler dans leurs vertus.

Fin du Discours.



EXPLICATIONS

De quelques termes de Géométrie employés dans cet Ouvrage.

A IRE, superficie ou espace ensermé dans une figure quelconque; l'aire du cercle, par exemple, est l'étendue qui est terminée par la circonsérence.

ANGLE, ouverture de deux lignes qui se rencontrent en un point comme AC, BC, fig. 1. le point de concours se nomme le sommet ou la pointe de l'angle. On distingue principalement trois fortes d'angles : sçavoir, l'angle aigu, l'angle droit, & l'angle obtus : l'angle aigu est celui dont l'ouverture embrasse moins que le quart d'un cercle qui auroit pour centre le sommet de l'angle, comme ACB, fig. 1. l'angle droit est celui dont l'ouverture embrasse justement un quart de cercle, comme ACD; & l'angle obtus est celui dont l'ouverture est plus grande qu'un quart de cercle, comme ACE.

Angulaire, qui a un ou plusieurs angles.

xcvj Explications.

Anguleux, ce terme est quelques fois employé pour signifier qu'un corps est tranchant par plusieurs endroits.

ARC, partie de la circonférence d'un cercle. Comme toute cette ligne est divisée en 360 parties égales, les arcs se distinguent entre eux par le nombre de ces parties ou dégrés qu'ils contiennent; ainsi l'on dit, un arc de 10, de 30, de 50 dégrés. Celui qui en contient justement 90, se nomme plus ordinairement quart de cercle; comme lorsqu'il en a 180, on l'appelle communément demicercle: tels sont les arcs, ABD, ADF, sig. 1. On donne aussi le nom d'arc aux parties de toutes les autres courbes qui ne sont point circulaires: on dit l'arc d'une parabole, d'une ellipse, &c.

ATMOSPHERE, vapeurs, ou exhalaisons qui fortent d'un corps, & qui l'entourent uniformément jusqu'à une certaine étendue; ce mot s'entend communément de la masse d'air qui enveloppe le globe terrestre, & qui reçoit tout ce qui s'exhale continuellement de la

terre.

Axe, ligne droite qu'on suppose immobile pendant que le corps qu'elle traverse fait sa révolution autour d'elle.

L'axe

L'axe d'une sphère ou d'un globe, est une ligne droite qui passe au centre, & qui aboutit à deux points opposés de la surface, qu'on nomme pôles. L'axe d'un cône est aussi une ligne droite qui commence au sommet, & qui aboutit au centre de la base, comme IK, fig. 2.

BASE, ce qui fert de fondement & d'appui à quelque corps ou à quelque machine; on appelle la base d'un cône ou d'une pyramide, le plan le plus bas qui les termine, comme le cercle repré-

senté par LMK, fig. 2.

CENTRE, milieu, ou l'endroit qui est également distant de toutes les parties opposées & correspondantes d'un même corps. Le centre du cercle est un point également éloigné de tous ceux qui composent la circonférence, comme C, fig. 1. Le centre d'une sphère ou d'un globe, est le point qui est également distant de toute la superficie. On donne quelquefois le nom de centre à un point qui n'est pas également distant de tous ceux qui terminent la figure; il suffit qu'il partage en deux parties égales tous ses diamétres : ainsi P peut être regardé comme le centre de l'ellipse représentée par la fig. 3.

Tome I.

xcviij Explications.

CERCLE, figure terminée par une ligne courbe, dont tous les points A, D, F, G, &c. font également distans d'un autre point C, qu'on nomme le centre, fig. 1. On est convenu de diviser tout cercle, petit ou grand, en 360 parties égales, qu'on nomme dégrés; de forte que ces parties font toujours proportionnelles, c'est-à-dire, plus grandes dans les grands cercles, plus petites dans les plus petits, mais toujours en même nombre dans les uns & dans les autres. Chaque dégré se subdivise en 60 minutes, chaque minute en 60 secondes, & chaque seconde en 60 tierces. Dans la sphère on distingue deux sortes de cercles, les grands & les petits. Les premiers font ceux dont le diamétre passe au centre même de la sphère, tels sont l'Equateur, l'Horizon, le Zodiaque, &c. On appelle petits cercles, ceux dont le plan ne partage pas la sphère en deux parties égales; ou, ce qui est la même chose, dont le centre n'est pas le même que celui de la sphère: tels sont les cercles polaires, & les deux tropiques.

CIRCONFERENCE, ligne courbe qui rentre sur elle-même, qui termine & renserme un certain espace; telle est la EXPLICATIONS. xcix ligne QTRS, fig. 3. ou ADFG, fig. 1. On confond affez fouvent le cercle avec fa circonférence; cependant, à parler exactement, la circonférence est une ligne qui termine, & le cercle est l'espace terminé.

CIRCULAIRE, qui a la forme d'un cercle, ou qui se fait en tournant autour d'un centre: le mouvement d'une

fronde est circulaire.

CONCAVE, qui est creux & rond: le dedans d'une calote ou d'un chapeau est concave.

CONCENTRIQUE, qui a le même centre; le cercle noh, fig. 4 est concentrique à NOH, parce que le centre C est commun aux deux.

Cone, corps solide formé par la révolution d'une ligne droîte sixée par un bout, & qui décrit par l'autre un cercle dont le rayon est plus petit qu'elle, c'est la forme qu'on donne communément aux pains de sucre; voyez la sig. 2. le point I se nomme le sommet ou la pointe du cône; la ligne IK, son axe; & le cercle LMK, sa base.

Conique, qui a la figure d'un cône, ou qui appartient au cône; les différentes figures qui naissent de la coupe

EXPLICATIONS.

d'un cône, se nomment sections coniques. Convergents, se dit de deux rayons de lumière qui tendent à se réunir en un point. Si AC, BC, sigure 1. étoient deux rayons de lumière qui partissent des points A&B, leur convergence seroit en C, & le degré de cette

de l'angle A C B.

Convexe, courbé ou cintré comme la furface extérieure d'un globe.

convergence seroit exprimé par la valeur

CORDE, en terme de Géométrie, est une ligne droite dont les extrémités terminent un arc de cercle comme NO, sig. 4. Cette ligne se nomme aussi soutendante. Si l'arc qu'elle mesure étoit la moitié de la circonférence, ou bien si elle passoit au centre du cercle, alors elle se nommeroit diametre.

COURBE, se dit d'une ligne dont toutes les parties ne sont pas dans la même direction, telle que l'arc ABD, sig.

1. On appelle aussi surface courbe, celle dont toutes les parties ne sont pas dans le même plan; telle est celle d'un globe, d'un cylindre, &c.

CUBE, corps solide régulier, terminé par six saces quarrées & égales: les dez à jouer sont de petits cubes:

voyez la fig. 5.

EXPLICATIONS.

CUBIQUE, qui a les dimensions d'un cube; un pied cubique exprime une quantité de matiére contenue sous six faces, dont chacune est d'un pied en quarré.

CURVILIGNE, qui est composé de

lignes courbes.

CYLINDRE, est un solide composé de plusieurs plans circulaires, égaux & concentriques: le premier & le dernier de ces cercles prennent le nom de base, & la ligne AB qui passe par tous les centres, se nomme l'axe du cylindre. Voyez la sig. 7.

CYLINDRIQUE, qui a la forme ou les dimensions d'un cylindre; ce qui doit s'entendre d'une cavité, comme d'un corps solide. Un corps de pompe doit être intérieurement bien cylindrique.

DIAGONALE, ligne droite qui va d'un angle à l'autre opposé, dans une figure à plusieurs côtés; telle est VX,

fig. 6.

DIAMETRE, ligne droite qui partage un cercle en deux parties égales, comme GD, fig. 1. On appelle aussi de ce nom les lignes qui passent par le centre des autres figures; comme ST, fig. 3. ou VX, fig. 6. On mesure les cercles par cij Explications.

leurs diamétres, comme aussi toutes les figures, & tous les corps réguliers qui sont composés de cercles; ainsi l'on compare les cylindres & les sphères par leurs diamétres.

DIVERGENTS, se dit de deux rayons de lumière qui partent d'un même point & qui vont en s'écartant l'un de l'autre, comme CA, CB, partant du point C, fig. 1. la divergence se mesure par la valeur de l'angle que sont les rayons en s'écartant.

EQUILATERAL, qui a ses côtés égaux, tel est le triangle CDF, fig. 8. composé de trois lignes égales; celui des côtés sur lequel le triangle est posé, se nomme sa base, & l'angle qui est opposé, s'appelle le sommet.

EXAGONE, qui a fix côtés ou fix faces: on dit un plan exagone, une py-

ramide exagone.

Excentrique, qui n'a pas le même centre; le cercle ohi, fig. 4. est excentrique aux deux autres de la même sigure, parce que son centre D n'est pas le même que le leur qui est en C; & la distance qui est entre C & D, est la mesure de cette excentricité.

GLOBE, est un folide régulier,

EXPLICATIONS. ciij dont tous les points de la surface sont également distans d'un centre commun,

fig. 9.

GLOBULE, petit globe: on se sert souvent de ce mot pour signifier un petit corps rond dans tous les sens; le mercure en se divisant se met en globules; les petites parties d'air paroissent dans l'eau en forme de globules.

HEMISPHERE, moitié de sphère ou de globe: on entend assez souvent par ce mot, cette partie de la terre qui est bornée par l'horizon rationel; le Soleil éclaire tous les jours notre hémisphère.

HORIZONTAL, paralléle à l'horizon: ce mot défigne la position d'un plan ou

d'une ligne.

INCIDENCE, signifie la chûte ou la direction d'une ligne sur une autre ligne ou sur un plan: on appelle angle d'incidence, celui qui est formé par cette rencontre.

LIGNE, est une suite de points qui se touchent: s'ils sont dans la même direction, ils sorment une ligne droite, comme EF, fig. 10. sinon ils sont une ligne courbe, comme EGF. On conçoit toutes les lignes courbes comme des assemblages de lignes droites infiniment

civ EXPLICATIONS.
petites, inclinées les unes aux autres;
Ef, fg, gh, ik, &c. fig. 10. en ce fens il n'y
a point de ligne courbe proprement dite.

OBTUS, se dit d'un angle qui a plus

de 90 degrés. Voyez ANGLE.

PARALLELE, se dit d'une surface ou d'une ligne qui, dans toute son étendue, est également distante d'une autre ligne ou d'une autre surface. Les lignes Xx & Vu, de la fig. 6. sont paralléles entr'elles.

PARALLELOGRAMME, figure plane dont les côtés opposés sont paralléles entr'eux: telle est la fig. 6.

PENTAGONE, figure plane, termi-

née par cinq côtés.

PERPENDICULAIRE, en parlant d'une ligne ou d'une superficie, signifie qu'elle se présente à une autre ligne ou surface, de manière qu'elle fait avec elle deux angles droits, ou au moins un; la ligne HI, sig. 11. est perpendiculaire à LM.

PLAN, étendue ou superficie droite & unie, terminée par une ou par plufieurs lignes droites ou courbes: la fig. 1. représente un plan circulaire, la fig. 6. représente un plan quarré.

POINT, étendue fort petite, dont

on confond les dimensions.

POLE, l'une des extrémités de l'axe autour duquel se font des révolutions. Les pôles du Monde sont les deux points immobiles autour desquels se fait le mouvement de toute la sphère.

POLYGONE, figure qui a plusieurs côtés; c'est le nom générique dont les espéces sont, le triangle, le quarré, le

pentagone, l'exagone, &c.

PRISME, corps folide terminé aux deux bouts par des plans polygones, égaux, femblables & paralléles, & dans fa longueur, par autant de parallélogrammes qu'il y a de côtés aux deux polygones qu'on nomme les bases. Quand ces deux bases sont des triangles, le prisme se nomme triangulaire, tel est celui qui est représenté par la sig. 12.

PRISMATIQUE, qui a la figure d'un prisme, ou qui a quelque rapport au prisme: on appelle verres prismatiques, ceux dont on se sert pour séparer les rayons de la lumière: on appelle aussi quelques couleurs prismatiques, les rayons colorés de lumière, qu'un pris-

me de verre fait appercevoir.

PYRAMIDE, corps solide qui a plusieurs faces, & qui s'élève en diminuant, fig. 13. Le cône peut être regardé comme une pyramide ronde.

QUADRILATERE, figure terminée par quatre lignes droites. La figure 6. est

un quadrilatère régulier.

QUARRÉ, figure à quatre côtés, qui a les quatre angles droits: si les quatre côtés sont égaux, elle se nomme quarré parfait; s'il y en a deux longs & deux courts, qui soient opposés entr'eux, elle se nomme quarré long; la fig. 6. est de la première espèce.

RAYON, en parlant d'un cercle, est une ligne droite tirée du centre à la circonférence; telle est CB ou CD, fig. 1. le rayon du cercle s'apppelle aussi demi-

diametre.

RECTANGLE, se dit d'une figure qui a un ou plusieurs angles droits: le triangle VXu, fig. 6. est rectangle, parce que l'un de ses angles u est droit.

RECTILIGNE, qui est composé de lignes droites; les deux triangles, ou le quarré de la fig. 6. sont des figures recti-

lignes.

SECTEUR, est un triangle formé par un arc & par deux rayons: tel est ABC, fig. I. Le secteur d'une sphère est un cône droit, dont la base aboutit au plan d'un segment. EXPLICATIONS. cvij
SEGMENT, est une portion d'une figure curviligne, terminée par un arc &
par une corde; OZN, fig. A. est un segment de cercle. On dit aussi segment de
sphère, pour exprimer la partie qui est
contenue sous une portion de la surface
convexe, & sous un plan qui ne passe
point par le centre; c'est en quoi le seg-

ment différe de l'hémisphère.

Sinus, est une ligne droite qu'on tire de la pointe d'un arc de cercle, perpendiculairement sur le diamétre qui passe par l'autre bout du même arc, & celuilà s'appelle sinus droit: comme HK, sig. 1. mais la partie du diamétre coupé par le sinus droit jusqu'à la circonférence, s'appelle sinus verse, ou stéche, KG; & le rayon entier, ou demi-diamétre, est le sinus total, ou le plus grand de tous les sinus.

SPHERE. Voyez GLOBE.

SPHERIQUE, qui a la figure d'une sphère, comme une balle parsaitement


ronde de toutes parts.


SPHEROÏDE, corps folide qui approche beaucoup de la figure sphérique, mais qui n'est pas parfaitement rond de toutes parts, n'ayant point tous ses diamétres égaux; telle est la figure cviij EXPLICATIONS. qu'on attribue maintenant à la Terre.

TRIANGLE, figure comprise sous trois lignes qui forment trois angles, CDE, fig. 8. Les triangles reçoivent différens noms, suivant la nature des lignes & des angles qui les composent. Ainsi l'on appelle triangle rediligne celui qui est composé de lignes droites; curviligne, celui qui est formé par des lignes courbes; mixte, celui dont les côtés sont en partie droits & en partie courbes; restangle, celui qui a un angle droit; équilatéral, celui dont les trois côtés sont égaux, &c.

VERTICAL, se dit de ce point du Ciel qui répond directement au-dessus de notre tête, ce que l'on nomme autrement Zénith: une ligne qui tombe à plomb de ce point, est nécessairement perpendiculaire à l'horizon; c'est pourquoi l'on se sert quelquesois de ce mot pour exprimer une direction qui tombe à angles droits sur un plan horizontal.









LEÇONS DE PHYSIQUE

EXPÉRIMENTALE.

PREMIERE LEÇON.

PRE'LIMINAIRE.



A Physique est la science des corps: son objet est I. de les connoître par leurs Leçon. propriétés, par les effets qu'ils présentent à nos

fens, & par les loix selon lesquelles s'exercent leurs actions réciproques. C'est en quoi principalement elle différe de l'Histoire Naturelle, qui nous apprend seulement quelles sont les productions de la nature, & les différences sensibles qui les carac-Tome I.

2 Leçons de Physique térisent selon leurs genres & leurs espéces.

LEÇON.

Nous appellons Corps naturels toutes les substances matérielles dont l'assemblage compose l'univers. Ce que nous remarquons en elles d'uniforme & de constant dont nous n'appercevons pas les causes, nous le nommons propriété; & nous partons de-là comme d'un point fixe, pour expliquer les dissérens phénoménes, sans oser assurer que ce que nous donnons pour premiere cause physique, ne soit l'esse d'un autre principe qui nous est inconnu.

Si nous étions certains d'avoir entiérement pénétré la nature des corps; si nous sçavions, à n'en point douter, qu'ils n'ont point d'autres propriétés que celles qui sont déja parvenues à notre connoissance, nous pourrions nous flatter avec raison d'en avoir une idée complette, & nous n'aurions plus que des applications à faire pour rendre raison des effets naturels, qui sont l'objet de notre étude. Mais il s'en faut bien que nous puissions le présumer; rien ne nous met en droit de faire une pareille supposs-

Expérimentale. tion; l'expérience qui nous a appris ce que nous sçavons de ces propriétés des corps, bien loin de nous dire Leçon. qu'elle n'a plus rien à nous faire connoître, semble au contraire nous annoncer une source intarissable de nouvelles découvertes, par celles mêmes que nous faisons tous les jours.

Quoique la Physique ne puisse pas se vanter de sçavoir tout ce que les corps ont de commun entre eux, ou tout ce qu'il y a de particulier en chacun; elle connoît cependant un certain nombre d'attributs, qu'elle regarde comme primitifs jusqu'à ce qu'elle apperçoive une cause premiere dont ils soient les effets, & qui fe trouve généralement & d'une manière absolue dans tout ce qui est matiére. Telles sont, par exemple, l'étendue actuelle, la figure en général, la mobilité, &c. qui accompagnent tous les corps d'une maniere inféparable, dans quelque état ou dans quelque circonstance qu'ils puissent être.

Il est des propriétés d'un ordre inférieur, qui ne conviennent à tous

4 LECONS DE PHYSIQUE

LEÇON.

eles corps qu'autant qu'ils sont dans certains états ou dans certaines circonstances : celles-ci pour l'ordinaire ne sont que des combinaisons des premieres, & forment une seconde classe. Telle est, par exemple, la liquidité, qui dépend probablement de la mobilité respective des parties, de leur figure, de leur grandeur, &c. elle ne convient qu'aux matiéres qui sont dans cet état qui les fait nommer liqueurs : elle appartient à l'eau qui peut couler, & point à la glace, quoique ce soit le même corps.

Enfin, ces propriétés du premier & du fecond ordre, se combinent de plus en plus, & conviennent à un nombre de corps d'autant moindre: alors elles ne s'étendent plus à tous comme les premieres ; elles n'embraffent point certains états comme les fecondes; elles fe bornent à des genres, à des espéces, aux individus même. Telles sont plusieurs propriétés de l'air, du feu, de la sumiere, des métaux, de l'aimant, &c. Nous allons traiter d'abord des propriétés les plus générales; & nous descendrons ensuite dans le détail de

EXPERIMENTALE. 5 celles qui sont particulieres à certains = corps.

I. Leçon.

PREMIERE SECTION.

De l'étendue & de la divisibilité des Corps.

C E qui se présente le premier à nos idées, ou du moins à nos sens, quand nous examinons les corps qui nous environnent; c'est leur étendue; c'est-à-dire, une grandeur limitée d'une saçon quelconque, à laquelle on conçoit des parties distinguées les unes des autres.

L'étendue matérielle dont il s'agit ici, a trois dimensions, longueur, largeur, & prosondeur, que les Géométres considérent & mesurent séparément l'une de l'autre, mais qui sont inséparables en Physique; car le plus petit corps est solide; il a au moins deux surfaces réellement distinguées; & comme la prosondeur est composée de surfaces, & que les surfaces résultent d'un assemblage de lignes, A iii

il s'ensuit que le moindre de tous les corps est long, large, & prosond.

LEÇON.

Tous les grands corps, je veux dire ceux dont l'étendue est assez grande pour être visible ou palpable, peuvent se partager en plusieurs portions, qui décroissent toujours de grandeur, à proportion que la division augmente, jusqu'à ce qu'ensin chacune d'elles échappe à nos sens. C'est ainsi que la lime réduit comme en poudre, un morceau de métal que le ciseau a séparé d'une plus grosse masse.

Quelque petites que nous paroiffent alors ces portioncules de matiére, on se persuade aisément qu'elles sont encore divisibles: les Arts nous font connoître par mille procédés disférens, que ces petits corps sont euxmêmes des assemblages de molécules ou petites masses séparables les unes des autres; le grain de froment que la meule met en farine, se subdivise encore bien davantage dans l'eau qui l'aide à fermenter.

Ces molécules elles-mêmes qui ne font fensibles que lorsqu'elles sont plusieurs ensembles, & que nos yeux peuvent à peine distinguer les unes EXPERIMENTALE.

des autres avec le meilleur microscope, se décomposent encore en bien des occasions, & nous font connoître Leçon. d'une maniere évidente, qu'elles ont des parties qui peuvent être séparées les unes des autres, & qui bien souvent ne se ressemblent pas. Un morceau de bois mis au feu ; cesse bientôt d'être du bois : non-seulement les molécules qui composent sa masse, se désunissent; mais les parties même que la nature avoit liées ensemble pour former ces molécules, cédent aussi à l'action du feu, & paroissent séparément sous la forme de fumée, de flamme, de cendres, &c.

Enfin, ces dernieres parties, fouvent différentes entre elles, mais dont l'union formoit de petites masses semblables dans un même tout; ces parties, dis-je, ne sont point encore des êtres que nous puissions regarder comme absolument insécables. Quoiqu'on leur donne quelquefois le nom de principes, c'est plutôt une dénomination d'usage, qu'un titre fur lequel on puisse s'appuyer pour leur attribuer l'indivisibilité physique. On a raison de croire que

Aiv

8 Leçons de Physique

dans l'état où elles se présentent ordinairement, elles n'ont point acquis
le dernier dégré possible de petitesse;
elles ont leurs Elémens, & ces Elémens
sont encore de nature différente dans
plusieurs: tel est, par exemple, le soufre qu'on regardoit autresois comme
une de ces substances inaltérables,
employées par la nature dans la composition des corps, & qu'une Physique

Mem. de plus éclairée trouve encore le moyen PAc. 1704. de décomposer, & même d'imiter.

Mais quand nous avons épuifé tous nos efforts pour diviser une matière, que les procédés nous manquent, & que l'expérience refuse de nous éclairer; que devons-nous penser de la divisibilité des corps ? & quelle doit être la régle de nos conjectures ? devons-nous croire que tout est fait; que nous avons poussé la nature jusques dans ses derniers retranchemens, & que nous sommes arrivés à ces petits corps simples, avec lesquels on peut croire qu'elle a commencé l'ouvrage que nous avions entrepris de décomposer?

Il y auroit de la présomption à le penser; & les difficultés même que EXPÉRIMENTALE.

nous avons trouvées dans nos tentatives, doivent au moins nous faire soupçonner le contraire. Quand nous entreprenons de diviser un corps, l'exécution en devient de plus en plus difficile, à mesure que les parties divisées décroissent de grandeur : c'est que nous ne pouvons les séparer, qu'en faisant agir entre elles une matiere étrangere qui les désunisse, ou en les faisissant extérieurement pour les forcer à se séparer : plus elles deviennent minces, moins elles donnent de prise aux moyens qu'on employe; & leur défunion est d'autant plus difficile, qu'elles se ressemblent davantage, ou qu'elles approchent plus de la premiere simplicité, soit qu'elles se touchent alors par des surfaces plus analogues, soit qu'il se trouve peu de corps plus durs & plus petits qu'elles pour les entamer. Il est donc tout naturel de croire que quand une matiére ne se divise plus, c'est bien moins parce qu'elle n'a plus de parties à diviser, que parce qu'il n'y a plus rien d'assez subtil pour interrompre sa continuité.

La matiere est-elle donc divisible à l'infini?

LECON.

10 LEÇONS DE PHYSIQUE

Ce que nous avons dit jusqu'ici n'engage point à le conclure; & cette Leçon. question qui fait tant de bruit dans les Ecoles, paroît se réduire à peu de chose, quand on veut s'entendre. Car s'il s'agit d'une divisibilité purement idéale, il est évident qu'on peut répondre par l'affirmative; puisqu'alors tout se réduit à sçavoir si l'on conçoit toujours comme divisible un corps, quelque divisé qu'il puisse être : or il est certain qu'on le conçoit ainsi; on imagine encore deux moitiés dans la plus petite particule: les surfaces qui la renferment, quoiqu'infiniment rapprochées, ne se confondent jamais; & l'on pourra toujours dire la même chose à chaque nouvelle division qu'on voudra feindre. Cette divisibilité imaginaire n'a donc point de bornes; de forte que si l'art & la nature s'entendoient pour exécuter tout ce que nous pouvons penser, on pourroit trouver dans l'aîle de la plus petite mouche un nombre de parties qui égaleroit enfin celui des grains de sable qui se rencontrent sur les bords de tout l'Océan : proportion qui ne peut paroître paradoxe qu'à ceux

EXPÉRIMENTALE. qui confondroient la comparaison de nombres (qui est la seule dont il s'agit ici) avec celle des grandeurs matérielles.

I. LECON.

Mais la nature est-elle aussi féconde que notre imagination? Ce que nous concevons comme possible, a-t-il lieu dans le réel? Ces petites portions d'étendue qui se touchent sans se confondre, pour être réellement distinguées l'une de l'autre, font-elles pour cela actuellement divisibles? Ont-elles jamais exifté, ou est-il même de leur nature de pouvoir exister séparément l'une de l'autre! C'est sur quoi l'expérience n'a rien prononcé de certain; & comme en matiere de Physique les preuves tirées des faits font les seules qui éclairent, on peut dire que cette question est indécise.

Cependant plusieurs Philosophes en supposant des bornes à cette divisibilité physique, ont pris le parti de dire que les Elémens des Corps étoient absolument insécables, & que la nature même en les formant, s'étoit imposé comme une loi de ne les jamais diviser. Ils citent pour preuve une expérience de six mille ans ; c'est pour

cela, difent-ils, que l'état naturel des

choses a toujours subsisté le même depuis sa premiere origine; un chêne est toujours un chêne; un cheval est aujourd'hui ce qu'il étoit au commencement; si les germes, ou ce qui constitue chaque nature en particulier, étoit quelque chose de divisible, la nature en général n'auroit-elle pas changé de face, par les différentes mutations qu'auroient soussertes

espéces particulières?

Quoique j'aie plus de penchant pour admettte les Atomes ou Corpufcules insécables, que pour supposer la matière physiquement divisible à l'infini; je ne puis dissimuler cependant que l'argument que je viens de citer, tout spécieux qu'il est, n'a point assez de force pour décider la queftion, & qu'on y peut répondre validement. Car, quand bien même ces petits Etres, production immédiate de la création, ne seroient point infécables, comme on le suppose, l'Auteur de la nature n'auroit-il pas pourvû suffisamment à la durée de ses œuvres, en ne laissant dans le monde que des moyens impuissans pour en dé-

EXPÉRIMENTALE. 13 ranger l'œconomie ? Que l'on prouve donc que l'indivisibilité absolue des parties primordiales est la seule Leçon. voie qu'ait dû prendre la fagesse du Créateur, pour rendre chaque espéce inaltérable. Mais si cette admirable uniformité avec laquelle nous voyons que la nature se reproduit tous les jours, n'est point une preuve invincible de l'existence des Atomes; elle doit au moins faire penser que nous ne devons pas nous promettre si légérement de changer, selon notre gré, une matière en une autre; tous les moyens que l'art pourroit nous fournir pour de semblables opérations, ne feroient que de foibles imitations de la nature, des digestions, des fermentations, des calcinations, &c. & si la nature elle-même depuis son origine s'est conservée constamment, & fans aucun changement, malgré tous les mouvemens qui se sont opérés & qui s'opérent tous les jours dans son propre sein; devons-nous nous flater de faire des miracles dans nos Laboratoires? La Chymie plus sçavante

aujourd'hui qu'elle n'a jamais été, abandonne par cette raison même,

de plus en plus ces fortes de prétentions chimériques, pour s'attacher à des opérations d'une utilité plus réelle. Elle décompose, le plus qu'elle peut, les productions naturelles, pour en connoître les propriétés; elle en fait des Extraits qu'elle tourne à nos usages; & si elle cherche à imiter la nature, ce n'est plus en essayant de composer des matières qu'elle ne se

De ce que nous venons de dire touchant la divisibilité des Corps, il résulte, 1°. qu'il n'y a point de bornes à cette division mentale, qui n'exige dans la matière qu'une distinction réelle de parties; 2°. que la divisibilité physiquement possible ou non possible à l'infini, n'est qu'une affaire de système, où l'on trouve des probabilités pour & contre; 3°. qu'on ne peut nier au moins une multiplicité de parties actuellement séparables, & si petites, que leur nombre & leur ténuité surpassent de beaucoup les idées communes.

flatte pas même de bien connoître.

La dernière de ces trois propositions est la seule qui soit susceptible de ce genre de preuves auquel nous EXPÉRIMENTALE. 15 nous bornons dans cet ouvrage J'en appelle donc à l'expérience, & j'entreprens de faire connoître par des faits dignes de curiosité, ce que l'on doit penser de la prodigieuse divisibilité des Corps.

I. Leçon.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

QUE l'on établisse sur trois petits cloux, ou d'une maniere équivalente, une pièce mince de monnoie, de cuivre, ou d'argent: & qu'on allume dessous & dessus de la sleur de Soufre, ainsi qu'il est représenté par la Figure 1.

EFFETS.

Par cette opération dont on dit que certaines gens abusent pour altérer la monnoie, la piéce se sépare en deux selon son plan; & fort souvent l'une des deux parties plus mince & plus cassante, laisse encore l'autre assez bien marquée pour ne paroître pas sensiblement diminuée.

16 Leçons de Physique

EXPLICATIONS.

I. Leçon.

Un Corps est divisé, quand la liaifon de ses parties est interrompue par
une matière étrangère, & qui n'est
pas propre à s'unir avec elle : c'est
ainsi qu'une lame de couteau sépare
un morceau de bois en deux. La partie la plus subtile du Sousre qui se développe en brûlant, & qui s'insinue de
part & d'autre entre les parties du
métal dilaté par le seu, forme dans
l'intérieur de la pièce, & selon son
plan, une couche de matière étrangére au métal, qui cause la division, &
qu'on apperçoit, quand les parties sont
séparées.

APPLICATIONS.

La même cause qui désunit les surfaces liées, les empêche aussi de se joindre, quand bien même elles auroient pour cela toutes les dispositions nécessaires: c'est donc par cette raison, qu'on employe les huiles & les graisses pour tenir séparées des matiéres dont on veut empêcher l'union ou le mêlange; quelque chose d'humide, pour prévenir l'adhérence de celles

EXPÉRIMENTALE. celles qui sont grasses; des poudres absorbantes, quand il régne sur les superficies une fluidité qui les feroit s'attacher. Ainsi, pour nous servir de quelques exemples familiers, nous ferons remarquer qu'on employe le beurre à froid & par couches dans les pâtes qui doivent être feuilletées; que l'on enduit de quelque matiére liquide l'intérieur des moules où l'on doit couler la cire, le foufre, &c. & que l'on pose sur du fable sec les vaisfeaux nouvellement formés dans les manufactures de porcelaines ou de fayance. C'est aussi pour cette raison, que dans les Arts on a grand soin de bien nétoyer les furfaces qu'on veut assembler à demeure.

L'usage des colles & des soudures n'est point un argument qui démente cette proposition; quoique ce soit interposer une matière étrangère entre les parties qu'on veut joindre.

Ce qui fait principalement qu'une couche d'eau interposée, par exemple, entre deux morceaux de cire entretient ordinairement leur défunion, c'est que l'eau n'étant point propre à pénétrer dans les Corps gras, & ne

Tome I.

I. Leçon.

18 LEÇONS DE PHYSIQUE s'y appliquant même qu'imparfaitement, son interposition ne peut point leur servir de lien commun. Mais il n'en est pas de même d'une colle qui peut pénétrer tant soit peu dans les piéces qu'elle doit attacher ensemble; c'est un Corps fluide, quand on l'employe, & qui par cette raison se moule de part & d'autre dans les creux insenfibles des surfaces; mais bien-tôt il devient solide, parce que son humide l'abandonne, & qu'il pénétre plus avant; alors ces petits liens multipliés presqu'autant de fois qu'il y a de petits vuides entre les parties solides des furfaces, font une adhérence très-considérable. C'est par le même principe, quoiqu'un peu différemment, que les foudures servent à lier les métaux ; un mêlange de plomb & d'étain, par exemple, mis en fusion par l'attouchement d'un fer chaud, pénétre dans les premieres surfaces du métal dilaté par la même chaleur; un promt refroidissement donne lieu à ses parties de se rapprocher; la soudure qui perd en même tems sa fluidité, se trouve adhérente de part & d'autre, sert de lien commun aux piéces, & les joint.

II. EXPERIENCE.

I. Leçon.

PREPARATION.

Dans un verre à boire on met des petites feuilles de cuivre : dans un autre verre semblable on met un peu de limaille de fer ou d'acier ; on verse dans l'un & dans l'autre une demi-once d'eau-forte. Voyez les Figures 2. & 3.

EFFETS.

Dans le premier vaisseau il se fait un petit bouillonement; le métal paroît agité; son volume diminue en apparence; la liqueur s'échausse; elle prend une couleur verte; les seuilles disparoissent ensin; & l'on apperçoit une vapeur qui s'éleve au-dessus du verre. Dans l'autre vase on remarque des effets à peu près semblables, mais plus prompts, plus violens, & la couleur approche du rouge.

EXPLICATIONS.

Les parties de l'eau-forte qu'on Bij I. Legon.

20 LEÇONS DE PHYSIQUE peut considérer comme autant de petits tranchans, ou de petites pointes fort aiguës, sont portées entre les parties du cuivre & du fer, par une force dont la connoissance partage encore les Physiciens, & sur laquelle l'expérience n'a point encore prononcé d'une maniere décisive ; chaque petite masse pénétrée de toutes parts, disparoît peu à peu par la division de ses parties qui nâgent indépendamment l'une de l'autre dans la liqueur qui les a désunies, & qui, par leur mêlange, paroît fous une couleur qu'elle n'avoit pas avant l'opération. La chaleur qui naît pendant la dissolution est une suite naturelle du mouvement des parties & de l'action d'une matière fur l'autre : comme aussi la vapeur qui s'éléve sensiblement, est un effet de la chaleur augmentée.

La même chose s'opére dans l'autre verre avec plus de promptitude, & avec plus de violence; la principale raison de cette différence, c'est que l'eau-forte dont on se sert dans ces deux opérations pour diviser les masses, a plus lieu d'exercer son ac-

EXPÉRIMENTALE. tion sur le fer réduit en limailles, que fur le cuivre qu'on a laissé en feuilles; elle agit d'autant plus qu'elle est appliquée en même tems à plus de furfaces; or les quantités de matiéres étant égales, celle-là présente plus de superficie, qui est plus divisée. Supposons, par exemple, une once de fer rassemblée en une petite masse sphérique; si l'on coupe ce petit globe par son diamétre, on augmentera sa surface; car il n'aura pas moins qu'auparavant celle de ses deux hémisphéres; mais il aura de plus celle qu'on aura fait naître par fa coupe diamétrale : & si l'on multiplie les coupes, il est aisé de voir qu'on augmentera de plus en plus sa superficie.

Une raison qu'on peut ajouter, c'est que le cuivre, à volume égal, est plus pesant que le ser; il y a donc plus de vuide dans le dernier de ces deux métaux, & par conséquent plus d'accès à l'eau-sorte; toutes choses étant égales d'ailleurs.

Quant aux couleurs que prend la liqueur par ces dissolutions, ce n'est point ici le lieu d'en parler; nous I. Leçona expliquerons ces fortes d'effets en Leçon.

Leçon.

APPLICATIONS.

L'EAU commune fait à l'égard d'un grand nombre de corps, ce que l'eau forte opére sur les métaux; elle divife les terres, les fels, les fucs des plantes, &c. elle se charge de leurs parties divisées, & elle les tient séparées, tant qu'elle est en quantité suffisante pour empêcher qu'elles ne se rejoignent. Les riviéres ne paroissent troubles après les pluies ou après les fontes de neiges, que parce qu'elles reçoivent alors dans leurs lits des eaux qui font chargées de fable & de terre. Les fources minérales prennent leurs différentes qualités des matiéres qu'elles contiennent en particules si subtiles, que leur transparence n'en est point altérée; & la mer est salée, selon l'opinion commune & la plus vraisemblable, parce qu'elle dissout des mines de sels qui fe rencontrent dans fon lit, comme il s'en trouve dans les autres parties de la terre.

Ces sortes de dissolutions ne dé-

EXPÉRIMENTALE. 23 composent point les corps; elles ne font rien autre chose que diviser leurs masses, & rendre indépendantes les unes des autres leurs molécules ainsi désunies. L'art nous fournit même des moyens très-faciles pour les remettre dans leur premier état; il suffit le plus souvent d'évaporer la liqueur qui les tient en dissolution : & c'est la voie la plus simple, quand leurs parties sont moins évaporables que celles du dissolvant. Cette pratique est en usage pour séparer le sel de l'eau dans les Salines, pour tirer le salpêtre des lessives qui le contiennent, pour rafiner les sucres, pour augmenter la force des bouillons qu'on nomme consommés, & généralement pour épaissir toutes les matiéres, où la partie liquide est trop abondante.

On peut encore rassembler ce qui est dissous en le précipitant; ce qui ne manque pas d'arriver toutes les fois qu'on présente au dissolvant une matiere plus pénétrable pour lui, que celle dont il est chargé; car alors en entrant dans la nouvelle masse, il dépose les autres parties que leur pro-

I. EÇON. pre poids raffemble au fond du vase:

c'est ce qu'on voit arriver, par exemple, quand on verse de l'esprit-de-vin sur de l'eau qu'on avoit rassassée de sucre; parce que l'un de ces deux liquides pénétre l'autre, & abandonne les parties de sucre dont il étoit

chargé.

Quand on précipite ainsi les métaux, on le peut faire d'une façon curieuse, & qui n'est que trop capable d'en imposer à ceux qui ne sont point instruits de ces sortes de faits. Si, par exemple, on trempe une lame de fer dans une dissolution de cuivre ou de vitriol bleu avec l'eau-forte ; le dissolvant agira par préférence sur le fer, & déposera des parties de cuivre en la place de celles qu'il détachera de la masse de fer, de sorte qu'à la fin de l'opération on pourra tirer du vaisseau une lame de véritable cuivre : mais c'est abuser de cette expérience, que de la proposer comme un procédé pour convertir le fer en cuivre; puisqu'on ne retire jamais de ce dernier métal, que ce qu'on en avoit fait entrer dans la premiére disfolution, supremental serious sol slou

Les

EXPÉRIMENTALE. 25

Les infusions à proprement parler, ne sont encore que des dissolutions ordinairement plus lentes, avec cette différence qu'au lieu de faire disparoître toute la masse, elles en détachent seulement une certaine portion.

Les corps qu'on fait infuser sont pour l'ordinaire composés de parties de différentes natures : la liqueur qui les pénétre, se charge de celles qui cédent à son action; & les autres qui s'y refusent, demeurent liées sous un volume qui différe peu de celui qu'elles avoient. Le bois d'Inde, celui de Brésil, &c. trempés dans l'eau commune, lui abandonnent un certain suc que la nature a placé entre les fibres de ces sortes de bois; cet extrait qui fait une teinture, ne laisse point appercevoir de diminution sensible quant au volume, dans les morceaux qui en sont dépouillés.

Les infusions deviennent bien plus promptes & plus chargées avec l'eau chaude : la chaleur augmente la liquidité de l'eau, & la rend plus pénétrante; elle dilate les solides qu'on y plonge, & les rend plus pénétrables; ces deux raisons concourent au mê-

Tome I.

I. Leçon.

26 LEÇONS DE PHYSIQUE me effet. Les racines & les fruits qu'on fait cuire pour servir d'alimens, ne se dépouilleroient point dans l'eau froide des sucs acres & des autres parties désagréables, qu'on leur ôte en

les faisant bouillir.

Quoique les dissolutions & les infusions qui ne font que diviser ou extraire, ne changent rien à la nature des parties qu'elles séparent & qu'elles détachent, cependant elles les rendent propres à des effets, pour lesquels on les appliqueroit en vain fans l'une ou l'autre de ces préparations. Quels fecours pourroit-on attendre de la plûpart des minéraux ou des végétaux qu'on emploie dans la Médecine, si une division beaucoup plus grande qu'on ne peut la faire avec aucun tranchant ordinaire, ne procuroit à ces mêmes corps une quantité de surface suffisante, des grandeurs & des figures convenables aux parties intérieures du corps animé sur lequel ils doivent agir ? Cette agréable variété de couleurs qu'on admire dans les étoffes & dans toutes les matieres susceptibles de teinture, ne vient-elle pas des infu-

EXPÉRIMENTALE. sions en plus grande partie? Des sucs qui se sont épaissis dans les plantes mêmes où la nature les a préparés, & qui y resteroient en pure perte pour nous, se ramollissent & s'étendent dans l'eau qui les pénétre ; ils s'impriment avec elle sur une surface préparée; l'eau s'évapore, & l'impression reffe.

LECON.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

La quatriéme figure représente une petite cassolette de verre, en partie pleine d'une liqueur odorante, comme de l'eau de fleurs d'orange, ou de l'efprit-de-vin chargé de l'odeur de lavande, & posée sur une petite lampe allumée.

EFFETS.

QUAND la liqueur commence à bouillir, il fort par le bec de la caffolette une vapeur fort abondante qui se répand dans toute la chambre, & qui s'y fait sentir d'une extrémité à l'autre, fans cependant qu'il paroisse une diminution sensible dans le volume de la liqueur, lorsque l'expérience cesse après deux ou trois minutes.

Cij

28 LEÇONS DE PHYSIQUE

EXPLICATION.

I. Leçon.

La vapeur qui porte son odeur dans toute la chambre, n'est rien autre chose que la partie la plus évaporable de la liqueur, que le seu a séparée de la masse, « qu'il a extrêmement divitée : ces petits corps, nonobstant le peu de diminution qu'ils causent au volume qu'ils ont quitté, se trouvent en assez grand nombre pour se répandre également, « se faire sentir dans un très-grand espace.

Si l'on veut connoître de plus près ce nombre prodigieux de particules odorantes, & se représenter d'une maniere plus précise la division surprenante qu'a dû souffrir la petite quantité de liqueur évaporée; il suffit de la comparer au volume d'air contenu dans une chambre qui peut avoir 12 pieds en quarré sur 10 de hauteur. Quand ce peu de liqueur dont il s'agit, égaleroit deux lignes cubiques avant l'expérience, & qu'après l'évaporation, il ne se trouveroit que 4 particules dans chaque ligne

cubique d'air; (supposition qu'on peut faire en mettant les choses au EXPERIMENTALE. 29
pis;) que de millions de parties n'appercevra-t-on pas par cette comparaison, & par ce calcul qu'on peut faire facilement? Mais ces millions de parties, de combien ne seront-ils pas encore augmentés, si l'on fait attention que ce qui fait ici l'odeur sensiblement répandue, n'est que la moindre partie de ce qui s'est évaporé? Car dans une liqueur ou dans une vapeur odorante on doit distinguer les parties propres du liquide de celles dont il est parfumé.

APPLICATIONS

Les odeurs considérées par rapport à nos sens, sont des impressions faites sur l'organe par les Corpuscules qui s'exhalent des Corps odorans. Ce qui se passe en petit dans l'expérience qu'on vient de citer, nous l'éprouvons tous les jours en grand par divers essets naturels. Il régne sur notre globe un certain dégré de chaleur qui varie selon les tems & les lieux; ce seu que la nature entretient, & qui met tout en mouvement, joint à d'autres causes dont nous parlerons ailleurs, détache continuelle-

I. Leçon.

Ciij

I. Leçon.

30 LEÇONS DE PHYSIQUE ment les parties les plus subtiles de tous les Corps qui couvrent la surface de la terre: celles qui sont propres à se faire sentir par l'odorat, répandues & flotantes comme les autres dans la partie de l'Atmosphère qui en est chargée, se font d'autant plus sentir, qu'elles se trouvent en plus grand nombre dans un volume d'air déterminé. C'est par cette raison sans doute, que l'on sent mieux les fleurs d'un jardin le foir, lorsque l'air se rafraîchit, que dans le fort de la chaleur du jour. Cette fraîcheur qui condense l'air aux approches de la nuit, en rapprochant ses parties, reserre aussi davantage les exhalaisons dont il est chargé, & quand on le respire en cet état, il porte avec lui sur l'organe un plus grand nombre de ces parties. odorantes dont nous parlons.

Si la chaleur entretient toujours une quantité plus ou moins grande de mouvement dans tous les Corps, & qu'elle occasionne par-là, comme on n'en peut douter, une perte continuelle de leur substance; doit-on s'étonner que tout périsse avec le tems, & que certains Corps diminuent & EXPÉRIMENTALE. 31 s'évanouissent promptement? C'est ainsi que les étangs & les marais se desféchent, quand les pluies ou les sources ne réparent point l'évaporation.

I. Leçone

Mais pour nous renfermer dans des exemples pris des Corps odorans, ne le remarquons-nous pas d'une manière bien fenfible dans les plantes & dans les fleurs? Pourquoi pendant la grande chaleur s'affoibliffent elles jusqu'à plier sous leur propre poids? pourquoi le matin reparoissent-elles avec leur premiere vigueur? N'est-ce pas que ce qui s'exhale pendant le jour excéde la réparation qui vient du fein de la terre? Pendant la nuit il n'en est pas de même, les vuides se remplissent.

Quoique les plantes par leurs exhalaisons perdent une si grande quantité de leur substance, on ne peut pas dire pour cela, que la partie destinée aux odeurs ait beaucoup de part à leur dépérissement sensible. Il paroît par tous les autres corps de ce genre, que la nature les a soumis à une divisibilité si prodigieuse, qu'ils peuvent sournir à leur esset pendant des espaces de tems qui surprennent.

Civ

I. Leçon. Tout le monde sçait qu'un grain de musc se fait sentir d'une manière incommode pendant vingt ans, dans un appartement où l'air se renouvelle tous les jours. Ne sçait-on pas de même que des chiens courent un cers pendant six heures quelques ois, sans avoir le plus souvent d'autre guide que l'odeur qu'il laisse après lui? Combien donc de corpuscules cet animal laisset-il échapper, pour tracer si long-tems sa route à quarante autres animaux, à la vûe desquels il se dérobe souvent?

La plupart des bêtes, & sur-tout les chiens, ont l'odorat très - fin : la disposition de cet organe dont la partie principale est en dehors, & le fréquent usage qu'ils en font, contribuent sans doute à cette délicatesse que nous n'avons pas: la nature nous en a dédommagés par le toucher, que nous avons beaucoup plus exquis : c'est aussi de tous nos sens celui dont nous nous servons le plus, après les yeux, dans l'examen que nous faisons des différens objets qui se présentent: mais les animaux qui ne touchent que très-rarement par forme d'épreuve, examinent avec le nez ce que leur

EXPERIMENTALE. 33
vûe leur annonce d'intéressant; comme ils sont presque uniquement occupés du soin de leur nourriture, &
qu'il y a beaucoup d'affinité entre l'odorat & le goût, il convenoit qu'ils
sequssent mieux flairer que tâter.

I. Legone

IV. EXPERIENCE.

PREPARATION.

Au fond d'un grand vase de crystal, on délaye le poids d'un grain de Carmin, & l'on remplit d'eau bien nette le vase, qui tient dix pintes de Paris, & qui est représenté par la Figure cinquième.

EFFETS.

La couleur s'étend de maniere que tout le volume d'eau en paroît sensiblement teint.

EXPLICATION.


Le Carmin est une fécule, ou une espéce de lie très-fine, que l'on tire par infusion de la cochenille, & de quelques matières végétales; les parties qui ont été déja divisées par la préparation qu'on en a faite, cédent fort

34 Leçons de l'eau qui les péaisément à l'action de l'eau qui les pénétre & qui les étend; de manière qu'elles se partagent proportionnellement à toute la masse du fluide.

> Pour concevoir aisément combien la matière est divisée dans cette derniére expérience, il suffit de connoître le rapport du poids d'un grain à celui de vingt livres, qui est comme l'unitéà cent quatre vingt-quatre mille trois cents vingt. Mais une quantité d'eau pesant un grain, se présente encore sous un volume bien sensible. lequel, pour être coloré uniformément, doit contenir plusieurs particules de Carmin: quand on n'y en supposeroit que dix, le produit que nous venons de citer, se trouveroit augmenté encore de dix fois sa valeur; ce qui fera 1843200 parties sensibles dans un volume qui étoit bien peu considérable avant que d'être étendu dans l'eau.

> > APPLICATIONS.

C'est par des particules de matiéres ainsi divisées & étendues dans quelques liquides, que les Peintres & les Teinturiers donnent aux surfaces des corps, certaines couleurs



Dheutland delet o'culp.

TORES LUNCON LAND Fig.2.

Expérimentale. qu'elles n'ont pas naturellement. Celles qui sont peintes, toujours cachées fous l'enduit dont on les couvre, ne font plus visibles par elles-mêmes, mais par les couches dont le pinceau les a revêtues. Il n'en est pas de même de celles que l'on fait teindre; on les prépare pour l'ordinaire dans un bain qui, par la chaleur, & par l'action de certains sels, dilate les pores, & creuse une infinité de petites cellules propres à recevoir ensuite les parties colorantes; c'est principalement cette préparation qui rend les teintures durables, & qui empêche que les matiéres teintes ne se décolorent, quand on les lave. Ce n'est pourtant pas toujours des particules colorantes qui teignent les surfaces; nous ferons voir en traitant de la lumiere, que le changement de couleur dépend souvent d'un nouvel arrangement que prennent entre elles les parties mêmes des surfaces; comme quand l'eau-forte, par exemple, change le papier bleu en rouge, ou que la chaleur rougit

Outre les expériences que nous ve-

une écrevisse.

I. Leçon.

36 Leçons de Physique nons de citer pour prouver la divisibilité des corps; les arts nous offrent des pratiques ingénieuses qui la font connoître d'une maniere aussi évidente. On ne peut voir, sans être surpris, la prodigieuse ductilité de l'or & de l'argent. Les Ouvriers qui battent & qui filent ces métaux, leur procurent un dégré d'étendue qui s'est attiré depuis long-tems l'attention des *De mira Philosophes. Boyle * est un des presubtilitate ef-miers qui ait fait cette remarque, que le poids d'un grain d'or mis en feuilles peut couvrir une surface de 50 pouces quarrés. Cette observation donne lieu d'appercevoir par un calcul fort simple, un nombre étonnant de parties visibles dans cette petite quantité de métal. La longueur d'un pouce contient au moins deux cens parties visibles; puisque sur des instrumens de mathématique on le trouve quelquefois partagé par cent divisions, & qu'un Observateur un peu attentif peut fort aisément tenir compte des moitiés. En faifant donc cette supposition qui est très-recevable, une feuille d'or d'un pouce quarré, pourra se couper en deux

LECON.

EXPÉRIMENTALE. 37 cens petites bandes plates, & chaque = petite bande en deux cens petits quarrés; de sorte que toute la feuille Leçon. ainsi divisée, donnera quarante mille parties, qui est le produit de 200

multiplié par 200.

Mais dans un grain d'or battu, on trouve 50 petites feuilles semblables à celles que nous venons de diviser; on doit donc multiplier encore 40000 par 50, ce qui donnera deux millions pour la somme des parties que l'on peut compter avec les yeux dans une portioncule de matiére qui n'est que la 72°. partie d'un gros. Ce nombre, quelque prodigieux qu'il soit, fe trouve encore augmenté de moitié, quand on fait attention que chacune de ces particules d'or peut être vûe & touchée au moins par deux furfaces, ou par les deux plans opposés dont les dimensions sont égales.

Ce que les feuilles d'or & d'argent nous apprennent de la ductilité de ces deux métaux, & de la divisibilité surprenante de leurs parties, est encore bien au-dessous de ce que l'on remarque chez les ouvriers qui

LECON.

38 LEÇONS DE PHYSIQUE préparent le fil d'argent doré dont on se sert pour fabriquer les étoffes, le galon, la broderie, &c. Cet art où le commun des hommes ne trouve qu'un objet de commerce, ou des ressources pour le luxe, présente aux yeux d'un Philosophe, des merveilles qui n'ont point échappé aux observations de Boyle, du Pere Mersene, de Rohault, & de plusieurs autres Physiciens, dans ces tems où il n'étoit point encore arrivé au dégré de perfection qu'il a acquis depuis. M. de * Mem. de Reaumur * qui l'a examiné avec cette Sc. 1713. p. exactitude qu'on lui connoît, en a mieux que personne découvert les beautés, & fait connoître le véritable merveilleux. C'est d'après lui que je

> Avec une quantité de feuilles d'or, qui n'excéde jamais le poids de six onces, & qu'on diminue quelquefois presque jusqu'à une, on couvre un cylindre d'argent, d'environ 22 pouces de longueur, 15 lignes de diamétre, & du poids de 45 marcs. On fait passer ce rouleau doré successive-

> vais donner ici une idée de la prodigieuse extension dont l'or est capa-

ble, quand on le file.

l'Acad. des 205. &c.

EXPÉRIMENTALE. 39 ment par les trous d'une lame d'acier, qui vont en décroissant, de façon que s'allongeant aux dépens de son diamétre, il devient enfin aussi délié qu'un cheveu, & d'une longueur qui égale presque 97 lieues de 2000 toifes chacune.

Pendant cette opération l'or s'étend fur le fil d'argent à proportion de son allongement ; ensorte qu'on doit le considérer comme une enveloppe ou un fourreau dont les parties ne souffrent point d'interruption senfible. Ce fil doré que l'on nomme trait, passe ensuite entre deux rouleaux d'acier poli, qui l'écrasent en forme de lame fort mince, dont on enveloppe un fil de soie pour les usages des différens Arts qui l'employent; & dans l'opération des rouleaux, le trait s'allonge encore d'un 7°. Ainsi au lieu de 97 lieues que nous avons compté pour sa longueur, on en peut compter III.

En supposant donc du fil le plus légérement doré, voilà une once d'or que l'on doit considérer sous la forme de deux petites lames, dont chacune égale la longueur de 111

I. Leçon, LECON.

40 Leçons de Physique lieues, ou qui égalent ensemble 222 lieues. Mais si l'on fait attention que le trait en s'écrafant sous les rouleaux, prend la largeur d'environ un 8°. de ligne; & par conséquent les deux petites lames d'or qui revêtent l'argent de part & d'autre; on pourra partager encore leur largeur en deux parties; (car une ligne se divise fort bien en 16 portions sensibles;) ainsi au lieu de deux lames il en faudra compter quatre, qui égaleront en longueur 444 lieues. Dans une telle étendue, combien de toises, de pieds, de pouces, de lignes ! Et si l'on divise seulement chaque ligne en 10, quelle suite de chiffres ne faudroit-il pas pour exprimer la somme des parties visibles dans une once d'or étendu par la filiére? L'imagination se refuse presque à de pareils nombres ; mais pour s'en faire une idée, il suffira de comparer la surface de notre once d'or filé à celle d'une égale quantité du même métal en feuilles. La premiere est à la seconde dans le rapport de 2380 à 146; mais aussi l'épaisseur des feuilles, quelque petite qu'elle soit, est toujours beaucoup plus

EXPÉRIMENTALE. plus considérable que celle de la couche d'or qui se trouve sur le fil: l'une diminue à peine jusqu'à la trente millième partie d'une ligne; l'autre se porte souvent à un dégré de ténuité qui excéde la cinq cens vingtcinq millième partie d'une ligne.

L'art en filant ainsi les métaux, imite d'affez près la nature, quant au procédé. La foie avant que d'être filée pour nos usages, l'a déja été par les insectes qui nous la fournissent. La chenille, qu'on nomme communément ver à soie, porte une filiére naturelle, par laquelle elle moulle ce fil précieux dont elle fait sa coque. Des personnes * curieuses & attenti- * Boyle, de ves aux merveilles de la nature, con-mira subtilisidérant l'extrême finesse de cette cap. 2. matière, en mésurérent 300 aunes qui n'excédérent point le poids de 2 grains 1; & M. de Reaumur portant plus loin encore ses Observations, a trouvé que les fils des araignées, telles qu'elles les produisent immédiatement, & avant qu'elles les joignent pour en former leur toile, que ces fils, dis-je, font à l'égard d'un cheveu, moins gros que ne l'est le fil

Tome I.

Leçon.

trait doré à l'égard du premier cylindre dont il a été tiré; & que leur diamétre égale à peine l'épaisseur de cette légére couche d'or qui couvre le fil d'argent.

Les expériences & les observations que nous venons de rapporter prouvent suffisamment que tous les corps qui tombent sous nos sens, ne sont autre chose que des assemblages formés par le concours de plusieurs masses plus petites, dont chacune peut se diviser encore en particules sufceptibles elles-mêmes de division & de subdivision.

Lorsqu'en divisant une matière autant qu'il nous est possible, nous n'appercevons rien que d'uniforme dans toutes les molécules qui la composent, nous lui donnons le nom de simple; nous supposons que ses parties sont toutes d'une même nature, & nous les appellons homogénes, sans prétendre qu'elles le soient absolument, & jusqu'à ce que quelque découverte nouvelle en fasse un jour juger autrement.

Nous nommons au contraire corps

Expérimentale. 43 mixtes, ceux dont les parties mises à part ne se ressemblent point; comme les plantes, les animaux & quantité de minéraux, où l'analyse fait voir que plusieurs matiéres essentiel-Iement différentes (que l'on nomme hétérogénes) concourent à la compofition d'un même tout.

Les molécules infensibles qui forment une masse continue, sont souvent jointes ensemble de manière qu'il faut employer une force considérable pour les séparer : cette portion de matière se nomme un corps dur ou solide. Cette dureté, qui n'est, à proprement parler, qu'une tenacité plus ou moins grande des parties, & qui n'est jamais parfaite dans les corps que nous connoissons, puisqu'elle céde toujours à une force finie; cette dureté, dis-je, décroît jusqu'à la fluidité, c'est-à-dire, jusqu'à ce que l'adhérence naturelle des parties suffise à peine pour empêcher qu'elles n'obéissent librement à leur propre poids, quand il les follicite à se mouvoir les unes sur les autres, & à changer la figure de leur tout. Enfin la fluidité qui commence où

LEÇON.

Di

LECON.

44 LECONS DE PHYSIQUE les corps cessent d'être regardés comme solides, augmente jusqu'à la liquidité qui a elle-même des dégrés : on appelle corps liquides ou liqueurs, ceux qui font en cet état, où leurs parties ayant un mouvement libre les unes sur les autres, obéiffent avec une indépendance mutuelle aux efforts de leur pesanteur, ou à la moindre force qu'on emploie pour les féparer; & leurs caractéres les plus distinctifs sont de n'avoir d'autre figure, que celle qu'on leur fait prendre dans les vaiffeaux qui les contiennent, & de ranger leur plus haute surface dans un plan paralléle à l'horison. L'eau qui coule, par exemple, est une liqueur; la fumée qui s'éléve dans l'air, & qui change continuellement de forme, est un fluide; & la pierre que l'on taille à coups de marteaux, est un corps solide.

Nous nous contentons maintenant de définir ces différens états des corps naturels, parce que nous aurons occasion d'en parler plus amplement ailleurs en examinant leurs

causes.

I. Legona

II. SECTION.

De la figure des Corps.

To us les Corps ont une grandeur déterminée, non-feulement ceux dont les dimensions frappent nos sens, mais aussi les parties de ces mêmes Corps, à tel dégré de ténuité qu'on les porte par la division, & sous tel ordre qu'on les considére. La petitesse n'est point une qualité absolue; rien n'est petit que par comparaison à quelque chose de plus grand; & quand on supposeroit le moindre de tous les Etres matériels, il surpassera toujours en grandeur chacune de ses deux moitiés.

La grandeur, ou (ce qui est la même chose) l'étendue plus ou moins grande d'un Corps, est toujours limitée par des surfaces qui renserment la quantité de matière qui lui est propre; cette quantité de matière fe nomme sa Masse, & le plus ou le moins de surface non interrompue qui limite sa grandeur apparente, s'appellate se Masse.

le son Volume.

I.. Leçon.

L'ordre ou l'arrangement que prennent entre elles les furfaces qui terminent le volume des Corps, est ce qu'on nomme leur Figure. Comme ces furfaces ne peuvent se consondre, & qu'elles se distinguent toujours par des situations relatives, il est évident que d'être figuré, est une propriété aussi commune à tous les Corps, que celle d'être solidement étendu, ou d'avoir plusieurs parties réellement distinguées.

Mais ces surfaces peuvent varier à l'infini par leur grandeur, leur nombre, l'eur arrangement respectif; c'est pourquoi toutes les substances matérielles à qui il convient essentiellement d'avoir une figure en général, reçoivent celle-ci ou celle-là en particulier, & elles sont aussi variables & peut-être aussi variées entre elles, qu'il est possible de combiner ensemble la grandeur, le nombre & l'ordre des superficies.

Cette propriété qu'on pourroit nommer Figurabilité, s'étend à tous les Corps d'une manière si générale qu'elle les accompagne dans toutes fortes d'états; elle convient à ceux qui se

EXPÉRIMENTALE. 47 meuvent comme à ceux qui font en repos; elle convient non-seulement aux folides, mais les fluides & les li- LEGON. queurs ont aussi leur figure qui dépend des obstacles qu'on oppose à leur épanchement; la mer, les étangs, les riviéres sont figurés par leurs côtes & par leurs rivages; le vin, par fon tonneau; la flamme & la fumée, par l'air qui les environne, &c.

Quand au premier coup d'œil deux: Corps paroissent terminés de même, on dit alors qu'ils se ressemblent en sigure: ainsi nous appellons cubes less dés d'un trictrac, parce qu'au premier aspect chacun d'eux se présente fous fix faces égales; & nous appel-Ions femblables deux foldats vêtus du même uniforme. Mais cette premiére ressemblance a des bornes fort étroites : elle ne s'étend qu'à certains caractères généraux qui soutiennent à peine la premiére vûe ; un examen plus détaillé découvre bientôt une infinité de différences, jusques dans les individus de la derniére espéce ; de forte qu'on pourroit dire avec juste raison, que dans toute la nature il est probable qu'il n'y a pas deux Etres

I. Leçon. 48 LECONS DE PHYSIQUE parfaitement semblables, sur-tout fi l'on joint à la variété de figure celle de la couleur & du volume. Lorsque nous jettons les yeux fur un troupeau de moutons, ils nous paroissent tous fe ressembler, parce que nous nous arrêtons aux premiéres apparences; mais le berger à qui l'habitude a fait appercevoir des variétés, les distingue bien les uns des autres. Dans une foule de peuple nous ne trouvons pas deux visages semblables, & nous y distinguons entre dix mille les traits d'une personne que nous cherchons, par l'usage où nous sommes de voir des hommes, & d'apprendre à ne les point confondre.

Cette prodigieuse variété de figures multipliées sans sin pour ceux qui observent plus attentivement, ne convient-elle qu'aux grands Corps, c'est-à-dire, à ceux que nous pouvons voir & toucher sans aucun secours de l'art? ou bien convient-elle également aux molécules de ces mêmes Corps? s'étend-elle jusques à ceux qui échappent à nos yeux, que nous connoissons par d'autres sens, qui ne se sont sent sur plusieurs ensemble,

EXPÉRIMENTALE. 49 & que le préjugé semble annoncer fans aucune figure, parce qu'ordinairement on n'est point instruit decelle

qu'ils ont?

Cette question se trouve déja décidée par la désinition même que nous avons donnée de la figure en général. Car si ce n'est autre chose qu'un assemblage de surfaces qui terminent une certaine portion de matière, il est évident qu'un corps si petit qu'il puisse être, sera toujours terminé par des surfaces, & par consé-

quent figuré.

Quoique l'expérience ne puisse pas se prêter à toute l'étendue de ce raifonnement, & nous faire voir des sigures par-tout où nous avons raison
de croire qu'il y en a; cependant elle
nous en montrera qui ont été longtems ignorées, que l'art a sçû découvrir depuis, & nous apprendrons par
des exemples curieux, que nous ne
devons pas chercher à concevoir sans
sigure, les Corps en qui nos sens n'en
découvrent point.

Brodement Pop-

Tome I.

E

50 Leçons de Physique

I. Leçon.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

Ayant placé le microscope repréfenté par la Figure 6. au jour d'une senêtre, ou si c'est la nuit, devant la lumiére d'une bougie basse, de manière que le miroir qui est dessous la platine, éclaire par réslexion le trou sur lequel tombe la lentille objective; on fait passer le premier verre du porte-objets sur lequel on a mis des grains de sable, & l'on fait descendre le corps du microscope jusqu'à ce qu'on rencontre le point de vûe nécessaire.


EFFETS.

Ayant placé l'œil au-dessus & fort près de la premiere lentille oculaire, on apperçoit les grains de sable transparens, comme des cristaux de la grosseur d'une muscade, anguleux & diversement taillés. Figure 7.

EXPLICATIONS

Nous n'expliquerons rien ici des effets qui regardent directement l'optique; parce que nous en traiterons

TOM.I.I.LEÇON. Pl, 2.



THY I TYLEGON IN 2.

EXPÉRIMENTALE. 51
ailleurs. Nous nous bornerons feulement à ceux qui ont rapport à la figure des Corps, dont il est présente-

ment question.

Lorsque nous arrêtons la vûe sur un grain de sable ordinaire, il paroît comme un point; l'œil confond ses dimensions; mais avec le secours du microscope, l'objet paroît plus grand; on distingue aisément des signes, des angles, des sinuosités, des contours, des surfaces, en un mot, une sigure bien terminée, dont on apperçoit facilement les dissérences, quand on la compare à quelqu'autre.

APPLICATIONS.

Les grains de fable doivent être considérés comme autant de petits cristaux fort durs, préparés par la nature, & que l'art applique utilement à différens usages. Parce qu'ils sont petits & anguleux, on s'en sert commodément pour user ou nettoyer les métaux, ou tous autres corps encore plus durs, sur lesquels la lime, ou le tranchant de l'acier ne trouve plus de prise: on les mouille en pareil cas pour aider leur mobilité, & pour empour aider leur mobilité, & pour empour les considerations de prise de prise en les mouille en pareil cas pour aider leur mobilité, & pour empour les considerations de l'acier ne trouve plus de prise en les mouille en pareil cas pour aider leur mobilité, & pour empour les mouilles en pareil cas pour aider leur mobilité, & pour empour les mouilles en pareil cas pour aider leur mobilité, & pour empour les mouilles en pareil cas pour aider leur mobilité, & pour empour les mouilles en pareil cas pour aider leur mobilité, & pour empour les mouilles en pareil cas pour aider leur mobilité, au le prise de la consideration de les mouilles en pareil cas pour aider leur mobilité, au le prise de la consideration de la consideration de la consideration de les mouilles en pareil cas pour aider leur mobilité, au le consideration de la consideration de la

I. Leçon. I. Leçon.

pêcher qu'en s'usant mutuellement, ils ne perdent, avec leurs petits angles tranchans, la propriété qu'ils ont d'entamer les matiéres les plus solides.

La transparence du sable blanc le rend propre à d'autres usages : il est la base de tous les ouvrages de verre; le mêlange de quelques sels, & l'action d'un seu très-violent qui le divise & qui en sépare les saletés, met ses parties en état de se lier & de former une pâte susceptible de toutes sortes de formes, & qui en se resroidissant, prend de la consistance, sans cesser d'être diaphane.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

Que l'on fasse passer sous la lentille le second verre du porte-objets sur lequel on a mis quelques gouttes d'eau salée que l'on a laissé sécher.

EFFETS.

En approchant l'œil du microfcope, on apperçoit des molécules qui paroissent sous des figures sem-

Experimentale. blables, quand la préparation a été faite avec un même fel; si l'on a employé par exemple, celui qui vient de la mer, & qu'on fait servir communément à l'usage des tables : ce qu'on apperçoit avec le microscope, ressemble à des petits cubes. Figure 8.

LEÇON.

EXPLICATIONS

Les parties de ce sel que l'eau avoit divisées, & qu'elle tenoit en dissolution; se sont fixées sur le verre du porte-objets, pendant que la partie liquide s'est évaporée. Avant cette évaporation de l'eau, le secours du microscope ne suffit pas pour les rendre visibles, parce qu'alors elles sont encore trop divifées & trop minces pour être apperçues; mais à mesure que la liqueur les abandonne, elles fe rapprochent, & elles forment des molécules d'un plus grand volume; & quand bien même elles resteroient aussi petites qu'elles étoient dans l'eau, nous ferons voir ailleurs qu'à grandeurs égales, des corps diaphanes fe voyent mieux, lorsqu'ils sont plongés dans l'air, que dans tout autre liquide transparent plus matériel.

E iii

Chaque fel qui se crystallise, affecte ordinairement une figure qui lui est propre, & qui dépend vraisemblablement de la figure même de ses moindres parties. Le sel marin, par exemple, forme des cubes, le salpêtre des aiguilles, le sucre des globules, &c. Figures 9. & 10.

APPLICATIONS.

L'uniformité de figures dans les molécules, n'est point une qualité particulière aux sels; on en rencontre beaucoup d'autres exemples surtout dans le genre minéral: le crystal de roche, & la plûpart des pierres transparentes paroissent assez souvent en petit comme en grand, sous la forme de prisme ou de pyramide exagone; mais on n'en doit pas conclurre du particulier au général, que les parties insensibles de tous les corps sont autant de petits modéles de ce qu'ils sont en plus grand volume.

Le sel, à cause de son extrême divisibilité, & de la figure anguleuse & pointue de ses parties, s'infinue fort aisément dans les pores de toutes les

EXPERIMENTALE. SS matiéres animales, végétales, folides ____ ou liquides: & par cette raison on l'employe avec fuccès pour les conferver. Car la corruption n'étant rien autre chose qu'un déplacement de parties, qui change l'état des molécules, dans les Corps mixtes; tout ce qui pourra contenir ces parties dans l'ordre qu'elles ont reçû de la nature, empêchera nécessairement que les petits composés qui résultent de leur assemblage, ne soient altérés; & au contraire tout ce qui donnera lieu au mouvement des moindres parties, occasionnera corruption. Or les particules salines, comme autant de coins, remplissent les petits vuides, foutiennent & appuyent les particules solides, arrêtent le progrès de l'évaporation, & confervent au moins pour quelque tems l'état naturel. C'est ainsi que la chair des animaux, lorsqu'elle est salée, demeure plus longtems propre à nos usages; & que les fruits confits dans le fucre se gardent pendant plusieurs années anob sy no

rest, que l'on observe dans tous les Corps inanimés, & dans les petites I. Leçon.

Eiv

76 LEÇONS DE PHYSIQUE

LEÇON.

= masses qui les composent, n'est ni moins grande, ni moins admirable dans le genre animal : le même inftrument qui vient de nous faire voir les angles & les pointes des parties salines, nous découvre aussi un monde de petits Etres vivans, de petits insectes, que nous n'eussions peut-être jamais soupçonné d'exister, dont nous n'eussions certainement pas deviné les formes, & qu'on doit être curieux de connoître ; c'est pourquoi j'ajouterai encore l'expérience suivante, pour achever de faire voir combien la nature a varié la figure des Corps en tout genre. mos , sentist

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

On fait passer sous la lentille objective du microscope le troisième verre du porte-objets, sur lequel on a mis avec la pointe d'un cure-dent, une petite goutte d'une des liqueurs dont on va donner la préparation.

ture soit un peu large, il faut mettre macérer avec de l'eau un peu de soin

EXPÉRIMENTALE. haché, de la paille, des fleurs de différentes especes & des parties de plantes quelconques, & l'exposer environ une semaine à l'air libre, mais à l'ombre pendant un tems chaud; ou bien si l'on en a la commodité, on pourra, sans attendre, puiser un peu d'eau dans quelque mare aux endroits où il y a de la mousse verte, ou quelques autres plantes aquatiques.

2°. Dans une fiole de verre qu'il faut tenir ouverte, il faut exposer de même du vinaigre commun.

3°. Dans un verre à boire, ou dans quelque vase équivalent, il faut garder pendant quatre ou cinq jours de l'eau qui se trouve dans les écailles d'huitres, lorsqu'on les ouvre.

Dans le vinaigre qui a été expolé pluseurs jours de l'ar par un tems

On apperçoit dans la première liqueur, une infinité de petits animaux qui paroissent de différentes espèces, foit par leurs figures, foit par leurs facons de se mouvoir, qui sont extrêmement variées. Les uns semblables à des petites boules a, s'élancent en ligne droite, & forment toujours des angles bien marqués, quand ils changent de

LECON

Fig. II.

Fig. 120

58 Leçons de Physique directions; les autres b, plus allongés,

& d'une forme ovale, ne font que tour-LEÇON. noyer; plusieurs laissent appercevoir distinctement des pattes, une queue souvent fourchue, & des antennes; d'autres c, composés d'anneaux, se meuvent à la manière des vers de terre, ou comme les fangfues. On apperçoit à quelques-uns les principaux organes, & la circulation des humeurs; & pour peu qu'on observe avec attention, on découvre bientôt jusqu'à la cause finale de leurs mouvemens; car on en voit qui dévorent les autres, & l'on conçoit sans peine que les uns se meuvent pour joindre leur

Dans le vinaigre qui a été exposé plusieurs jours à l'air par un tems doux, on voit des insocres qui par leur figure ressemblent beaucoup à des petites anguilles très vives il arrive très-rarement qu'on les trouve mêlés avec des animaux qu'on puisse juger d'une autre espèce.

proie, & les autres pour éviter d'être

Fig. 13. L'eau des huitres, contient un nombre infini de petits animaux qui se ressemblent par la figure, & par Expériment al E. 59 la manière de se mouvoir : la petite goutte dans laquelle ils nagent, paroît semblable à un bassin, dans lequel on verroit sourmiller une quantité prodigieuse de carpes sans nageoires & sans queue ; la transparence de leur corps est telle, qu'on apperçoit aisément les parties intérieures.


I. Leçon.

EXPLICATIONS.


La nature a varié la figure des plus petits animaux, autant & peut-être plus encore que celle des grands: mais dans ceux-là comme dans ceux-ci, elle est uniforme & constante pour chaque espéce. Ainsi le vinaigre préparé, comme nous l'avons dit, fait voir des anguilles qui ne différent que par la grandeur; & l'eau d'huitres ne contient pour l'ordinaire que ces animaux dont nous avons parlé.

La premiére liqueur cependant en contient plusieurs qui ne se ressemblent ni par la figure, ni par la manière de se mouvoir; ce n'est point une raison pour conclurre, que la figure de ces petits êtres animés est

I. Leçon. 60 LECONS DE PHYSIQUE un effet du hazard; & qu'une seule & même espèce affecte indifféremment celle-ci ou celle-là. Cette liqueur dont il s'agit, est une infusion de plusieurs fortes de plantes, où différens animaux rencontrent leur nourriture: & l'eau commune qui en est la base, est un milieu qui peut convenir en même tems à ceux qui se nourrissent d'herbes, & à ceux qui font voraces. Le brochet vit dans la même eau que la carpe, quoiqu'ils se nourrissent l'un & l'autre bien différemment; & l'hiftoire des insectes nous fournit nombre d'exemples qui ont un rapport bien plus direct & plus prochain avec cette supposition. Il n'en est pas toutà-fait de même du vinaigre ou de l'eau d'huitres: il est probable que ces deux liqueurs ne conviennent qu'à très-peu d'espéces de ces petits animaux; & le milieu qu'ils habitent; les met vraisemblablement à l'abri de la poursuite des autres. J'ai essayé plusieurs fois de mettre ensemble des infectes d'eau douce avec ceux du vinaigre, ou avec ceux de l'eau des huitres; les premiers ont toujours péridans le premier instant.



Dheulland del et d'eulp .



APPLICATIONS.

I.

Les insectes ont été regardés fort long-tems comme les enfans de la corruption, & de la pourriture des autres corps. L'erreur des Anciens touchant leur origine a été telle, qu'ils ont eru pouvoir les faire naître artificiellement, en observant certains procédés dont ils ont même osé donner des recettes. Ce que le préjugé populaire avoit établi, des Philosophes ont tâché de le confirmer, & d'en rendre raison; & les systèmes que cette opinion a fait naître, ont trouvé des défenseurs jusques dans ces derniers tems, Mais l'hypothèse la plus ingénieuse peutelle tenir contre des faits, qu'il n'est plus permis d'ignorer? Les Naturalistes Modernes mieux instruits qu'on ne l'étoit autrefois de l'histoire des insectes, leur ont donné une origine plus noble & plus vraie; ils ont reconnu & constaté par des obfervations qui ne laissent plus rien d'obscur, que la génération de ces petits animaux est aussi bien réglée, & d'une uniformité aussi constante 62 LEÇONS DE PHYSIQUE

I. Leçon.

pour chaque espéce, que celle des lions & des chevaux, &c. Ils ont répondu par des expériences décisives, à des apparences trompeuses & trop peu approfondies, sur lesquelles on appuyoit l'ancienne opinion. Telle matiére corrompue, disoiton, fait voir des vers & des mouches; peut-on douter que ces animaux ne doivent leur existence à cette corruption ? Comme si l'on pouvoit conclurre qu'un cadavre de cheval engendre des corbeaux, parce qu'il arrive souvent qu'on y trouve de ces oiseaux voraces assemblés, ou qu'un pré fait naître des moutons, parce qu'on y en rencontre des troupeaux qui paissent : on pardonneroit de le soupçonner à quiconque ne sçauroit pas que les oiseaux font des nids pour perpétuer leur espèce, & qu'un agneau vient d'une brebis. Si l'on peut en quelque façon excuser ceux qui les premiers ont été trompés par les apparences, parce qu'alors on n'étoit nullement instruit de la vraie manière dont naissent ces petits animaux si différens des autres par leurs tailles & par leurs figures; préEXPÉRIMENTALE. 63 fentement que l'on sçait comment = s'engendrent ceux qui sont assez visibles pour être observés, il n'est plus permis de penser que la nature si conforme à elle-même, prenne d'autres voies pour multiplier ceux qu'une extrême petitesse permet à peine d'appercevoir avec le microscope, ni

qu'elle abandonne au hazard le foin

de les faire naître.

Il faut donc bien se garder de croire que les petites anguilles qu'on apperçoit dans le vinaigre, ainsi que les petits animaux qu'on observe dans les infusions des plantes, soient des parties putréfiées de ces végétaux, qui se convertissent en corps animés. L'expérience apprend, que si l'on tient les vaisseaux fermés, il ne s'y engendre rien; mais on doit penser que quand ils sont ouverts, les meres que l'air transporte de côté & d'autre, y vont déposer leurs œufs ou leurs vermisseaux, comme dans un lieu qui doit faciliter leur développement, fournir à leur nourriture, & les faire croître. Cette conjecture, (si c'en est une,) est solidement appuyée sur des exemples : combien

I. Leçona d'espéces de mouches voyons-nous

I. aller placer leurs œufs dans des eaux

Leçon. croupies où le vermisseau venant à

aller placer leurs œufs dans des eaux croupies, où le vermisseau venant à éclore, se nourrit, & prend son accroissement jusqu'à ce que le tems de sa métamorphose étant arrivé, il s'éléve dans l'air avec une nouvelle sorme, & des aîles, qui le rendent sem-

blable à sa mere?

Quelque intéressante que soit cette matiére, je ne dois pas m'y arrêter davantage: le Lecteur curieux d'en être plus amplement instruit, doit consulter l'Histoire des insectes, par M. de Reaumur; c'est-là qu'il fera connoissance avec ce peuple nouveau; c'est le bien voir, que de le voir par les yeux d'un tel Observateur. Il me suffira de remarquer ici, que si l'on est sensible à cette prodigieuse variété de figures, par lesquelles la nature a différencié les plus petits corps; il n'est point de genre qui fournisse plus à notre curiosité, que celui des Insectes, où l'on doit admirer également & les différences qui caractérisent les espéces, & l'uniformité qui régne dans chacune. blot sto (onu flo no's it)

I. Leçon.

III. SECTION.

De la solidité des Corps.

A solidité d'un corps n'est autre chose que la quantité de matiére qui est liée ensemble sous son volume : je dis, qui est liée ensemble; car s'il arrivoit qu'une matière étrangère passat librement à travers d'un corps, & qu'elle y exerçât ses mouvemens avec indépendance, comme l'eau de la riviére qui baigne intérieurement un monceau de pierres qu'elle rencontre dans son lit; cette matiére ne contribueroit en rien à la solidité dont il est ici question. Elle l'augmenteroit au contraire, si elle se trouvoit sixée fous le même volume, comme si l'eau courante que nous venons de citer pour exemple, devenoit de la glace au moment qu'elle se trouve entre les pierres amoncellées. Un panier percé de toutes parts, & plongé dans un fluide, n'a que sa propre solidité; si c'est un morceau de bois, il est plus solide de toute la quantité d'eau Tome I.

66 Leçons de Physique dont il est pénétré, & qu'il unit à sa masse.

LEÇON.

Etre solide est une propriété, nonseulement commune, mais même essentielle à tous les corps; soit qu'on les considére en tout, soit qu'on n'ait égard qu'à leurs parties les plus simples. C'est aussi le signe le moins équivoque de leur existence. Des illusions d'optique en imposent quelquefois à nos yeux; nous fommes tentés de prendre des phantômes pour des réalités: mais en touchant, nous nous assurons du vrai, par la perfualion intime où nous fommes, que tout ce qui est corps est solide. capable par conséquent de résistance, & qu'on ne peut placer le doigt ou autre chose dans un lieu qui est occupé par une matiére quelconque, sans employer une force capable de la pousser ailleurs.

Toute résssance physique annonce donc une solidité réelle plus ou moins grande; c'est une vérité tellement avouée, que je ne crois pas qu'elle ait besoin d'autre preuve que l'habitude où l'on est de consondre les deux idées, quoiqu'à parler exacte-

EXPERIMENTALE. 67 ment, l'une représente la cause, & = l'autre l'effet. Mais il y a tel cas où l'une & l'autre (la solidité & la résis- Leçon. tance) échappent à nos sens, ou à notre attention. Certains corps nous touchent sans cesse, nous touchent par tout également; l'habitude nous a rendu leur contact si familier que nous avons hesoin d'y résléchir, pour reconnoître l'impression actuelle qu'ils font fur nous. Quand on agit dans un air calme, il est peu de personnes qui pensent qu'elles ont continuellement à vaincre la résistance d'un corps dont la solidité s'oppose à leurs mouvemens. Si l'on fortoit de l'atmosphére pour y rentrer, on fentiroit sans réflexion l'attouchement de l'air, comme on sent celui de l'eau quand on s'y plonge.

Ce qui fait encore que la folidité des fluides échappe à notre attention; c'est que leurs parties indépendantes les unes des autres, & d'une petitesse qui surpasse de beaucoup la délicatesse de nos sens, cédent au moindre de nos efforts, sur-tout quand elles sont en petite quantité: & nous ne pensons pas que nous

68 LEÇONS DE PHYSIQUE agissons, quand nous agissons trèspeu.

I. LEÇON.

Puisque les fluides sont les seuls corps dont la folidité ait en quelque façon besoin d'être prouvée, & que la grande facilité qu'ils ont à céder, pourroit faire croire à ceux qui n'y feroient point affez d'attention, que ces fortes de corps sont incapables de résistance; nous les employerons par préférence dans les expériences que nous appellerons en preuves, & nous choisirons l'air comme le moins solide de tous ceux qu'on peut retenir dans un vaisseau fermé, afin que sa solidité bien établie sur des faits, fasse conclurre à plus forte raison, la même chose pour tous les autres corps.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

Dans un vase de crystal représenté par la Fig. 14. on verse cinq ou six pintes d'eau bien claire; & l'on met flotter sur la surface de l'eau un petit morceau de liége A; on descend ensuite perpendiculairement le vase B, asin que l'air qu'il contient ne puisse pas s'échapper.

of and Evr For to sep on this

LEÇON.

La partie de la furface de l'eau qui répond à l'ouverture du vaisseau B, s'abaisse à mesure qu'on le fait descendre ; le petit morceau de liége qui flotte dessus, rend cet abaissement sensible, & fait voir qu'il n'entre point d'eau dans le vaisseau B.

EXPLICATION.

Le vaisseau B, contient une colonne d'air qui remplit sa capacité; cette masse fluide, quoiqu'elle ait peu de densité, est pourtant composée de parties réellement solides, qui ne peuvent être déplacées par un autre corps, à moins qu'on ne leur ouvre une nouvelle place qu'elles puissent aller occuper. Comme le vaisseau B est fermé de toutes parts, & que l'eau qui fe présente à son ouverture est plus pesante que l'air; ce dernier fluide ne peut sortir du lieu où il est, & comme il est solide en ses parties, il fe comporte à l'égard de l'eau qu'il rencontre, comme tout autre corps dont les parties seroient liées. Ainsi la surface de l'eau baisse autant qu'on

70 LEÇONS DE PHYSIQUE
fait descendre le vase qui contient
LECON petit morceau de liége qui flotte
dessus

Quoique l'air du vaisseau B, s'oppose à l'eau qui fait effort pour y entrer; sa résistance n'est point telle qu'elle l'en exclue entiérement. Nous verrons ailleurs qu'une masse d'air est un corps slexible, & qu'elle peut se resserrer dans un plus petit volume quand on I'y force : nous ferons voir aussi qu'un corps plongé dans un fluide, y est d'autant plus pressé, gu'il y descend plus avant. Ces deux principes une fois supposés, expliquent fort bien pourquoi l'eau s'éléve un peu dans le vaisseau B, nonobstant la résistance de l'air ; ce qui arriveroit aussi en substituant à l'air toute autre matiére flexible, & incapable de se mêler avec l'eau; comme nous le prouverons en parlant de la compressibilité des corps. Mais quelque chose qui arrive, & à quelque profondeur que l'on porte le vaisseau B, jamais l'eau ne réduira le volume d'air à zéro pour occuper toute la place, Quand une fois l'effort qui se

EXPÉRIMENTALE. 71 fait à la base, aura rapproché les parties autant qu'elles peuvent l'être, il I. n'est point de force qui le resserre dans un plus petit espace ; ce qui sustit pour prouver que ce sluide a, comme tous les autres corps, une folidité abfolue.

APPLICATIONS.

Par l'expérience précédente, pour peu qu'on y pense, on apprend pourquoi l'on ne remplit point un pot ou tout autre vase semblable, quand on le plonge l'orifice en bas ; par quelle raison l'entonnoir dont le canal remplit trop exactement le col d'une bouteille, n'est point propre à y introduire une liqueur; & ce qui oblige d'avoir recours à certaines voies extraordinaires, pour remplir des vaisseaux qui ne sont ouverts que par un très-petit canal, comme la cassolette de la 3º Exp. 1º Sect. Le préjugé, ou l'habitude que nous avons de vivre dans l'air, nous fait regarder comme vuide tout ce qui n'est plein que de ce fluide ; dans cette confiance mal fondée, nous croyons qu'une liqueur n'a qu'à se

LECON.

I. Leçon.

72 LECONS DE PHYSIQUE présenter de quelque façon que ce foit à l'ouverture d'un vase, pour y trouver accès; mais nous devrions faire attention que toutes ces capacités font naturellement remplies d'air, comme elles seroient pleines d'eau, si elles avoient été fabriquées au fond d'un étang, & qu'elles n'en fussent jamais sorties: nous devrions penser de plus, que l'air ayant de la solidité dans ses parties, on ne doit pas prétendre de loger avec lui un autre corps dans le même lieu; & qu'ainsi pour mettre de l'eau, du vin, &c. dans une bouteille, il faut que l'air puisse passer entre le col & l'entonnoir pour faire place à la liqueur. Mais quand ce col est tellement étroit, qu'il ne peut pas donner en même-tems un passage libre à deux matiéres qui coulent en sens contraire, c'est-à-dire, à la liqueur qu'on veut faire entrer, & à l'air qui doit fortir; il faut que cela se fasfe successivement. C'est pourquoi quand on veut introduire l'esprit de lavande dans la cassolette que nous avons citée, on commence par la chauffer; & quand l'action du feu

EXPÉRIMENTALE. 73 a fait fortir une bonne partie de l'air qu'elle contenoit, on plonge le col dans la liqueur qui va prendre fa place. Nous ne confidérons maintenant dans cet effet, que le déplacement d'un fluide qui doit précéder l'introduction d'un autre. Lorsque nous expliquerons les propriétés de l'air, nous ferons connoître comment un vase que l'on chausse, perd une grande partie de l'air qu'il contient.

peut point s'échapper du vaisseau B dans l'expérience précédente; c'est par la même raison, qu'il demeure dans la cloche du plongeur, & qu'il fournit à sa respiration pendant quelque tems. C'est par la raison contraire, que l'on puise commodément une liqueur dans un vase qu'on ne veut pas remuer, avec une espéce de chalumeau renssé par le bas, comme il est représenté par la Fig. 15. Car comme cet instrument est ouvert en C, l'air

s'échappe par cette issue, à mesure que la liqueur s'introduit par l'orifice D; & l'expérience suivante apprendra conse ment on peut le transporter plein, en empruntant la résissance de l'air exté-

rieur. Tome I.

Nous avons dit pourquoi l'air ne

I. Leçon.

74 Leçons de Physique

I. Leçon.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

La Fig. 16. représente une espèce de fontaine, dont le canal E F est ouvert de part & d'autre; la partie E est élevée d'environ 2 lignes au-dessus du fond du bassin GH, qui est percé au centre: on remplit d'eau le réservoir IK, jusques aux $\frac{3}{4}$ ou environ.

EFFETS.

Cette fontaine coule à plusieurs reprises par les petits canaux 1, 2, 3, 4, tant que l'eau contenue dans le réservoir peut sournir à cet effet.

EXPLICATIONS.

Lorsque le canal EF est ouvert, il laisse un passage libre à l'air qui exerce intérieurement sa pression sur la surface de l'eau en IK. Il y a alors deux causes qui concourent à l'écoulement; la pression de l'air intérieur, & le poids de l'eau. De ces deux causes, la premiere est contrebalancée par la résistance de l'air extérieur qui répond au bout de chacun des petits

Expérimentale. 75 canaux 1, 2, 3, 4, & qui s'oppose par dehors à la chûte de l'eau avec une force égale à la pression qui la sollicite par dedans; la feconde cause, (le poids de l'eau,) subsiste entiérement, & suffit pour la faire couler. Mais si le canal E F vient à se boucher, l'air intérieur cessant de presser la surface de l'eau en IK, laisse agir librement celui du dehors, dont la résistance l'emporte sur la pesanteur du liquide, & l'écoulement cesse. On se sert assez ingénieusement de l'eau même qui s'écoule, pour causer les intermittences. Comme elle ne peut sortir du bassin GH, qui la reçoit, que par le trou qui est au centre; elle s'y trouve d'abord, & pendant quelque tems, en assez grande quantité pour noyer l'extrémité E du canal; & ce n'est que quand elle est écoulée, qu'il se trouve ouvert de nouveau, & qu'il rend le passage à l'air.

APPLICATIONS.

On trouve en différens lieux des fources intermittentes dont les écoulemens sont périodiques; ces effets naturels qui se rencontrent assez ordiLEÇON.

76 LEÇONS DE PHYSIQUE

I. Leçon.

nairement dans le voisinage des montagnes, dépendent bien souvent de plusieurs causes qui s'entr'aident pour la même fin; mais comme les différentes explications qu'on en donne, sont la plûpart fondées sur certaines propriétés de l'air que nous n'avons point encore fait connoître, nous différons de les rapporter, jusqu'à ce que l'ordre que nous nous sommes proposé dans cet ouvrage, nous ait donné lieu de traiter de ce fluide. Nous supposons seulement ici, (ce qu'il a de commun avec tous les autres corps,) qu'il est capable de réfister & d'agir sur d'autres matiéres ; & nous en trouvons des preuves nonseulement dans les expériences que nous venons de citer, mais encore dans plusieurs effets que nos propres besoins nous mettent tous les jours fous les yeux.

La nécessité de tenir ouverte la partie C de l'instrument cité ci-des-Fig. 15. sus * pour permettre à l'eau d'y entrer par l'extrémité D, ne laisse point ignorer la résistance de l'air qui resteroit ensermé. Mais quand on veut transporter la liqueur qu'on a puisée,

Expérimentale. 77 c'est encore par une semblable résistance employée en dehors, qu'on en vient à bout. En fermant avec le doigt la partie c du canal, on donne lieu à l'air extérieur d'opposer toute sa force en d à la chûte du liquide renfermé. Les lampes & les encriers dont les réservoirs sont des bouteilles renversées, comme le représente la Fig. 17. ne sont encore que des exemples variés des même; effets. Si l'on faisoit la moindre petite ouverture en la partie supérieure L du vase, la liqueur se trouveroit alors entre deux puissances égales; car l'air qui résisteroit en M ne feroit qu'équilibre à celui qui presseroit par L, & l'huile ou l'encre obéiroit librement à sa pesanteur qui ne lui permettroit pas de rester suspendue au-dessus de son niveau. Mais tant que le réservoir est fermé par le haut, l'air qui s'oppose en M,a des forces suffisantes pour soutenir la liqueur. Un tonneau plein, quoiqu'ouvert par un trou de vrille, trompe encore l'attente de celui qui l'a percé, s'il oublie de lui donner de l'air par le haut. C'est encore par la même cause, qu'une bouteille bien bouchée par le col, au fond de la-

I. Leçon.

Giij

78 LEÇONS DE PHYSIQUE quelle on a fait secrétement un trou, inonde & furprend beaucoup celui à

LECON. qui on la donne à déboucher.

> La folidité des corps se nomme aussi Impénétrabilité; mais ce terme a besoin d'être expliqué pour prévenir des objections tirées de certaines expériences, par lesquelles il paroît que plusieurs matiéres mêlées ensemble confondent leurs grandeurs, & fepénétrent mutuellement : une éponge, par exemple, reçoit intérieurement une quantité d'eau qui semble perdre son propre volume, puisque celui fous lequel elle se trouve renfermée après cette espéce de pénétration, n'en est point sensiblement augmenté; un vaisseau plein de cendres ou de fable admet encore une grande quantité de liqueur; & parties égales d'esprit-de-vin & d'eau mêlées dans le même vase, y tiennent moins de place qu'elles n'en occupoient avant le mêlange : la matiére est-elle donc pénétrable ? ou si elle ne l'est pas, dans quel sens faut-il entendre son impénétrabilité?

C'est qu'il faut soigneusement distinguer la grandeur apparente des corps,


EXPERIMENTALE. de leur solidité réelle. Les parties indivisibles (s'il y en a) sont absolument impénétrables. Celles même d'un ordre inférieur, qui commencent à être composées, ne sont encore vraisemblablement jamais pénétrées par aucune matiére; en un mot il y a dans tous les corps quels qu'ils puissent être, une certaine quantité de parties qui occupent seules les places qu'elles ont, & qui en excluent nécessairement tout autre corps. Mais ces parties solides & impénétrables qui font proprement la vraie matiére de ces corps, ne sont pas tellement jointes ensemble, qu'elles ne laissent entre elles des espaces qui sont vuides, ou qui font pleins d'une autre matiére qui n'a aucune liaison avec le reste, & qui céde sa place à tout ce qui se présente pour l'en exclure ; en admettant ces petits interffices dont nous prouverons l'existence dans la leçon suivante, on conçoit très - facilement que l'impénétrabilité des corps doit s'entendre seulement des parties solides qui se trouvent liées ensemble dans le même tout, & non pas du composé qui en résulte.

I. Leçon.

Giv

eso the recent in a sure of nell trop.
-every such and tenting in rate of
-overity accord of reseasons has laner.

THE REST OF



El St.

LEÇONS DE PHYS. EXPER. 81



II. LEÇON.

De la Porosité, Compressibilité; & Elasticité des Corps.

PREMIERE SECTION.

De la Porosité.

A Porofité des corps n'est autre: chose que le vuide qui se trouve entre leurs parties folides; & par ce mot de vuide nous ne prétendons pas faire entendre des espaces privés de toute matière : il est indubitable que la plus grande partie de ces interstices loge des fluides dont la présence se manifeste par mille preuves. Quand je plonge dans l'eau une éponge féche, ou une pierre tendre, j'en vois sortir beaucoup d'air, à mesure que l'eau y pénétre : & quand je fais fécher des matiéres humides, elles deviennent plus légéres à mesure qu'elles perdent par l'évaporation, ce que leur porosité avoit admis. Ces corpuscules

II. Leçon.

82 LEÇONS DE PHYSIQUE LEÇON.

étrangers ne remplissent que les plus grands vuides : la matiére du feu, celle de la lumiére que nous voyons passer dans des corps impénétrables à l'air, à l'eau, &c. ne nous permettent point de douter qu'il n'y ait des pores d'un autre ordre, qui se remplissent de ces fluides beaucoup moins groffiers que les autres ; mais quand on considére la matière propre d'un corps, c'est toujours en faisant abstraction de toutes ces parties étrangéres qui suivent d'autres loix, & qui ne participent point à ses affections. On peut croire aussi qu'après ces premiers vuides qui n'en font point à proprement parler, puisqu'ils sont pleins d'une autre matière, il en est d'autres plus petits & qui le sont au sens littéral. La liberté requise pour les mouvemens, semble l'éxiger; mais s'ils existent dans la nature, ils ne font point susceptibles d'aucune preuve d'expérience. En exceptant donc feulement les parties simples & primordiales des corps, nous établissons comme une proposition générale, que tout ce qui est composé de parties matérielles est poreux, les corps durs

EXPERIMENTALE. 83 comme les liqueurs, ceux qui font e organisés comme ceux qui ne le sont pas: & s'il y a quelque différence dans les uns & dans les autres, ce n'est que par la grandeur, par le nombre, par la figure ou par l'arrangement des pores.

II. Leçon.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La Figure premiere représente une machine pneumatique, sur la platine de laquelle on a établi un canon de verre NO, terminé en haut par un vase de bois de chêne P, qui a été creusé selon le fil du bois, & dont le fond est épais d'environ 3 lignes; on met de l'eau dans ce vase, & l'on fait agir la pompe.

EFFETS.

Après quelques coups de piston, l'eau contenue dans le vase de bois passe à travers le fond, & tombe par gouttes dans le canon de verre; le bois s'étend, & quelquesois le vaisseau se fend.

84 Leçons de Physique

11. Leçon.

EXPLICATIONS.

La machine prieumatique est un instrument qui sert à pomper l'air qui est rensermé dans un vaisseau. Nous nous abstiendrons de rien dire ici de sa construction & de ses différens usages, parce que c'est une chose étrangére à notre objet présent, & qui trouvera naturellement sa place dans les leçons qui traiteront des propriétés de l'air. Il nous suffira de dire ici qu'en faisant agir la pompe de cette machine dans l'expérience précédente, on peut ôter l'air qui est contenu dans le canon de verre NO.

Un morceau de bois considéré selon sa longueur, est un assemblage ou un faisceau de petites sibres rensermées sous l'écorce qui leur sert d'enveloppe commune. On peut s'en faire une idée, (fort grossière à la vérité,) en se représentant une botte d'allumétes couvertes d'un fourreau. Quelque menues que puissent être ces sibres ligneuses, elles ne s'approchent jamais de manière qu'elles ne laissent entre elles des interstices qui sorment autant de petits canaux. En creusant

EXPERIMENTALE. 85 Le vase de l'expérience précédente, on : a réduit la longueur de ces canaux à l'épaisseur du fond, qui n'est que de Leçon. deux ou trois lignes; ainsi l'on peut considérer ce fond comme un crible ouvert par une infinité de petits trous qui passent d'une surface à l'autre; cependant les pores du bois de chêne font si petits, que l'eau dont on remplit le vaisseau, aidée de son seul poids, ne peut se faire jour à travers. Il faut emprunter une force étrangére qui la mette en état d'aggrandir les passages & de pénétrer; on se sertici de la pression de l'air extérieur, qui agit toujours sur la surface de l'eau, mais qui ne peut avoir son effet que quand on diminue, ou qu'on fait cesser la résistance de celui qui est renfermé dans le canon de verre, & qui lui fait équilibre, tant qu'il y reste : ainsi après quelques coups de piston, l'eau pousfée par dehors n'étant plus foutenue par dedans NO, se filtre à travers le fond du vase de bois, & s'amasse en

Les pores n'ont pas pû s'aggrandir, que les parties solides du bois ne se

gouttes qui forment en tombant une

espéce de pluie.

86 Leçons de Physique
foient écartées les unes des autres,

**
LEÇON. mais si la circonférence que l'eau pénétre moins, ne s'étend pas proportionnellement autant que le milieu, le fond du vase deviendra courbe,

quelque fente.

APPLICATIONS.

ou le vase lui-même s'ouvrira par

Les bois qu'on nomme tendres, (parce qu'étant plus poreux que les autres, ils font plus aifés à couper,) lorsque leur surface n'est enduite d'aucune matiére grasse, deviennent humides, quand ils font plus fecs que l'air qui les touche; ou bien ils perdent une partie de leur humidité, s'ils font dans un air qui en ait moins qu'eux: parce qu'il est de la nature des fluides de s'étendre par-tout avec égalité; & comme l'état de l'atmosphére varie sans cesse, les bois, ainsi que tous les corps spongieux, souffrent continuellement des alternatives d'humidité & de sécheresse; ce qui cause des variations dans leurs volumes; les furfaces augmentent d'étendue dans un tems, dans un autre elles dimiExpérimentale. 87

nuent. C'est par cette raison, que les charpentes dans les bâtimens neufs, que les cloisons de sapin, que les lambris & autres ouvrages de menuiserie qui n'ont point été faits avec des bois long-tems gardés à couvert; se fendent fouvent avec éclat, & que les assemblages perdent leur justesse & leur solidité; qu'une fenêtre qui se ferme aisément dans un tems, se trouve trop large dans un autre, & peut à peine rentrer en place; qu'un tonneau entr'ouvert se raccommode en restant dans l'eau, &c. Car tous ces effets ne font autre chose que des dimensions augmentées par l'humidité, ou diminuées par la fécheresse.

Ces fortes de défordres ne seroient pas à beaucoup près aussi considérables qu'ils sont, si la diminution ou l'augmentation des surfaces se faisoit également par-tout & en même tems; dans les ouvrages qui sont d'une seule pièce, ou qui sont assemblés à colle, il n'arriveroit qu'un changement de grandeur qui seroit souvent d'une ségére conséquence: mais parce qu'un côté devient humide & plus grand, pendant que l'autre reste sec

II. LEÇON. 88 Leçons de Physique

LECON.

& fans diminution, il s'ensuit des gerfures, des courbures, des difformités. C'est ainsi qu'un lambris se creuse en dehors, quand la surface qui touche un mur humide, demeure plus étendue que l'autre; & qu'une porte se déjette, quand les pièces qui la composent, ne sont pas également susceptibles ou exemptes des impressions de l'air.

L'usage des peintures à l'huile & des vernis rémedie assez bien à ces fortes d'inconveniens: en bouchant ainsi les pores du bois avec une matière qui n'est point pénétrable à l'eau, non-seulement on empêche l'humidité d'y entrer, mais aussi celle qui s'y trouve rensermée dans le tems qu'on finit l'ouvrage, n'en peut plus sortir; & c'est un moyen de conserver un état constant aux choses qui n'en peuvent changer que par le sec ou par l'humide.

C'est une chose admirable, que des parcelles d'eau qui s'insinuent dans un corps solide, puissent ainsi par leurs petites forces multipliées, augmenter son étendue, nonobstant les résistances énormes qui sont effort

quelquefois

EXPERIMENTALE. quelquefois pour le retenir dans ses dimensions. On a vû des cables mouillés à dessein, se gonfler aux dépens de leur longueur, & faire approcher du point fixe où ils étoient attachés des masses prodigieuses. Une semblable expérience, & qui n'est pas moins digne d'attention, se passe tous les jours fous des yeux qui n'en remarquent pas tout le beau, dans les carriéres où l'on taille les meules de moulin. Ces fortes de pierres sont fort dures, & l'on n'est pas dans l'usage de les scier. On en choisit un bloc que l'on faconne en forme de cylindre d'un diamétre convenable. Tandis qu'il repose sur sa base, on le partage par des tranchées circulaires & paralléles, à telle distance l'une de l'autre qu'il se trouve entre elles de quoi faire autant de meules: mais comme ces tranchées ne peuvent pas aller jusqu'à l'axe du cylindre, il reste un novau qu'il faut rompre à chaque tranche qu'on veut détacher; pour cet effet on remplit tout ce qu'on a creusé avec des coins de bois tendre & bien féchés, dont on augmente ensuite le volume en les mouillant par aspersion ou autrement. Tome I.

II. Leçon. 90 Leçons de Physique

II. Leçon. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette pratique, c'est que ni le poids, ni la dureté d'une telle pierre, ne puisse empêcher l'humidité d'avoir son esse sur le bois, & que par un moyen si simple, & si peu puissant en apparence, elle se sépare de la masse dont elle fait partie (a).

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

En place du canon de verre de l'expérience précédente, on met celui qui est représenté par la Figure 2. Ilest garni par le haut, d'un flacon de crystal, dont le fond est de cuir de bussle, & dans lequel on a mis du mercure jusques à la hauteur de deux doigts ou environ.

EFFETS.

Au premier coup de piston, le mercure passe à travers le cuir, & tombe dans le tube par petits globules qui imitent une pluie d'argent.

(a) Quoique plusieurs bons Auteurs ayent fait mention de cette pratique, il faut convenir quelle n'est point en usage dans tous les endroits ou l'on fait des meules; l'ai appris que celles des environs de Jouarre; ne se détachent point ainsigne.

EXPLICATIONS.

II.

La peau de buffle qui fert de fond Leçon. au flacon, est comme celle de tous les autres animaux, très-poreuse; le mercure qui repose dessus, n'est pas en assez grande quantité pour forcer le passage par son propre poids; mais quand on y joint la pression de l'air extérieur comme dans la premiére expérience, alors ses petits globules se font jour, & imitent en tombant, une pluie d'argent, par leur nombre & par leur couleur.

APPLICATIONS.

La vie des animaux s'entretient par les alimens; mais de tout ce qu'ils prennent par forme de nourriture, la nature n'en employe qu'une très-petite partie à la subsistance du corps qui les digére : quand elle a fait son extrait, & qu'elle l'a placé felon ses vûes, elle a des voies par lesquelles elle sçait se débarrasser du superflu: on croiroit volontiers que les évacuations les plus vulgairement connues font aussi celles qui emportent la plus grande quantité de ces subs-

Hij

92 LEÇONS DE PHYSIQUE tances excédentes; mais il en est d'autres qu'on apperçoit moins, & qui opérent davantage, parce qu'elles se font continuellement. Ce qu'on appelle transpiration, n'est autre chose qu'une évaporation d'humeurs furabondantes qui se fait en plus grande partie par les pores de la peau: si elle est telle qu'elle rende la surface du corps notablement humide, elle fe nomme transpiration sensible, ou vulgairement sueur ; & cet état n'est pas naturel, il suppose un exercice violent, ou quelque agitation extraordinaire dans les parties internes; mais l'animal le plus tranquille & qui se porte le mieux, n'est pas un instant fans transpirer d'une manière peu senfible à la vérité, mais si essicace à la longue, que selon les expériences de Sanctorius, de M. Dodart, & de quelques autres personnes qui les ont faites avec foin, la transpiration insensible enléve les cinq huitiemes de ce que nous mangeons & buvons en 24 heures.

On ne doit donc pas être furpris du dépérissement & de la défaillance de ceux qui font trop long - tems EXPÉRIMENTALE. 93
fans manger, ou qui ne prennent que des substances peu capables de fournir à la réparation de celles qui se perdent continuellement par la transpiration: mais on a raison de l'être, quand on voit des létargiques & certains animaux, comme les marmotes, les loirs, &c. vivre plusieurs mois en-

dormis, fans prendre aucun aliment. Ceux qui ont vû des corps vivans & endormis de cette sorte, ont dû s'appercevoir que leur état ressemble bien plus à un engourdissement général répandu dans toute l'habitude du corps, qu'au sommeil naturel & commun. Dans un animal qui n'est simplement qu'endormi selon le cours ordinaire de la nature, la respiration est sensible & fréquente ; la chaleur & la molesse des membres témoignent que les humeurs se meuvent & circulent avec liberté; il n'y a pour ainsi dire qu'un pas à faire de ce sommeil au réveil; ainsi la transpiration continue, parce que ses causes sont à peu-près les mêmes : mais dans un létargique ce n'est pas la même chose, tout est dans une inaction presque entiére; il ne différe d'un mort que par un

II. Leçona

94 LEÇONS DE PHYSIQUE reste de mouvement qui se laisse à peine appercevoir, & qui le plus fouvent ne se ranime plus : ou s'il se ranime enfin, l'extrême maigreur & la grande foiblesse du malade marquent bien à son réveil la perte qu'il a faite de sa substance par une transpiration plus lente mais trop longue. J'ai obfervé quelquefois de ces espéces de rats qu'on nomme loirs : l'engourdifsement où ils étoient, leur rendoit les membres aussi roides que s'ils eussent été morts; à peine paroissoient-ils plus chauds que la muraille d'où on les avoit tirés; presque aucun signe de mouvement interne, & une difficulté pour les éveiller qui permettoit de les agiter de toute manière, & même de leur faire des blessures. Dans un tel état, l'animal fait bien peu de diffipation; il peut donc le foutenir quelque-tems fans nourriture, & ce tems où il vit ainsi, est toujours celui de toute l'année, où la transpiration est moins abondante, c'est-àdire, pendant le froid.

Dans les grandes chaleurs de l'été on transpire davantage, & d'ordinaire on mange moins que dans touEXPÉRIMENTALE. 95
te autre faison; les parties de l'estomac destinées à faire la digestion des
alimens, se relâchent justement lorsqu'il seroit le plus nécessaire qu'elles
exerçassent leurs fonctions; les animaux sont alors moins vigoureux,
parce qu'ils perdent plus, & qu'ils réparent moins qu'en tout autre tems,
l'apétit & le besoin de manger ne
sont point la même chose.

Si la peau des animaux a des pores qui transmettent les humeurs du dedans au-dehors, elle en a aussi qui permettent le passage à des matières qui agissent du dehors au-dedans; la Médecine applique extérieurement des remédes qui portent leurs essets jusqu'aux parties les plus internes, & qui ne permettent point de douter de cette dernière espèce de porosité.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.


On met un œuf dans un gobelet de verre plein d'eau claire, que l'on couvre d'un récipient, sur la platine de la machine pneumatique, comme il est représenté par la Fig. 3. II. Leçona


EFFETS.

Quand on fait agir la pompe pour ôter une partie de l'air qui est dans le récipient, toute la surface de l'œuf se couvre de petites bulles d'air qui se détachent peu à peu, pour gagner la surface de l'œuf on remarque des petits jets d'air qui sont formés par une suite continuelle des globules.

EXPLICATIONS.

La coque d'un œuf est poreuse, & par cette raison il s'évapore en peu de jours une partie de sa substance, qui est bien-tôt remplacée par l'air qui l'environne. Cet air contenu dans l'œuf n'en fort point tant qu'il est retenu par la pression de l'atmosphére: mais quand on diminue ou qu'on fait cesser cette pression, comme il arrive dès qu'on ôte l'air qui est dans le récipient; & qui presse l'eau contre toute la surface de l'œuf; aussi-tôt l'air intérieur, par une propriété que nous expliquerons dans son tems, fait effort pour passer au-dehors, & montre en sortant les pores de la coque





EXPÉRIMENTALE. 97
coque par lesquels il y étoit entré. La =
plupart de ces pores sont si petits que
l'airn'y passe qu'en parties insensibles;
mais l'adhérence mutuelle de ces particules les retient, jusqu'à ce que le
volume augmenté par un assez grand
nombre, soit sorcé de s'élever à la
surface de l'eau, par la différence qu'il
y a entre les pesanteurs spécifiques
des deux fluides.

La porolité n'est point égale partout; il y a des endroits où ces petits passages sont plus ouverts, & par lefquels l'air passe assez librement, & en assez grande quantité, pour obéir tout d'un coup à sa légéreté respective ; c'est ce qui donne lieu à ces petits jets qu'on remarque en différens endroits. L'eau que l'on met dans le gobelet, & dans laquelle l'œuf doit être entiérement plongé, ne sert que pour faire appercevoir les bulles d'air qui fortent de la coque, & qu'on ne pourroit pas remarquer, si elles passoient immédiatement dans l'air du récipient.

APPLICATIONS.

Les œufs qu'on nomme frais, font Tome I. II. Leçon. II. Leçon,

98 LEÇONS DE PHYSIQUE = ceux qui n'ont point encore perdu cette partie qu'on nomme le lait, & qu'on trouve d'abord en les ouvrant, quand ils ne sont point trop cuits: ainsi, sans avoir égard à la date, on pourroit nommer de même ceux qui seroient pondus depuis plusieurs jours, mais à qui l'on auroit épargné cette dissipation de substance, qui n'est qu'un effet de l'évaporation, qui se fait assez promptement par les pores de la coque. Non-seulement c'est une chose curieuse de conserver frais par leurs qualités des œufs qui font vieux par le tems; mais il y a un avantage réel à se procurer toujours en bon état un aliment qui devient souvent équivoque, quand il est gardé. Dans les voyages de mer, & dans les faisons où les poules ne pondent point, ou très - rarement, c'est une véritable ressource qu'une provision d'œufs qui sont aussi bons que s'ils étoient nouvellement pondus. Feu M. de Reaumur qui ne bornoit jamais ses recherches à des spéculations de simple curiosité, nous en a offert un moyen qui paroît aussi simple & plus sûr que tous ceux qu'on avoit imagi-

EXPÉRIMENT ALE. 99 nés avant lui. Il conseilloit de boucher les pores de l'œuf avec un enduit indissoluble à l'eau, & qui ait quelque confistance, asin que ce qui fait effort pour transpirer du dedans au dehors de l'œuf, ne puisse pas fondre ce qui fe fera moulé dans les pores comme autant de petits bouchons. Deux ou trois couches de vernis le plus commun, une légére couverture de graisse de mouton, ou de cire chauffée seulement jusqu'à liquidité, sont des moyens qui réuffissent également; & je puis dire d'après ma propre expérience, qu'un œuf ainsi gardé cinq ou six mois, fait encore le lait, & n'a pas le moindre mauvais goût. Cependant quand on les veut garder plus fûrement, & pendant plusieurs mois, il faut choisir des œufs qui n'ayent point été fécondés, autrement le germe étouffé sous le vernis ne manquera, pas d'en corrompre une partie.

Les œufs vernis ou enduits, comme on vient de le dire, n'ont pas feulement l'avantage de se conserver bons, pour être mangés comme frais; ils ont encore celui de pouvoir être couvés en toute sûreté, pourvû qu'on

II. Leçon.

Iij

100 LECONS DE PHYSIQUE = n'attende pas au-delà de cinq ou fix femaines; c'est donc un nouveau moyen pour tenter d'élever des oiseaux étrangers, qu'on ne peut transporter vivans qu'avec beaucoup de peine & d'embarras, & qui pour l'ordinaire ne s'accouplent point hors de leur pays. Leurs œufs vernis se transporteront aifément, seront propres à être couvés après le transport; & l'on sçait qu'une espéce couve les œufs d'une autre: une poule fait éclore des canards, des faifans, &c. Mais en pareil cas il ne faut pas oublier de préférer le vernis à tout autre enduit qui s'appliqueroit chaud, & qui pourroit tuer le germe; non plus que d'ôter le vernis même qui couvre la coque, quand il s'agit de mettre les œufs sous l'oiseau qui les doit couver. Cette transpiration qu'on avoit intérêt d'arrêter jusqu'alors, devient nécessaire pendant l'incubation; & ce sont encore deux faits également constatés par les expériences de M. de Reaumur ; 1°, qu'un œuf verni demeure envain fous l'oiseau qui couve ; 2º. que celui qui a été enduit, & qui ne l'est plus, se couve, & vient à bien, comme s'il ne l'avoit jamais été,

Expérimentale. 101 1V. EXPERIENCE.

PREPARATION.

II. Leçon.

Sur un morceau de papier blanc, on écrit, ou l'on dessine ce que l'on veut, avec une liqueur claire & fans couleur, qui est préparée avec du vinaigre distillé & de la litarge; on met ce papier, qui ne porte aucune marque d'écriture, quand il est sec, dans les premiéres feuilles d'un livre qui a 400 ou 500 pages; on étend ensuite avec une petite éponge fur la derniére feuille du livre, une autre liqueur qui n'est pas plus colorée que la premiére, & qui est une préparation faite avec l'orpiment, la chaux vive & l'eau commune : & l'on tient le livre fermé pendant trois ou quatre minutes. Fig. 4.

EFFETS.

QUAND on retire le papier qu'on avoit mis dans le livre, on trouve coloré d'un brun noir tout ce qu'on y avoit écrit ou dessiné avec la première liqueur; & l'on ne rencontre aucune marque semblable dans tout le reste du livre.

Iiij

102 Leçons de Physique

II. LEÇON. EXPLICATIONS.

CES deux liqueurs que l'usage a fait nommer encres de sympathie, sont de telle nature, que par-tout où elles se rencontrent, leur mêlange paroît fous une couleur qu'elles n'avoient ni l'une ni l'autre, avant que de se joindre. C'est un effet qui leur est commun avec plusieurs autres liqueurs, & dont nous essayerons de rendre raison, en parlant de la lumière & des couleurs. La derniére de ces deux liqueurs exhale une vapeur fort pénétrante qu'on apperçoit à l'odeur, & qui passe à travers des feuillets du livre en très - peu de tems. Or la vapeur d'une liqueur, c'est la liqueur même divisée en très - petites parties, & dans cet état elle est également propre à s'unir avec ce qu'on a étendu de la premiére sur le papier blanc; il s'y fait donc un mêlange des deux, qui paroît fous la couleur qu'elles doivent faire naître toutes les fois qu'elles se joignent ensemble; & comme cette couleur dépend absolument de l'union des deux, la vapeur, en pénétrant le livre, n'a dû laisser aucune

EXPÉRIMENTALE. 103
trace de son passage, puisqu'on suppose que les feuilles ne portoient
rien de la première liqueur.

Les

II. Leçon.

APPLICATIONS. Depuis qu'on a banni de la Physique toutes ces qualités occultes avec lesquelles on répondoit à tout, mais qui au fond ne rendoient raison de rien à quiconque vouloit des idées claires & distinctes; on ne doit plus recevoir la sympathie & l'antipathie, comme les causes d'aucun phénoméne, à moins qu'on ne prenne ces mots par abbréviation, pour l'action méchanique d'un corps sur un autre, comme quand on dit, tel remede, ou tel aliment, est ami de la poitrine, de l'estomac, &c. façon de parler, pour dire qu'on en doit attendre un bon effet, & pour ne point expliquer en détail comment se passe cette action qui conserve, ou qui répare. Mais si quelqu'un, pour rendre raison de l'expérience précédente avoit dit : la seconde liqueur fait paroître la premiére, parce qu'elle sympathise avec elle; il n'auroit rien dit pour ceux

qui veulent une explication intelligible; on exigeroit de lui qu'il fît con-

Iiv

noître en particulier, ou au moins en général, en quoi consiste cette sympathie; ses raisons ne se feroient goûter que quand il les établiroit sur des principes connus: car s'il supposoit dans son explication quelque chose de nouveau en Physique; il saudroit encore qu'il le prouvât, sans quoi ce ne seroit qu'une hypothèse qui n'auroit nulle sorce.

Ce qui fait recourir aux fympathies ou aux antipathies, pour expliquer certains faits, c'est ordinairement la difficulté qu'on trouve à les accorder avec les loix ordinaires & communes de la nature; mais ceux qui en usent ainsi, sont souvent bien peu informés de ces loix, & de l'usage qu'on peut faire de leur connoissance. Un homme instruit, sçait que les propriétés que nous connoissons dans les corps, font en bien petit nombre, mais qu'elles sont très-fécondes dans leurs applications: elles fe montrent par tant d'endroits différens, qu'il a peine à se persuader de les trouver jamais en défaut ; sans se flatter de les connoître toutes, il ne se permet pas légérement la liberté d'en imaginer

EXPÉRIMENTALE. 105 de nouvelles ; il aime mieux croire = qu'il ne les voit pas toujours où elles font, & que ce qu'il n'apperçoit pas est réservé à un génie plus heureux

ou plus clairvoyant.

Mais (il faut l'avouer) les faits font inexplicables très-souvent, parce qu'ils sont faux ou exagérés; & c'est agir prudemment que de les constater avant que de faire les frais d'une explication. Ceux qui les racontent ont cru voir ce qu'ils n'ont point vû, faute de discernement ou d'attention; ou bien ils les redisent d'après des gens intéressés ou de mauvaise foi : si la crédulité, l'amour du merveilleux, vient encore à l'appui de l'ignorance & de la prévention, on reçoit comme faits constans toutes les imaginations creuses & puériles qui se préfentent, & toutes les exagérations qui se transmettent de bouche en bouche, & qui s'accréditent par le tems & par l'autorité de quelqu'un à qui l'on suppose des lumières qu'il n'a pas. Je ne parle point de l'impossibilité prétendue d'accorder sur un instrument deux cordes, dont l'une feroit de boyaux de mouton, & l'autre II. Leçona de boyaux de loup; du danger imade boyaux de loup; du danger imaginaire de jetter dans le feu de l'urine
LEÇON. ou du fang; de la guérison qu'on attend de certains fruits qu'on porte
dans sa poche, ou qu'on jette dans
un puits; & d'une infinité d'autres remédes, ou préservatifs semblables,
dont tout le monde sent le ridicule,

rience qu'on puisse citer.

Mais qui est-ce qui n'a point entendu parler de la fameuse poudre de sympathie, & de ses effets admirables? On sçait que ce n'est autre chose que du vitriol calciné au Soleil & pulvérifé : ce minéral est astringent ; quand on l'applique sur une plaie il ne manque guére de la dessécher, & de la disposer à se fermer en peu de tems : jusqu'ici point de sympathie, dans le sens qu'on le suppose. Quand on employe cette poudre près du blessé sur un linge baigné de son sang encore chaud, il arrive quelquefois que la blessure s'en ressent; il n'y a encore là rien de fympathique que pour ceux qui ignorent que du vitriol en poudre s'exhale en particules insensibles, que l'air voisin porte aux environs, & qui s'at-

& qui ne s'appuyent d'aucune expé-

EXPÉRIMENTALE. 107 tachent par préférence aux endroits humides. Mais le merveilleux de cette opération, c'est quand cette poudre agit à une grande distance, comme à

4, à 6 ou à 10 lieues.

Il n'y a pas d'apparence, (il faut en convenir,) qu'on explique jamais un tel phénoméne avec quelque vraifemblance par les loix ordinaires & connues de la nature : mais pourquoi chercher à l'expliquer, ce prétendu phénoméne, s'il n'est qu'une exagération outrée de quelque Charlatan, foutenue aveuglément par la crédulité, & par l'envie d'entendre & de débiter des merveilles ? C'est le jugement qu'on doit en porter d'après ceux qui n'en ont voulu croire que leurs propres yeux *. Combien de pa- * Cours de reilles chiméres s'évanouiroient, si Chymiede Lel'on étoit de bonne foi dans le récit des faits, & de leurs circonstances!

II. LEÇON.

AUTANT nous fommes certains que la porofité est une propriété commune à tous les corps, autant nous Ignorons la quantité absolue de leurs pores. Comme tout ce qui est matiére est pesant,& que la pesanteur ne con-

108 LEÇONS DE PHYSIQUE vient qu'à ce qui est matériel; nous scavons bien qu'un corps a moins de vuide qu'un autre, quand à volume égal il pése davantage que lui : mais cette comparaison ne nous apprend que leur porosité relative; elle ne nous dit pas que dans l'un des deux il y a justement telle ou telle quantité de parties solides, ce qui nous feroit connoître évidemment de combien il est poreux. Le vrai moyen d'en être instruit, seroit d'avoir une matiére de comparaison qui fût toute solide, en qui la grandeur & le poids fussent absolument synonimes: car en comparant une portion de cette matiére avec un pareil volume d'une autre matiére; si celle-ci pesoit moitié moins, par exemple, on auroit raison de conclure, non-seulement qu'elle est une fois moins solide, comme nous faisons d'ordinaire; mais on scauroit de plus la juste valeur de ce moins, & l'on regarderoit comme certain, que la porosité de cette matière comparée seroit égale à sa solidité; puisque la pesanteur, attribut qu'on peut regarder comme inséparable des parties matérielles, s'y feroit sentir une

Expérimentale. 109 fois moins que dans une femblable =

étendue qu'on suppose toute matière.

Mais un corps de cette espéce ne fera jamais qu'une supposition qu'on ne peut pas réaliser : nous ne connoissons rien de semblable dans la nature. L'or est de tous les êtres matériels que nous connoissons, celui qui est le plus compact, & qui renferme le plus de matière sous un volume déterminé; il n'y a point de matiére connue, dont un pouce cube pese autant qu'un pouce cube d'or. Cependant ce métal est poreux, puisqu'en un moment le mercure s'y introduit, & que l'eau régale dont on se sert pour le dissoudre, agit de surface en surface jusques à la derniére, Plusieurs Physiciens * même ont porté leurs conjectures jusques à croire Traité d'Opqu'il pouvoit y avoir dans l'or autant part. 3. prop. de vuide que de plein. Quelle idée 8. aurons-nous donc de la porofité des autres corps? de l'eau commune, par exemple, qui pese environ dix-neuf fois moins que l'or; ou de l'air qui est 800 fois moins solide que l'eau.

Une matiére n'est pas toujours plus poreuse qu'une autre par cette

II. LECON.

110 LEÇONS DE PHYSIQUE = feule raison qu'elle a des pores plus ouverts; le nombre compense sou-LEÇON. vent, ou surpasse même dans l'une ce que fait la grandeur dans l'autre. Un bouchon de liége, quelque comprimé qu'il foit dans le col d'une bouteille, ne devient jamais aussi compact qu'un morceau de bois de quel espéce qu'il soit : jamais son volume diminué par compression ne le rend aussi pesant que le chêne, par exemple ; sa porosité est donc toujours plus grande; cependant ni le chêne, ni aucun autre bois semblable ne sera jamais aussi propre que le liége pour arrêter l'évaporation de quelque liqueur renfermée dans un vaisseau : il est donc plus que vrai-semblable que si dans l'un des deux la somme des vuides est plus grande, c'est moins par la grandeur que par le nombre des pores. Quand l'eau régale qui dissout l'or, refuse de pénétrer dans une masse d'argent, dira-t-on, en conséquence de la légéreté respective de ce dernier métal, qu'il a les pores plus ouverts que le premier? pourquoi ce qui entre dans celui-ci ne peut-il pas entamer l'autre, si, comme

EXPÉRIMENTALE. III on le suppose, ses parties plus distantes les unes des autres, donnent plus de prise au dissolvant? Ne vaudroit-il Leçon. pas mieux dire que les petits vuides dans l'argent, ne sont pas tout-à-fait aussi grands que dans l'or, mais qu'ils font beaucoup plus nombreux ?

IT.

Jusques ici l'explication ne va point mal. Mais si l'on répond que l'eau forte ordinaire, qui divise l'argent & la plûpart des autres métaux, ne donne aucune atteinte à l'or; il faut avouer que la grandeur respective des pores devient une raison bien foible: car pourquoi ce qui peut s'introduire dans une moindre ouverture, n'en peut-il pas pénétrer une plus grande? Est-ce qu'il faudroit une juste proportion entre les petites pointes du diffolvant, & les pores de la matiére diffoluble? ou bien, faudra-t-il pour étayer cette explication, joindre la figure à la grandeur?

On ne peut douter qu'une matière ne différe d'une autre par la configuration de ses parties insensibles; & de ce qu'elles sont différemment sigurées en différens corps, il s'ensuit que les pores dans les uns & dans les

112 LEÇONS DE PHYSIQUE autres doivent prendre différentes formes. A l'aide de ce principe qui est incontestable, on conçoit aisément qu'une particule folide pour se placer dans un de ces petits vuides, ou pour passer de l'un à l'autre, doit avoir non-seulement une grandeur proportionnée, mais aussi une figure convenable; & que l'une de ces deux conditions venant à manquer, l'autre peut fort bien ne pas suffire. C'est ici le cas où l'on est obligé de reconnoître, qu'avec des principes certains & avoués d'ailleurs, on demeure encore en doute sur les explications, quand on n'applique ces principes que par conjectures, & que l'expérience ne dit pas si l'on a bien deviné.

Au reste, quoique nous ignorions si c'est une proportion de grandeur, ou de figure, ou l'une & l'autre enfemble, qui font agir un dissolvant sur une matière présérablement à une autre, le fait n'en est pas moins connu, & depuis long-tems les Arts en ont

fait leur profit.

Le Graveur en taille-douce prend une planche de cuivre mince & bien polie; il l'enduit légérement d'une

espéce

EXPÉRIMENTALE. 113 espéce de cire préparée qu'il noircit à la fumée d'un flambeau; il dessine ensuite sur cette surface enduite, avec une pointe d'acier qui découvre le cuivre par autant de traits que son dessein en exige; il borde sa planche avec un cordon de cire amollie, il la pose horisontalement, & il la couvre de 3. ou 4. lignes d'eau-forte affoiblie avec de l'eau commune au tiers ou à moitié. En peu de tems le cuivre découvert par la pointe d'acier, céde à l'action du dissolvant, & se creuse plus ou moins, selon les vûes de l'artiste qui régle la durée de l'opération, pendant que la cire (qui ne se dissout point dans l'eau-forte) conserve le reste de la surface en son entier. C'est ainsi qu'on prépare une feuille de métal pour multiplier 3000 ou 4000 fois la même estampe, en la faisant passer successivement par la presse sur autant de feuilles de papier.

Le marbre est impénétrable à l'eau & à quantité d'autres liqueurs; mais il ne l'est pas pour l'esprit-de-vin, pour l'esprit de térébenthine, pour la cire fondue; ces exceptions ont été saisses par des personnes ingénieuses

Tome I.

LECON.

114 LECONS DE PHYSIQUE

= comme autant de moyens pour introduire dans l'intérieur du marbre des II. LECON. couleurs étrangéres, & pour imiter avec celui qui est blanc les autres espéces qui sont naturellement colorées. Feu M. Dufay, qui s'étoit beaucoup exercé à teindre des pierres dures, & qui a fait part à l'Académie des Sciences de ses découvertes en * Mem. de ce genre, * me fit voir plusieurs fois

P. 500

PAcad.1728. des tables de marbre artificiellement teintes, bien imitées, & si fortement pénétrées, qu'elles avoient été polies depuis sans rien perdre de leurs couleurs.

> Les vernis dont on fait maintenant tant d'usage, ne sont autre chose que des gommes de différentes espéces que l'on liquéfie par le moyen de quelque dissolvant. Telle s'étend dans l'esprit-de-vin, qui reste entière dans les huiles qu'on employe avec fuccès pour fondre les autres ; tout l'art confiste à connoître dans quelle matière chacune est dissoluble, & ce choix ne devient sans doute nécessaire que par la différence qu'il y a entre la porofité des unes & celle des autres.

II. SECTION.

De la Compressibilité, & de l'Elasticité des Corps.

Tout ce que nous avons dit de la porosité, a déja dû faire connoître que la grandeur apparente— d'un corps quelconque, excéde toujours celle qui appartient à la quantité réelle de sa matière propre : & cet excès varie peut - être autant que les espéces qui composent l'univers; car on rencontre rarement deux matières qui, à volumes égaux, pésent également.

C'est ce rapport du volume à la masse qu'on nomme densité: un corps est plus dense qu'un autre, quand la quantité réelle de sa matière dissére moins de sa grandeur apparente; ou (ce qui est la même chose) quand sous une grandeur donnée, il contient plus de parties solides. Le plomb est donc plus dense que le cuivre, l'air est moins dense que l'eau.

Mais le même corps peut changer

LEÇON.

116 LEÇONS DE PHYSIQUE de densité; c'est-à-dire, que sa masse restant la même, son volume peut varier, soit en augmentant, soit en diminuant. Quand un corps devient plus dense, c'est que ses parties solides se rassemblent dans un plus petit espace; & cela peut se faire de deux maniéres, ou lorsqu'on supprime une cause interne qui les tenoit plus écartées, ou quand on applique extérieurement une force qui les oblige à se rapprocher mutuellement. On peut distinguer l'une de l'autre, ces deux manières de diminuer le volume d'un corps, en appellant la premiére condensation, l'autre, compression; (quoique, à dire vrai, ce soit toujours condenser une matiére que d'occasionner la diminution de son volume de quelque façon que ce foit:) ainsi ferrer de la neige dans les mains pour en faire une pelotte, c'est la comprimer ; faire refroidir une liqueur, ou diminuer la chaleur qui dilate ses parties, c'est la condenser.

> Nous ne connoissons aucun corps dans la nature (en faisant abstraction des parties élémentaires ou atômes, s'il y en a) dont le volume ne puisse

EXPÉRIMENTALE. 117 être diminué de l'une de ces deux manières au moins, & affez fouvent de l'une & de l'autre façon. Quelque dure que puisse être une matiére, elle ne l'est jamais parfaitement; ses molécules sont toujours plus ou moins dilatées, soit par un mouvement interne qui peut être ralenti, soit par l'action d'un fluide étranger qui la pénétre, & qu'on peut vaincre par une puissance extérieure. Une barre de fer, par exemple, qui a été chauffée jusqu'à rougir, devient ensuite plus menue & plus dure, à mesure qu'elle se refroidit; parce que ses parties se rapprochent peu à peu, en perdant le mouvement violent qu'elles avoient acquis dans le feu. Une éponge mouillée & dilatée par l'eau qu'elle contient, se place dans un espace beaucoup moindre, quand on exprime le fluide qui remplit ses pores. Une boule de marbre ou de verre, un diamant même, jettés fur quelque chose d'aussi dur, rejaillissent à l'instant; & nous ferons voir bien-tôt que le mouvement de réflexion est une preuve de la compressibilité du corps réfléchi.

II. Leçon 118 LEÇONS DE PHYSIQUE

Tous les corps généralement, dans tel état qu'ils se présentent, solides, fluides, ou liquides, font susceptibles de condensation. Un morceau de marbre, & fur-tout s'il est noir, se trouve plus petit, quand il a séjourné quelque-tems dans un lieu beaucoup plus froid que celui où il étoit, lorsqu'on l'a mesuré d'abord. Une vessie ou un ballon rempli d'air pendant l'été, devient flasque pendant l'hyver; & la liqueur du thermométre ne defcend vers la boule, que quand son volume ne suffit plus pour remplir la partie du tube, qu'elle occupoit dans un tems plus chaud: mais nous remettons à parler plus amplement de la manière dont les corps se condensent, en traitant du feu & de la chaleur qui les raréfient.

Quant à la compression, on ne peut pas dire qu'elle convienne aussi généralement à la matière considérée dans tous ses états: tous les corps solides sont compressibles, & jusqu'ici l'expérience n'en a fait excepter aucuns: l'air se comprime considérablement, & produit par cette propriété des effets surprenans, que nous

Expérimentale. 119 rapporterons dans leur lieu. D'autres fluides, comme la fumée, la flamme, &c. n'ont point encore été éprouvés Leçon. dans cette vûe; sans doute parce qu'il seroit très-difficile, & probablement impossible de les appliquer seuls à des expériences de cette espéce : mais pour les liqueurs, elles n'ont jamais donné directement aucun figne de compressibilité, quelque chose qu'on ait fait; & il semble que l'on a fait d'abord tout ce que l'on peut faire : l'expérience de l'Académie del cimento, est aussi ingénieuse que le résultat devoit être peu attendu; & l'on ne voit pas que depuis qu'on l'a faite, personne ait réussi à faire mieux. M. Newton * la rapporte comme une chose fort curieuse; & comme d'Opt. liv. 2. s'il eût appréhendé qu'un fait aussi s. surprenant ne fût révoqué en doute, il assure qu'il le tient d'un témoin oculaire; pour moi, je le cite d'après mes propres yeux, & l'usage que j'en fais dans mes cours, a déja mis bien du monde à portée de le citer de même: voici le fait.

120 LEÇONS DE PHYSIQUE

II. Leçon.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.


Une boule de métal dont on a mesuré exactement la capacité, assez mince pour être flexible, remplie d'eau entiérement, & bouchée de saçon qu'elle ne puisse rien perdre par l'orifice, s'applique à une petite presse qui est représentée par la Fig. 5.


EFFETS.

Quand on fait agir la presse, la boule de métal comprimée, s'applatit un peu; & si l'on continue de presser, l'eau se fait jour à travers les pores, & paroît sur la surface en petites gouttes semblables à celles de la rosée.

EXPLICATIONS.

C'est une chose démontrée, qu'une capacité sphérique, à surfaces égales, contient plus de matière que toute autre : il s'ensuit qu'un vaisfeau qui a cette sigure, & qui est plein, ne peut pas la perdre qu'il n'arrive de ces deux choses l'une; ou qu'il augmente





EXPÉRIMENTALE. 121
augmente de furface, pour conferver
la même capacité, ou que ce qu'il
renferme, se condense en diminuant
de volume. Quand l'eau commence à
passer à travers le métal, la boule se
trouve un peu applatie; mais en mesurant sa capacité, on la trouve la même qu'elle étoit avant l'expérience:
il faut donc convenir que cet applatissement n'est dû qu'à la ductilité du
métal; & que le volume de l'eau n'a
point été sensiblement diminué sous
la presse.

Boyle, le Baron de Verulam, & quelques autres Physiciens qui ont essayé de comprimer l'eau dans des boëtes de métal, ont cru voir des marques de sa compressibilité; mais il y a toute apparence que ce qu'ils ont apperçu, devoit être attribué à la sle-xibilité ou au ressort du métal, ou bien à celui de quelques bulles d'air rensermées avec l'eau dans la même boîte.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

A B C D, Fig. 6. est un tube de Tome I.

II. Leçon.

verre fort épais, qui a 3 lignes de diamétre intérieurement, 7 pieds de hauteur, & qui est recourbé en forme de siphon; on y verse d'abord un peu de mercure qui remplit la courbure, & qui se met de niveau en BC; on emplit la partie CD avec de l'eau; on bouche exactement & solidement le tuyau en D, & l'on verse ensuite du mercure dans la branche AB, jusqu'à ce qu'elle soit entiérement pleine.

EFFETS.

La colonne d'eau qui est entre CD, oppose tant de résisfance à la pression du mercure, qu'elle ne diminue pas sensiblement de volume.

EXPLICATIONS.

Nous ferons voir en traitant de l'Hydrostatique, que la pression qu'exerce le mercure contre l'eau en C, est égale au poids de la colonne contenue dans la partie AB du tuyau. Or cette colonne de mercure qui a environ 6 pieds 10 pouces de hauteur égale trois sois le poids de l'atmosphére, ce qui fait une force trèsgrande; & puisqu'elle ne suffit pas

EXPÉRIMENTALE. 123 pour condenser sensiblement le volume d'eau contre lequel elle agit, II. c'est une marque que les parties des Leçon. liquides font fort dures, & que les matiéres qui sont en cet état sont bien peu flexibles.

APPLICATIONS.

Quoique dans les expériences que nous venons de rapporter, l'eau ne laisse appercevoir aucun signe de condensation; on n'en doit pas conclurre que les liqueurs soient absolument incompressibles, mais seulement qu'elles sont capables de résister aux efforts qu'on a employés jusqu'ici contre elles. Tout nous porte à croire qu'elles céderoient enfin d'une maniére sensible, s'il étoit possible de les soumettre à de plus grandes prefsions, & qu'elles cédent même à celles qu'on employe, mais d'une quantité trop petite pour être apperçue. Tous les corps solides se compriment, parce qu'étant poreux, leurs parties peuvent se rapprocher; mais qu'est-ce qu'une liqueur, sinon un assemblage de petits corps solides que nous ne pouvons pas regarder comme des

II. Leçon,

124 LEÇONS DE PHYSIQUE êtres simples, mais plutôt comme des petites masses composées de parties qui ne sont pas si étroitement unies, qu'elles ne laissent de petits vuides entre elles. Si la porofité rend les grands corps susceptibles de condensation, la même cause ne doit-elle pas avoir le même effet dans les plus petits? Tout ce qu'on peut dire, c'est que la compressibilité doit diminuer, comme la grandeur des corps ; c'est-à-dire, que les plus petits font les moins flexibles; que les parties d'une liqueur par conféquent, à cause de leur extrême petitesse, sont à l'épreuve des plus grandes forces: mais il fuit du même principe, qu'il n'y a d'abfolument incompressible, que ce qui est absolument simple; tels que seroient des atômes, ou les parties primordiales des corps, sur lesquelles nos épreuves n'ont point de prise.

Il est avantageux pour nous, que tout ce qui est liquide puisse résister à des pressions qui rapprochent & qui broyent les autres corps; tout ce que nous tirons des végétaux par expression, le vin, le cidre, les huiles, &c. ne se sépareroient jamais des

Experimentale. 125 parties solides qui les renferment, si = les liquides pouvoient se comprimer comme elles; les fruits soumis à la Legon. presse ne feroient qu'y changer de volume; la facilité que nous avons à extraire les sucs que la nature y a préparés pour nos usages, est presque toute fondée sur la résistance que les liquides opposent à la compression.

On ne peut s'empêcher d'être furpris, quand on considére que le même corps est compressible, ou ne l'est pas, felon qu'un dégré plus ou moins de chaleur change fon état : un morceau de glace donne des marques de compression; qu'il se réduise en eau, c'est toujours la même matière, mais elle ne se comprime plus : la cire, le soufre, le métal, &c. font voir la même chose, quand on les fait passer de l'état de folidité à celui de liquidité. Ce phénoméne est intéressant, & mérite bien une explication : malheureusement nous n'avons à offrir qu'une conjecture, mais pourtant, une conjecture appuyée sur des principes connus, & qui la rendent probable.

On peut dire que l'état naturel de Liii

126 LEÇONS DE PHYSIQUE presque tous les corps, est d'être solides; quand ils sont liquides, c'est parce qu'une matière étrangère les rend tels en pénétrant dans leur intérieur, & en donnant par sa quantité ou par son action à leurs parties une mobilité respective qui rompt toute liaison, & presque toute adhérence entre elles. C'est ainsi que de la terre abreuvée d'une quantité d'eau suffisante, devient de la boue qui coule sur un plan incliné; l'eau elle-même cesse d'être glace, aussi - tôt qu'un fluide plus subtil, & connu sous le nom de matière du feu, la pénétre en assez grande quantité, & y porte assez de mouvement pour détacher ses parties les unes des autres.

Si l'on demande maintenant pourquoi les corps folides peuvent se comprimer, & que les liqueurs n'ont pas la même propriété; ne peut-on pas répondre avec vraisemblance, que dans les premiers, les parties portent, pour ainsi dire, à faux, ou ne sont appuyées que sur un sluide sans action, qui céde au moindre choc; au lieu que dans les liqueurs, les molécules plus divisées, & par cette raison déja

EXPÉRIMENTALE. 127 moins flexibles, font appuyées fur un fluide assez abondant, & dont les parties font d'autant plus dures qu'elles font plus simples. Si l'on avoit mis dans un vase une certaine quantité de globules d'acier ou de quelque autre matière équivalente pour la dureté, elles ne céderoient point sensiblement à la compression, soit qu'elles fussent seules, pourvû qu'elles se touchassent; soit qu'elles fussent mêlées avec d'autres plus petites qui les empêchassent de se toucher; pourvû que ces dernieres fussent elles-mêmes inflexibles. Fig. 8.

II. Leçon.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

Sur une tablette de marbre noir bien unie, & enduite d'une très-légére couche d'huile, on laisse tomber plusieurs fois & en différens endroits de la hauteur de 2 ou 3 pieds une petite boule d'yvoire, qui peut avoir environ \(\frac{3}{4}\) de pouces de diamétre. Fig. 7.

EFFETS.

En regardant obliquement la tablette de marbre, on apperçoit partout où la boule d'yvoire a touché, une tache ronde qui a environ deux lignes de diamétre; & cette tache est plus grande aux endroits où la boule est tombée de plus haut.

EXPLICATIONS.

L'yvoire, quoique très-ferme, est une matiére compressible; quand il tombe sur le marbre, le mouvement de sa pesanteur qui l'y pousse, occasionne une pression qui porte une partie plus ou moins grande de cette petite sphére vers son centre; & comme ces parties comprimées sont de nature à se rétablir dans un instant, il ne reste aucune marque de cette compression sur la boule; mais la tache qui paroît sur le marbre, est une preuve incontestable de cet applatissement qui a disparu: si l'on n'aime mieux dire que le marbre s'est enfoncé & remis aussi-tôt, ce qui prouve également la compressibilité d'un corps très-dur : l'un & l'autre arrive

Experimentale. 129 probablement ; la même compression : creuse le marbe, & applatit la boule; mais de ces deux effets, le dernier est sans doute le plus considérable, à en juger par la nature de deux corps comprimés; c'est pourquoi nous nous arrêtons par préférence au dernier; & ce que nous allons dire pour faire entendre que la tache ronde prouve incontestablement l'applatifsement de la boule, en faisant abstraction de la flexibilité du marbre, obligeroit de même à conclurre un enfoncement dans le marbre, si l'on n'avoit aucun égard à la compressibilité de l'yvoire.

On sçait en effet que la circonférence d'un cercle appliqué par sa partie convexe sur une ligne droite, ne la touche qu'en un point G. Fig. 9. On sçait aussi que les surfaces sphériques sont composées de lignes circulaires, comme les plans le sont de lignes droites, & que les surfaces se comportent entre elles à cet égard, comme les lignes qui les composent. Si le cercle ne touche la ligne droite qu'en un point, la boule d'yvoire de notre expérience, posée simplement

II. Leçon.

130 LEÇONS DE PHYSIQUE fur la tablette de marbre, ne doit la toucher aussi qu'en un point. Quand on l'a laissé tomber dessus, s'il paroît qu'elle y ait été appliquée par une surface circulaire de deux lignes de diamétre: il faudra nécessairement convenir que le premier point de tangence g, Fig. 9. a été rapproché du centre, par l'effort de la compression, & qu'après lui ceux d'alentour ont souffert le même déplacement; ce qui a donné lieu à une portion sensible de la furface, d'être appliquée au marbre, & d'y laisser son impression sur la couche légére d'huile dont il est enduit.

APPLICATIONS.

Si l'on comprime un corps également dans toute l'étendue de sa surface, au cas qu'il soit compressible, il ne s'en peut suivre qu'une diminution de volume; parce que tous les points opposés obéissent à des puissances égales, & leurs situations respectives restent les mêmes. Tel est l'état des animaux qui vivent dans l'air ou dans l'eau; environnés de toute part de l'un de ces deux fluides, ils n'en remarquent point la pression, quoiqu'el-

EXPÉRIMENTALE. 131 le soit considérable; parce qu'elle se fait équilibre à elle-même, & qu'elle ne dérange rien de ce qui lui est fou- LEÇON. mis; mais si la compression devient plus forte d'un côté que de l'autre, son effet ne se borne plus à diminuer le volume; la figure change aussi, comme il est aisé de l'appercevoir dans une balle de plomb qui tombe sur quelque chose de dur, & qui y perd une partie de sa sphéricité; ou dans une balle de jeu de paume qui laisse souvent contre la muraille, des vestiges bien remarquables de son applatissement.

> De l'Elasticité ou ressort des Corps.

DE tous les corps qui se compriment, les uns demeurent dans l'état que la compression leur a fait prendre; c'est-à-dire, qu'ayant changé ou de grandeur, ou de figure, ils persévérent dans ce changement, lorsque la compression vient à cesser ; comme la balle de plomb qui reste applatie après sa chûte, & la pelote de neige qui demeure dans la forme qu'on lui a donnée avec les deux mains. Les autres au contraire se rétablissent, &

132 Leçons de Physique

reprennent, après avoir été comprimés, les mêmes dimensions & la même figure qu'ils avoient avant que de l'être. Telle est la bille d'yvoire de l'expérience précédente; telle est une bulle d'air qui partant du fond d'un vase plein d'eau, devient plus grosse à mesure qu'elle s'éléve vers la surface.

Les corps de la dernière espèce se nomment des corps à ressort, ou Elastiques; car l'Elasticité n'est autre chose que l'estfort par lequel certains corps comprimés tendent à se rétablir dans leur premier état. Cette propriété suppose donc qu'ils soient compressibles; & comme les liqueurs ne le sont pas d'une manière sensible, on doit conclure que si elles ont du ressort, leur réaction a trop peu d'étendue pour être visible.

Tous les corps mêmes qui sont élastiques, ne le sont pas au même dégré; il y en a tels qui ne se rétablifsent presque point, & alors l'élasticité est regardée comme nulle dans l'usage; & l'on appelle ces sortes de corps, mols, ce qui veut dire seulement une privation de ressort assez actif

pour être considéré.

II.

EXPÉRIMENTALE. 133

Ceux en qui la force élastique se fait = appercevoir, réagissent plus ou moins felon la dureté, la roideur, ou la difposition de leurs parties internes; mais il n'en est aucun dont on puisse assurer avec des preuves positives, que le ressort est parfait & inaltérable; on remarque presque toujours que cette qualité se perd, ou s'affoiblit par un long exercice, ou par une compression de trop longue durée : un arc qui est trop long-tems ou trop souvent tendu, garde enfin la courbure qu'on lui a fait prendre : le crin, la laine, ou la plume dont on garnit les meubles, perdent par succession de tems presque tout ce qu'ils offrent de commode dans la nouveauté, & leur affaissement n'est que la suite nécessaire d'un ressort usé.

Nous ne pouvons donc point nous promettre des expériences rigoureusement exactes pour établir la théorie du ressort; puisque les corps qui en ont le plus,n'en ont point encore autant qu'il leur en faudroit pour être parfaitement élastiques. De plus, on ne peut opérer que dans quelque milieu matériel: quand on choisiroit l'air

LEÇON.

134 Leçons de Physique

comme celui qui est le moins dense ; nous avons déja fait voir qu'il est capa-LEÇON. ble de résistance, & l'on doit s'attendre qu'il fera disparoître une partie de l'effet, si petite qu'elle soit : mais les àpeu-près suffisent, quand il ne manque presque rien à l'exactitude, & qu'on est obligé de rabattre quelque chose pour les empêchemens inévitables. L'acier trempé & l'yvoire m'ont paru affez propres aux effets par lefquels on peut prouver ce qu'il importe le plus de sçavoir touchant l'élasticité; c'est pourquoi je m'en servirai préférablement à toute autre matière dans les expériences de ce genre; mais comme celles dont j'ai fait choix, exigent quelques connoissances des principales propriétés du mouvement, dont nous n'avons encore rien dit, j'ai cru qu'il étoit à propos de les différer, d'autant plus qu'elles trouveront une place convenable parmi celles que nous employerons pour faire connoître les loix du mouvement dans le choc des corps.

> Les arts ont appliqué les ressorts à tant d'usages, que ce seroit une longue & inutile entreprise d'en faire ici

Expérimentale. 135 l'énumération; il nous suffira d'en citer deux ou trois exemples par lesquels on pourra juger de l'utilité des autres.

II. Leçon.


S'il est utile & commode de voyager à son aile, on doit presque tout cet avantage aux lames d'acier, aux bandes de cuir & aux autres corps élastiques sur lesquels on suspend les voitures: fans cette précaution, la plus belle chaise de poste, le carrosse le plus somptueux, ne seroit qu'un tombereau couvert & orné, dans lequel on seroit durement secoué; car si tout ce qui compose la voiture, étoit également inflexible, les divers mouvemens causés & brusquement interrompus par les inégalités du terrein, se communiqueroient dans toute leur force jusques aux personnes qui en occuperoient l'intérieur.

La mesure du tems est une chose si intéressante pour tout le monde, qu'il est peu de personnes qui n'ayent une pendule ou une montre, & qui ne la regardent comme un meuble nécessaire; ces sortes d'instrumens qu'on doit considérer comme des chessd'œuvre de l'art, sont animés par un

136 Leçons de Physique resfort, (Fig. 10.) formé d'une lame d'acier roulée sur elle-même dans un barillet qu'elle fait tourner en se développant, & dont le mouvement se communique par des roues dentées, jusques aux pivots qui portent les aiguilles, pour leur faire indiquer les heures & les minutes fur un cadran divisé à cette intention. Nous dirons ailleurs comment on est parvenu à rendre l'action du ressort presqu'égale pendant tout le tems qu'il se développe; car une difficulté qui se présente d'abord, c'est que cette action diminuant toujours à proportion que le ressort se détend, le mouvement doit aussi se rallentir dans toutes les piéces qu'il anime, & les aiguilles doivent faire les heures & les minutes plus longues vers la fin qu'au commencement. Il a donc fallu trouver un reméde à cet inconvénient, & l'on en est venu à bout par une invention fort ingénieuse, dont nous aurons occasion de parler en traitant de la théorie du lévier & des machines qui y ont rapport.

De quels secours ne sont point les ressorts dans l'Arquebuserie? Par quel autre moyen auroit-on pû opérer des

mouvemens



EXPERIMENTALE. 137 mouvemens aussi prompts, & aussi difficiles à être apperçus par un oiseau ou par un quadrupede que la nature a mis en garde contre tout ce qui menace sa vie, & qui oppose aux ruses & à l'adresse du Chasseur le mieux exercé, des organes d'un sentiment exquis, & une agilité qui trompe fouvent ses poursuites. Le chien d'un fusil conduit par un ressort, porte en un clin d'œil un caillou tranchant contre une petite piéce d'acier trempé; le feu prend à la poudre, & le plomb qu'elle chasse, frappe l'animal avant qu'il ait été averti par la flamme ou par le bruit, ou du moins avant qu'il ait pû profiter de cet avis.

Non-seulement les arts ont prosité de l'élasticité des corps, & en ont fait des applications heureuses; ils ont encore trouvé des moyens pour la faire naître ou pour l'augmenter dans ceux qui n'en ont que peu ou

point.

Tous les corps sonores, comme nous le dirons plus amplement à la suite des expériences sur l'air, doivent être à ressort; c'est pour cette raison qu'on fait les cloches & les tim-

Tome I. M

II. Leçon.

bres avec du cuivre & de l'étain fondus ensemble; parce qu'on a remarqué qu'un métal allié est plus dur, plus roide, & plus élastique, que les métaux simples dont il est com-

posé.

La plûpart des métaux mêmes sans être alliés, deviennent capables d'une plus grande réaction quand on les bat à froid; ce que les ouvriers appellent écrouir. On s'en apperçoit bien par la vaisselle : quand une cuillier ou une fourchette a été seulement fondue & limée, & qu'elle ne doit rien au marteau, la façon en est moins chere, mais elle est moins durable; la piéce fe fausse au moindre effort, & son poli n'est jamais si beau. Un ouvrier intelligent en horlogerie, en instrumens de Mathématiques, en orfévrerie, &c. ne manque jamais à écrouir ses ouvrages, non-seulement pour leur procurer plus de folidité, mais encore pour les faire valoir par un poli plus brillant, en rapprochant les parties, & en rendant les pores du métal plus serrés.

Mais de tous les corps dont on augmente artificiellement le ressort, il

EXPÉRIMENTALE. n'en est point de plus remarquable que le fer converti en acier; & parmi II. les différens procédés qu'on emploie LEGON. à cet effet sur ce métal, rien n'est

comparable à la trempe.

Il faut sçavoir 1°. que l'acier n'est point un métal particulier; on doit le regarder comme un fer préparé, quoiqu'il se trouve des mines qui en fournissent immédiatement : le plus ordinaire & le plus fin, est celui qu'on fait avec du fer forgé, en y introduifant une certaine dose de parties falines & fulfureuses qui augmentent sa dureté, & qui le rendent propre à être trempé. 2°. Tremper l'acier c'est le refroidir subitement dans le moment qu'on le fort bien rouge du feu; & cela se fait d'ordinaire en le plongeant dans de l'eau froide, ou dans quelque chose d'équivalent.

Les principaux effets de la trempe fur l'acier, ceux dont les arts tirent le plus d'avantage, sont de le rendre très-dur, d'augmenter son élasticité, & de la rendre durable. Tous les outils tranchans, jusqu'à ceux qu'on emploie pour cultiver la terre, en un mot depuis la lancette jusqu'à la bê-

Mij

II. Leçon,

che, tous sont redevables de leur principal mérite à cette dureté qui coûte si peu, & qui seroit désavantageuse par excès, si l'on n'avoit soin de la modérer par un dégré de chaleur qu'on fait succéder à la trempe,

& qu'on nomme recuit.

Les effets admirables de la trempe fur l'acier, ont intéressé avec raison la curiofité des plus habiles Phyficiens; tous ont désiré d'en scavoir les causes, & quelques-uns en ont hasardé des explications; mais on doit convenir que personne n'en a donné d'aussi vraisemblables, & d'aussi bien appuyées, que M. de Reaumur. Après une fuite d'expériences de plusieurs années sur cette matière, il suppose que l'action du feu chasse de l'intérieur des molécules de l'acier une grande partie des fels & des foufres qui s'y trouvent disséminés, sans pour cela les faire fortir de la masse totale : supposition fondée fur les effets ordinaires & connus du feu, & sur l'expérience; car on scait d'ailleurs que dans la fusion des matiéres hétérogénes & fixes, le feu procure toujours l'union

Expérimentale. 141 des parties semblables; & quand son action augmente jusqu'à un certain point sur l'acier, elle le dépouille de Legon, ses soufres & de ses sels, ce que les ouvriers appellent brûler. La trempe faisit donc l'acier dans un tems où ses principes, quoique les mêmes, se trouvent différemment mêlés; avant que de le chauffer, les parties salines, fulfureuses, métalliques, &c. extrêmement divifées & intimement mêlées, composoient un tout d'une tisfure plus uniforme, mais cependant plus hétérogéne dans ses molécules, puisque chacune participoit également des trois ou quatre fortes de matiéres qui entrent dans la composition de l'acier; mais après un dégré de feu suffisant, les sels & les soufres extraits & pelotonnés, pour ainsi dire, à part du métallique, font un tout plus homogéne dans ses molécules, mais plus poreux & moins lié, quant à l'assemblage de ces petits pelottons de différentes espéces. Cette hypothése (si c'en est une) explique fort heureusement tous les phéno-

1°. L'acier cassé paroît d'un grain

ménes qui résultent de la trempe.

plus grosser, après avoir été trempé, parce que les parties métalliques qui sont les plus apparentes par leur couleur, sont ramassées en petites masses plus écartées les unes des autres.

2°. La trempe donne plus de volume à l'acier qu'il n'en avoit avant ; & cela doit être, puisqu'elle le fixe dans un état où le mêlange & l'union

de ses principes est moindre.

3°. L'acier durcit à la trempe, parce que ses molécules se forment de parties plus semblables, & par cette

raison plus capables de s'unir.

4°. L'acier trempé se casse plutôt que celui qui ne l'est pas, ou qui l'est moins; c'est que la liaison de ses molécules entre elles est moindre, puisqu'elles sont de matières dissemblables, & qu'elles se touchent par moins de surface.

5°. Enfin le recuit rend l'acier trempé moins cassant & plus flexible ; parce qu'un dégré de seu modéré, fait renaître en partie le mêlange intime des parties dissemblables, & qu'il lui fait prendre un état moyen entre celui d'un acier non trempé, & celui d'une trempe excessive. EXFÉRIMENTALE. 143

Quoique nous ayons des procédés certains pour augmenter, diminuer, anéantir même le ressort de plusieurs corps, nous n'en connoissons pas mieux la cause de l'élasticité en général : tout ce qu'on a imaginé jusqu'à présent pour en rendre raison, ne peut passer tout au plus que pour des conjectures dont les unes font visiblement démenties par l'expérience, les autres supposent ce qui est en question, d'autres enfin plus ingénieuses que probables, n'ont aucuns faits qui parlent pour elles.

Dire qu'un ressort que l'on tend en le courbant, a les pores plus ouverts en sa partie convexe, cela est vrai; que les pores, quoique plus ouverts, ne le font point assez pour se remplir d'air groffier, & qu'ils en reftent vuides, cela paroît encore vraifemblable: mais ajouter, qu'en conséquence de ces petits vuides la presfion de l'air qui agit par le côté opposé, est la cause de l'effort qu'on voit faire au corps élastique, pour se remettre dans son premier état : c'est ce que la raison ne dit point; & ce que l'expérience dément formellement ;

LECON

car l'élasticité dans un lieu privé d'air grossier, fait ses fonctions comme Leçon. ailleurs.

J'appelle supposer ce qui est en question, que d'attribuer le ressort des corps à l'air qu'ils contiennent entre leurs parties, comme autant de petits ballons qui se trouvent comprimés dans la partie concave d'un bâton que l'on courbe, & qui réagissent jusqu'à ce qu'il soit redressé; car il restera toujours à sçavoir quelle est la cause du ressort de l'air.

Enfin si l'on suppose avec le changement de figure qui se fait dans les pores d'un ressort tendu, l'action d'un sluide qui se trouve par-tout, comme la matière subtile, ou quelque chose de semblable qui agisse par son poids; on pourra former une explication qui aura quelque vraisemblance: mais je doute fort qu'elle soit bien reçue, si elle n'est appuyée sur des faits; & je ne vois pas qu'il soit facile d'en trouver qui parlent clairement.

Ce que nous avons dit dans la Lecon précédente & dans celle-ci, touchant la divisibilité des corps, la subtilité de leurs parties, la variété de

leurs

EXPÉRIMENTALE. leurs figures, leur impénétrabilité & = leur porofité, nous engage & nous met à portée d'expliquer en général de quelle manière nous acquerons la connoissance des objets qui nous environnent: car tout ce qui est hors de nous-mêmes nous feroit inconnu, s'il ne faisoit sur nous quelque impression fensible; & cette impression qui prend tant de formes différentes, nous la devons presque entiérement à la petitesse extrême des parties qui nous touchent, & aux différentes figures qu'elles affectent : tout ce qui est matériel s'adresse à nos sens, & nous jugeons d'après leur rapport.

Digression sur les Sens.

On appelle Sens certaines facultés du corps animé, par lesquelles il entre en commerce avec les objets extérieurs; ce sont autant de moyens que le Créateur a établis pour mettre les animaux en état de se nourrir, de se désendre, de s'entre-aider, & de se reproduíre; car sans les sens, à peine différeroient-ils d'une plante qui végéte dans la même place où la na-

II. Leçon.

II. LECON.

146 LECONS DE PHYSIQUE ture l'a fait naître, qui séche sur pied, quand la nourriture ne lui vient plus, & qui fouffre avec une égale insensibilité la béche qui la cultive, & lefer

qui la fait périr.

L'exercice des sens est une fonction purement animale; elle convient aux bêtes comme à l'homme; il semble même qu'à cet égard, plusieurs espéces d'entre elles aient été mieux traitées que nous : quelle finesse dans l'odorat des chiens! quelle portée de

vûe dans les oiseaux de proie!

On distingue communément cinq fortes de sens; le toucher, l'odorat, le goût, l'ouie & la vûe. Il est peu d'animaux en qui l'on n'en compte autant : il y a peut-être dans la nature des efpéces qui ont quelque autre sens que nous ne connoissons pas; mais il en est de ceci comme de toutes les chofes qui ne sont point impossibles, on ne doit pas les admettre sans nécessité & sans preuves, Chaque sens a son siége particulier dans quelque partie du corps, qui à cet égard se nomme fon organe; l'oreille est celui de l'ouie; l'œil est celui de la vûe, &c.

EXPÉRIMENTALE. Quoique tout organe soit sensible, il ne l'est pourtant pas pour toutes fortes d'objets, chacun a son district particulier; l'oreille se dirigeroit en vain vers la lumiére, & la vûe la plus perçante n'apperçoit pas le son des cloches. Quand bien même l'objet seroit de la compétence de l'organe qu'il affecte, la sensation naturelle n'a lieu qu'autant que l'impreffion n'est ni trop forte ni trop foible. On ne distingueroit point l'image du foleil, si l'on recevoit immédiatement fes rayons dans les yeux; & peu de personnes pourroient lire une écriture de petit caractère à la clarté des étoiles.

Qu'est-ce donc que sentir, ou faire usage de ses sens? De la part du corps animé, c'est recevoir sur tel ou tel organe l'impression modérée d'un objet qui le touche ou par lui-même, ou par quelque matière intermédiaire: de la part de l'ame qui anime le corps, c'est se retracer les idées qu'elle a attachées à ces impressions, ou s'en former de nouvelles, si les impressions sont neuves. Un homme, par exemple, jette la vûe en plein jour

N ij

II. Leçon,

148 LECONS DE PHYSIQUE fur un chien; la lumiére qui éclaire le corps de cet animal rejaillit jusqu'au spectateur, & frappe dans le fond de son œil une place terminée comme la figure de l'animal qui la réfléchit, à cette occasion l'ame se rappelle l'idée d'un chien qui lui est familiere, & si la mémoire lui fournit l'idée de quelqu'autre chien, elle juge que celui-ci est grand, petit, maigre, gras, &c. par la comparaison qu'elle en fait. De sçavoir maintenant comment l'organe affecté par l'objet détermine l'esprit à penser en conséquence, c'est ce que la Physique n'apprend point, & c'est, je crois, ce qui surpasse la portée de nos foibles lumiéres; l'union de l'ame avec le corps, le commerce de ces deux êtres de natures si différentes, est un de ces mystères qu'il est peut-être plus sage d'admirer que d'étudier.

Mais comme un homme voit un chien, un chien voit un homme; & fes actions, comme les nôtres, femblent se régler sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, &c. Que se passe-t-il donc dans cet animal, lorsqu'un objet affecte quelqu'un de ses sens?

Experimentale. 149 C'est encore une de ces questions = épineuses, où la curiosité échoue, & fur lesquelles les génies les plus heureux ont épuifé toute leur Philosophie. Selon la doctrine de Descartes, une bête n'est autre chose qu'une belle machine dont toutes les piéces sont si bien assorties, & ordonnées avec une correspondance si parfaite, qu'une d'entre elles étant remuée par l'objet extérieur qui a prise fur elle, détermine immédiatement les autres à se mouvoir de telle ou telle manière; les nerfs de chaque organe ayant été touchés comme il convient, transmettent aux membres les différens mouvemens d'où résulte telle ou telle action. Cette pensée est grande, elle est hardie, elle est même séduisante, quand on la médite sans préjugé; mais c'est l'affoiblir que de fonder sa vraisemblance sur des exemples, ou fur des similitudes. Celui de tous les êtres animés qui nous paroît le plus imbécille, une huître, un limaçon est sans comparaison audessus de la montre la plus parfaite, & de tout ce que l'art a pû produire de plus ingénieux. Le commun des

II. Leçon:

N iij

150 Leçons de Physique

II. Leçon. hommes ne consentira jamais à regarder les actions d'un cheval, d'un chien de chasse, &c. comme les effets d'un méchanisme purement matériel: pour goûter cette Philosophie, il faut être un peu Philosophe.

On aimera mieux croire fans doute, que le corps d'une bête est animé & conduit par un être intelligent qui commence & périt avec lui, & qui est le principe de toutes ces penfées, & de tous ces jugemens dont on croit voir des signes dans les diverses actions des animaux. Ce sentiment qui n'est contraire ni à la raison, ni aux dogmes de la foi, a trouvé & trouve encore aujourd'hui des défenseurs, non-seulement dans le vulgaire qui juge fur les apparences, mais même parmi ceux qui méditent, & qui n'admettent les opinions qu'après les avoir discutées.

Maisil ne faut pas croire qu'en prenant ce parti, on se mette au-dessus de toute difficulté. Quand on considère la docilité d'un animal domestique, les ruses & l'adresse de certaines bêtes voraces, le bon ordre & l'industrie qui regnent dans quelques

EXPÉRIMENTALE. éspéces d'insectes qui vivent & travaillent en société, il est bien commode d'en rendre raison, en disant: c'est que tous ces animaux sont intelligens; l'Auteur de la Nature les a rendus tels, en renfermant dans leurs corps une ame d'une espèce convenable à leur condition. Mais cette ame, si elle est immatérielle, comme on le prétend, que devient-elle, lorsqu'un ver ayant été coupé en cinq ou six parties, & même davantage, chaque morceau continue de vivre & redevient un animal complet, & tout-à-fait semblable à celui qu'on a divisé? comme on l'a observé depuis une vingtaine d'années: *y avoit-il donc plusieurs ames dans le même individu, ou bien ce Insectes de quin'est point matière est-il divisible? M. de Reau-Ne poussons pas plus loin cette ques- dans la Prétion dans un ouvrage où nous nous face, p. 54. sommes interdit toute discussion métaphyfique; attachons-nous feulement à ce qui peut être éclairci & prouvé par l'expérience & par les observations. Quant à la matière présente, bornons-nous à faire connoître le méchanisme de nos sensations; conduisons l'objet extérieur ou son

II. LEÇON .

Niv

action jusqu'à la partie du corps deftinée à recevoir son impression; & voyons quelles sont les conditions nécessaires dans l'objet pour être activement sensible, & dans l'organe pour être afsecté efficacement.

Le Toucher.

LE premier & le plus général de tous les sens, c'est le toucher; on peut dire que tous les autres ne sont que des espéces dont il est le genre. Quand nous entendons le son de la voix ou de quelque instrument, cette fensation n'est autre chose qu'un ébranlement causé à une certaine partie de l'oreille par le contact de l'air, qui est lui-même agité par le corps fonore. Quand nous voyons quelque objet, c'est que la lumiére qui vient de lui à nous, frappe le fond de l'œil. Ainsi, goûter, voir, entendre, sentir les odeurs; c'est à proprement parler, être touché en telle ou telle partie du corps par une certaine matière : au lieu que le toucher que nous regardons comme le premier fens, consiste à recevoir sur telle partie sensible du corps que ce puisse

EXPERIMENTALE. 153 être l'impression d'une matière quelconque; les autres fens ont des organes & des objets qui leur sont propres, celui-ci occupe toute l'habitude du corps animé, & s'étend à tout ce qui est palpable. Il a encore cet avantage fur eux, d'être en même tems actif & passif; non-seulement il nous met en état de juger de ce qui fait impression sur nous; mais encore de ce qui résiste à nos impulsions: nous pouvons appliquer l'organe à l'objet, & c'est par le tact que nous nous assurons le plus souvent de l'état des corps qu'il nous importe de connoître.

Les corps que nous touchons ou qui nous touchent, font sur nous des impressions dissérentes, felon leur grandeur, leur figure, leur consistance, le degré ou l'espéce de leur mouvement, leur température, &c. & l'on a donné à toutes ces dissérentes manières de toucher, des noms qui expriment ou l'action des corps sur nous, ou notre action sur eux: heurter, piquer, pincer, grater, chatouiller, sont autant d'expressions qui désignent ce que dissérens corps nous sont sen-

II. Leçon.

154 LEÇONS DE PHYSIQUE. tir en conséquence de leur masse, de leur forme, ou de leur manière de se mouvoir: froid, chaud, dur, mol, fec, mouillé, dénotent d'ordinaire le sentiment qu'excite en nous une matiére que nous tâtons, par l'état actuel des parties qui composent sa masse. Comme les sensations du toucher peuvent varier à l'infini, par la variété même de l'objet, par l'étendue & la disposition de l'organe, & par les dissérentes maniéres dont l'un est applicable à l'autre; il s'en faut bien qu'elles foient toutes caractérisées par des noms propres : ceux que nous venons de rapporter, & plusieurs autres que nous omettons, ne sont, pour ainsi dire, que des termes génériques par lesquels on fait connoître, à l'aide de quelque circonlocution, les différentes espéces qui peuvent s'y rapporter; on désigne, par exemple, par chatouillement, ce que l'on sent dans la gorge lorfqu'une légère âcreté excite la toux; on dit qu'un reméde pince, pour faire entendre qu'il laisse des impressions sur les parties qu'il affecte.

Quoique l'objet du toucher soit

EXPÉRIMENTALE. pour l'ordinaire hors de nous-mêmes, les différentes parties du même corps ne laissent pas que d'agir réciproquement les unes sur les autres, tant au-dehors qu'au dedans. Quand la main touche le pied, elle fait naître deux sensations : elle est en même tems l'objet de l'une, & l'organe de l'autre. Pour ce qui se passe à l'intérieur & fans interruption, l'habitude nous en dérobe le sentiment; l'action des fluides sur les solides du corps animé, par exemple, ne devient sensible que quand elle apporte quelque changement à l'état naturel; & alors nous éprouvons ce qu'on nomme langueur, foiblesse, ou douleur.

On peut dire en général que les ners sont dans chaque organe, la partie la plus essentielle, celle où l'action de l'objet se termine, & après laquelle nous n'appercevons plus rien de méchanique: le fond de l'œil où s'accomplit la vision, n'est qu'une expansion du ners optique; la lame spirale du limaçon, qu'on regarde comme la piéce qui a le plus de part aux fonctions de l'oreille, est un composé de fibres nerveuses; & l'organe

II. Leçon. 176 LECONS DE PHYSIQUE

LEÇON.

Traité des

du toucher se trouve dans toute l'étendue de la peau,i& sur-tout à la surface extérieure, où l'on sçait qu'aboutissent tous les petits nerfs qui forment la plus grande partie de ce tissu. Ce sont ces petits mammelons dont l'arrangement forme des fillons vers l'extrémité des doigts, où le tact est ordinairement plus fin qu'ailleurs. * M. le Cat. Un habile Anatomiste * a donné il y a environ 15 ans, une description très-Sens, p. 207. concise & très-intelligible de la peau, dans un ouvrage écrit ex professo sur les Sens, & dont je crois la lecture très-utile à ceux qui voudront sur la matière présente des instructions plus détaillées que celles qui peuvent être

> placées ici. Ce qui prouve incontestablement que les nerfs ont plus de part au toucher qu'aucune autre partie, c'est que ce sens exerce ses fonctions plus ou moins parfaitement, selon l'état actuel de ces petites houpes nerveuses qu'on apperçoit à la superficie de la peau, & qui ne sont couvertes que par l'épiderme Fig. 11: qu'une brûlure les desséche, qu'une matiére étrangère les couvre, qu'un trop grand froid les

Expérimentale. 157
contracte, ou les empêche de s'épanouir; la partie où ils font, perd le
fentiment, & ne le reprend que quand
ces accidens cessent. Les maladies des
ners qui ne vont pas jusqu'à détruire
leur œconomie, sont aussi les plus aigues, parce qu'elles attaquent immédiatement l'organe des sensations;
l'engourdissement & la paralysie qui
suspendent ou qui arrêtent leurs sonctions, causent pour l'ordinaire l'insensibilité.

Des accidens, des maladies, la vieillesse nous privent souvent des autres sens. On voit assez fréquemment des aveugles, des fourds, des gens même en qui le goût & l'odorat font presqu'entiérement usés: mais il est fort rare de trouver un homme universellement insensible; on en apperçoit bien-tôt la raison, dès que l'on considére par combien d'endroits nous pouvons fentir les objets extérieurs comme résistans, en comparaifon des parties organiques qui nous les représentent comme sonores, colorés, favoureux, ou odorans. L'étendue du toucher est donc une ressource que la nature a ménagée à

II. Leçon. 158 LEÇONS DE PHYSIQUE

II. Leçon. ceux qui par quelque accident ou par vice de conformation, se trouveroient privés des autres facultés. Aussi voyons-nous des aveugles suppléer par le tactà l'usage des yeux; & quoique le toucher ne soit pas à beaucoup près aussi délicat que les autres sens, lorsqu'il est employé par nécessité, & perfectionné par l'habitude, il fait presque des prodiges. Je ne voudrois pourtant pas garantir tous ceux que l'on raconte à cette occasion; car tout ce qui tient du merveilleux, ne va guère sans exagération.

Le Goût.

Comme l'accroissement & l'entretien des animaux dépend de la nourriture qu'ils prennent, & du choix qu'ils en font, il étoit à propos que la nature les conformât de maniére à désirer d'eux-mêmes les alimens nécessaires, & à distinguer ceux qui leur conviennent: il falloit qu'ils sentifsent le besoin de manger, & qu'ils eussent du plaisir à le satisfaire; car sans cette précaution le soin de vivre eût été à charge. Jugeons-en par nous-mêmes: s'il n'étoit question

EXPÉRIMENTALE. 170 que de remplir un devoir, lorsqu'on se = met à table, il faut convenir que les indigestions ne seroient pas communes, & qu'on verroit peut-être bien des gens périr d'inanition. L'Auteur de la nature a prévû ce désordre, & pour le prévenir, il a mis en nousmêmes des motifs plus puissans que notre paresse. L'estomac à jeun nous follicite par la faim & par la foif; & la bouche qui fournit à ces deux appétits, se dédommage par les saveurs qu'elle goûte, de la peine qu'elle prend de préparer les alimens pour la digestion.

Le goût confiste donc à sentir l'impression des matières savoureuses, à les admettre ou à les rejetter, suivant les idées qu'elles sont naître, & les

jugemens qui s'ensuivent.

Les faveurs, objet du goût en général, viennent principalement des parties falines qui se trouvent dans toutes les matières tant animales que végétales, que l'on prend ou comme alimens, ou comme remédes. Ces petits corps anguleux & tranchans, sont plus propres que d'autres à pénétrer jusqu'à l'organe immédiat,

II. Leçon. 160 LECONS DE PHYSIQUE

& à s'y faire sentir. On peut en juger en mettant fur la langue quelque Leçon. grain de fel pur; de quelque nature qu'il foit, il y fait une impression très-forte; & l'analyse fait voir que de tous les mixtes ceux qui affectent le plus l'organe, font les plus abondans en fels.

> On ne connoît qu'un très-petit nombre de sels qui différent essentiellement, ou dont les parties divisées par l'eau, se montrent sous des figures constamment différentes. Delà il fuit que les fensations du goût feroient peu variées, si les particules falines que les alimens contiennent, agissoient seules, & sans mêlange sur l'organe: mais la nature les a mêlées avec d'autres principes qui ne font point favoureux par euxmêmes, qui n'agissent que comme objet du toucher en général, & dont le nombre & les doses se combinent à l'infini. L'eau, la terre, l'air, le foufre, l'huile, font autant de matiéres insipides, que la nature a fait entrer dans presque tout ce qui sert de nourriture aux animaux. La bouche en broyant ces alimens, fournit

EXPÉRIMENTALE. 161
une lymphe qui facilite la défunion des parties, & qui développe les principes; mais ce dissolvant n'a point autant de prise sur les uns que sur les autres: le soufre & l'huile, par exemple, ne cédent point à son action, comme la terre & l'eau; ainsi la partie saline ne se dégage jamais qu'imparsaitement, & à proportion de la dissolubilité de ce qui lui est étroitement uni.

Les saveurs les plus simples, & sur lesquelles on est le plus généralement d'accord, font celles où les fels font les moins mitigés par le mêlange d'autres matiéres. Tout le monde connoît ce que c'est que salé, aigre, doux, amer, âcre, &c. Ces différentes senfations font si marquées, qu'on les distingue d'abord; elles sont comme la base de toutes les autres qui deviennent d'autant plus difficiles à décider & à exprimer, qu'elles s'éloignent davantage de cette premiére simplicité. L'amer du caffé, par exemple, corrigé par la douceur du fucre, produit une fensation mixte; le suc des fruits mêlé à l'esprit de vin, prend un nouveau goût; celui des viandes Tome I.

II. Leçon. II. Leçon. change presque entiérement, & le déguise de mille façons différentes, comme on le sçait par un nombre infini de préparations & de mêlanges, dont la délicatesse a fait un art important & très-cultivé dans notre siécle.

Il en est de l'objet du goût, comme de celui du toucher: les saveurs mixtes dépendant de certains principes, dont l'assemblage est susceptible d'une infinité de combinaisons, il est impossible de les désigner toutes par des noms particuliers; on les exprime en les comparant à quelque saveur plus simple, ou plus connue, on dit: tel fruit est un peu âcre & amer; tel poisson a le goût du brochet, &c.

Quant à l'organe du goût, tous les Anatomisses conviennent qu'il est principalement dans la langue; un grand nombre d'entre eux croient qu'il est dans tout l'intérieur de la bouche, & plusieurs l'étendent jusqu'à l'ésophage, & même jusqu'à l'estomac. Il n'est guère possible de le borner à la langue seule; chacun peut reconnoître par sa propre expé-

EXPÉRIMENTALE. rience, que les matiéres savoureuses se = font sentir, quoi que plus foi blement, au palais & au fond de la bouche; mais ce qui décide la question, c'est qu'on a vû des gens qui n'avoient point de langue, & qui goûtoient les alimens *.

C'est encore ici l'extrémité des si- PAcadémie, bres nerveuses, ces mammelons dont nous avons parlé précédemment, qui sont l'organe immédiat : mais au lieu que pour la sensation du toucher, ils font petits & recouverts par une furpeau assez unie, & d'un tissu un peu serré; dans toutes les parties de la bouche où on les observe, & surtout dans la langue, Fig. 12. ils font plus gros, moins compacts, & comme enchâssés dans une enveloppe ou gaine fort poreuse, abbreuvés d'ailleurs d'une lymphe qui entretient leur fouplesse, & qui met la partie savoureufe des alimens en état de les toucher comme il convient pour se faire sentir : car elle la divise, elle la développe de maniére qu'elle lui donne le dégré de ténuité nécessaire pour s'insinuer par cette peau très-poreuse, qui couvre les petites houpes nerveuses sur lesquelles l'impression doit se faire.

II. LEÇON.

* Mem. de

164 Leçons de Physique

II. Leçon.

L'organe du goût se gâte & s'use comme les autres, par un usage immodéré de son objet : les saveurs fortes, comme les liqueurs spiritueuses, & ces ragoûts étudiés si fort à la mode aujourd'hui, diminuent beaucoup la sensibilité des parties qui en souffrent fréquemment l'impression: l'expérience fait voir que des gens du peuple qui s'accoutument à boire de l'eau-de-vie, trouvent le vin insipide, & ne s'en soucient plus. On sçait au contraire que les bûveurs d'eau ont pour l'ordinaire le goût plus délicat & plus fin que d'autres. Cette boisson qui n'a presque point de saveur, conserve à l'organe toute sa fensibilité, parce qu'elle n'est point capable d'en altérer la texture. La maladie ou le grand âge peuvent aussi causer du désordre dans cette partie : au commencement d'une convalefcence, il arrive affez fouvent qu'on ne trouve point de goût aux alimens, parce qu'il reste encore quelque humeur vicieuse qui engorge les pores par où doivent passer les particules favoureuses; ou parce que les accidens qui ont précédé, ont EXPÉRIMENTALE. 165 causé quelque altération à l'organe même, qui n'est point encore revenu à son état naturel. Mais insensiblement je passe les bornes de mon dessein; c'est à la Médecine & à l'Anatomie qu'il convient d'ajouter ce qui peut manquer ici; peut-être en ai-je déja trop dit.

L'Odorat.

L'ODORAT, à qui nous donnons le troisiéme rang parmi les sens, quand on commence par ceux qui sont en apparence les plus groffiers, pourroit être placé au second, si l'on avoit égard à l'ordre que la nature observe dans leur exercice; car ses fonctions précédent souvent celles du goût. Ce qu'on nous présente pour boire ou pour manger n'est guère admis, s'il n'a été examiné d'abord, & approuvé par ce fens; & les animaux qui n'ont le tact ni aussi familier, ni aussi fin que nous, décident par l'usage du nez de la qualité des alimens, fur-tout quand ils font nouveaux pour eux, & qu'ils n'y voient pas extérieurement de ressemblance avec ce qui leur est déja connu. Il y a

II. Leçon. 166 Leçons de Physique

LECON.

une si grande affinité entre le goût & l'odorat, tant par rapport à l'objet que par rapport à l'organe, que quelques Anatomistes ont regardé le dernier comme une partie, ou comme un supplément du premier : & en effet, nous voyons que tout ce qui agrée à l'un, est naturellement ami de l'autre; on est tenté de porter à la bouche les matiéres qui exhalent des odeurs agréables, à moins qu'on ne leur connoisse des qualités nuisibles; & si par hazard quelque aliment usité déplaît à l'odorat, il faut que l'habitude, ou quelques motifs puissans l'emportent sur la répugnance qu'il ne manque pas de faire naître, fans quoi l'on s'en interdit l'usage sur le seul témoignage du nez.

Comme l'intérieur du nez communique avec la bouche, il arrive souvent que les sensations du goût s'allient & se confondent, pour ainsi dire, avec celles de l'odorat: cet effet arrive quand les saveurs sont spiritueuses & volatiles, & de-là vient encore une variété prodigieuse de sensations différentes, selon que l'odorat y a plus ou moins de part. Quand il y

EXPÉRIMENTALE. 167
participe un peu trop, comme fon =
organe est plus sensible que celui du
goût, celui-ci perd ses droits pendant
quelques instans, & toute la sensation appartient à l'odorat. Qui est-ce
qui ne sçait pas ce qui arrive, lorsqu'on prend une dose de moutarde
trop peu mesurée, ou lorsqu'on ava-

le à longs traits de la biére forte? Il paroît que le principal objet de l'odorat sont les sels volatils, & que la variété des odeurs vient du mêlange & de la quantité des autres principes qui leur sont unis; car les sels fixes ne sont point capables de se porter à l'organe, & tout ce qui n'est point sel dans les mixtes, quoiqu'il foit volatil, semble insipide à l'odorat comme au goût. On observe au contraire que tout ce qui facilite l'évaporation des matiéres où le sel volatil abonde, tout ce qui développe leurs principes, les rend aussi plus odorantes. Quand on cuit les viandes, l'action du feu divise les parties, les subtilise, & les met en état de s'exhaler, & alors les odeurs deviennent très-sensibles. Quand on mêle du fel ammoniac en poudre II. Leçon. II. Leçon.

avec de la chaux vive, ou avec du fel de tartre, le volatil urineux se développe, s'éléve, & se fait vivement fentir.

Par la même raison la fermentation ou la putréfaction, rend presque toujours odorantes les matières qui ne le sont que peu ou point dans leur état naturel, & le plus fouvent elle change la qualité des odeurs; car ces mouvemens intestins donnent lieu aux parties de se déplacer & de se désunir. Si cette désunion ne va pas jusqu'à décomposer les molécules, & changer la nature du mixte qui commence à fermenter, il devient feulement plus odorant, parce qu'il s'exhale en plus grande quantité; mais si les principes mêmes qui composent les parties intégrantes viennent à se séparer, non-seulement l'odeur en deviendra plus forte & plus pénétrante, parce que l'organe sera affecté par des parties plus subtiles; mais la fensation sera aussi d'une autre espéce, parce qu'elle sera causée par des corpuscules d'une structure différente, où la partie saline, qui est le principal agent, sera plus

EXPÉRIMENTALE. 169 plus ou moins abondante, plus ou = moins développée, un fruit qui se pourrit, la chair qui se corrompt, exhalent des odeurs de plus en plus défagréables, non-feulement parce qu'elles font plus fortes, mais aussi parce qu'elles sont plus fétides, à mesure que la corruption fait du progrès.

Les odeurs sont encore moins caractérifées que les faveurs ; à peine convient-on de quelques fensations fondamentales dans ce genre; on fe contente de rapporter les moins connues à celles qui le sont davantage, à la fumée du foufre, à celle du linge brûlé, à la vapeur de l'urine, à la violette, au citron, à l'ambre, &c. sans prétendre pour cela que ces différentes exhalaisons soient des odeurs fimples.

Il faut que les corpufcules capables d'ébranler l'organe de l'odorat, foient susceptibles d'une prodigieuse divisibilité. On en peut juger par une expérience, & par quelques observations que nous avons rapportées dans la premiére Leçon, * pour prouver en général combien les corps périence, pag. font divisibles. Ces petites parties ex-

Tome I.

LEÇON.

halées flottent dans l'air, & c'est ce II. fluide qui les porte dans l'intérieur Leçon. du nez où est l'organe, lorsque par la respiration nous le déterminons à

prendre cette voie.

L'intérieur du nez est revêtu d'une membrane que les gens de l'art nomment pituitaire: c'estsun tissu compofé pour la plus grande partie des fibres du nerf olfactif, qui est communément reconnu pour être le sujet des odeurs. Ces fibres nerveuses aboutissent à la superficie de la membrane en forme de petits mammelons fur lesquels se fait l'impression des corpuscules odorans. Fig. 13. Voilà en gros l'organe de l'odorat, un plus grand détail ne conviendroit point ici: ceux qui voudront être plus amplement instruits, trouveront de quoi se satisfaire dans le traité de M. le Cat, que nous avons cité ci-dessus, dans l'exposition anatomique de M. Winflow, &c. Nous ajouterons seulement que les odeurs fortes, & leur fréquent usage, endurcissent, pour ainsi dire, les petites houpes nerveuses ausquelles elles s'appliquent, & leur font perdre ce sentiment délicat dont

EXPÉRIMENTALE, 171 jouissent ordinairement les personnes = qui n'usent point de tabac ni de parfums. On perd aussi pour un tems l'usage de ce sens, lorsqu'une humeur surabondante ou trop épaissie, au lieu d'abreuver l'organe autant qu'il convient seulement pour entretenir fa fouplesse & sa sensibilité, engorge & gonfle toute sa substance; car alors non-seulement il n'est point dans son état naturel, & disposé à bien faire fes fonctions, mais l'air qui passe avec peine n'y porte pas la même quantité d'odeur : c'est ce qu'on éprouve, & qu'il est aisé d'observer, lorsqu'on a cette indisposition qu'on appelle rhume de cerveau.

Nous ne dirons rien ici de l'ouie ni de la vûe, parce que nous aurons occasion d'expliquer le méchanisme de ces deux sens, en traitant des sons & de la lumière; il nous reste à terminer cette digression par quelques remarques qui se présentent encore à faire sur les sens en général considérés dans l'homme.

1°. Quoique suivant l'intention de la nature, chaque individu de notre espéce doive faire de ses sens l'usage

II. Leçon.

Pij

II. LEÇON.

Avril 1667. 17250

172 LEÇONS DE PHYSIQUE = pour lequel ils lui sont accordés, cependant il est indubitable que toutes ces facultés ne sont point au même dégré de délicatesse dans tous les * Journal hommes. On en a vû * dont l'ododes Sçavans. rat étoit aussi fin que celui des chiens Mem. de Tré- de chasse; d'autres distinguent les obyoux, Fev. jets dans un lieu assez obscur, pour les dérober aux vûes ordinaires; certains gourmets apperçoivent dans les ragoûts & dans les liqueurs, des différences qui échappent aux goûts communs. Un tel dégré de perfection dans les fens, lorsqu'il ne s'y trouve pas aux dépens de quelque avantage plus précieux, doit être regardé comme un bienfait de la nature; mais que la fensibilité de nos organes foit limitée, & que nos fensations n'ayent pastoute l'étendue qu'elles pourroient avoir, ce n'est point un mal, & nous aurions tort de nous en plaindre: au contraire une délicatesse dans les sens beaucoup plus grande qu'elle ne s'y trouve communément, nous exposeroit à bien des incommodités, à moins qu'il ne se fît en même tems une réforme dans les objets qui ont coutu-

EXPERIMENTALE. 173 me de les affecter, & que nous ne changeassions aussi de manière de penser. Trop de lumiére blesse nos yeux, tels qu'ils sont; s'ils étoient plus délicats, une clarté ordinaire seroit toujours excessive, & nous ne verrions jamais fans douleur. Seroit-il agréable de voir toujours les objets comme on les voit à l'aide du microfcope ? La plus belle peau ne nous paroîtroit jamais qu'un tissu mal uni, ou plein de rugosités; & le plus beau diamant ne nous montreroit que des faces mal dressées, & peu symmétrifées: il est aisé d'appliquer cette réflexion aux autres fens.

2°. Dans l'usage des sens, quoique l'organe soit suffisamment affecté par l'objet, il arrive souvent que la sensation n'a point son effet par rapport à l'ame. Combien de sois n'arrive-t-il pas qu'on a les yeux ouverts sur un objet éclairé, sans le voir? ou que l'on parle affez haut à quelqu'un qui n'est point sourd, & qui cependant n'entend pas ce qu'on lui dit? Tous les corps que nous touchons, ou qui nous touchent par hasard, viennent-ils pour cela à notre

II. Leçone

Piij

II. Leçon. connoissance? C'est que pour connoître ce que l'on touche, il faut le tâter; pour entendre, il faut écouter; & pour voir, il faut regarder. Or tâter, écouter, & regarder, ce n'est pas seulement laisser agir l'objet sur l'organe, c'est joindre l'attention de l'ame à l'exercice du sens qui est en fonction. Un homme distrait se comporte souvent comme un sourd, un aveugle, un insensible. Qui ne connoît pas les essets de la distraction?

3°. Les fensations, comme nous l'avons déja dit, font naître des idées, & ces idées sont agréables ou déplaifantes à l'ame qui les conçoit; mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le même objet fait plaisir aux uns & déplaît aux autres. Quelques personnes aiment les amers, le plus grand nombre les déteste; certaines odeurs plaisent à ceux-ci, & sont insupportables à ceux-là : & c'est ce qui a donné lieu à cette maxime : Il ne faut pas disputer des goûts. Il y a plus encore : ce qui me faisoit peine à sentir il y a quelques années, m'est agréable aujourd'hui. Tel qui a marqué de la répugnance en buvant de la bierre, ou EXPÉRIMENTALE. 175 en prenant du tabac pour la première es fois, en fait ses délices dans la suite; l'odeur du musc qui étoit de mode autresois, fait maintenant mal à la tête à tout le monde. Les organes ne sont-ils pas à-peu-près les mêmes dans tous les hommes; & changent-ils d'un tems à l'autre dans le même individu?


Puisque c'est une chose reconnue, que les parties organiques sont plus délicates, & par conséquent plus susceptibles des impressions dans certaines personnes que dans d'autres, & qu'une action immodérée de l'objet est capable de les blesser; il peut arriver que ce qui ne seroit qu'une senfation ordinaire pour les uns, devienne pour les autres une irritation violente, fâcheuse, & inquiétante pour l'ame qui veille à la conservation du corps, & qui désapprouve tout ce qui tend à déranger l'économie animale.

Mais il faut convenir que l'imagination a autant de part qu'aucune autre cause à toutes ces variétés. Les objets nous plaisent ou nous causent de la répugnance selon les idées que nous y attachons; & ces idées dépenII. Leçon.

Piv

II. Leçon. 176 LEÇONS DE PHYSIQUE dent beaucoup de l'habitude, de la mode, & des préjugés. On a oui dire à des gens que l'on croit de bon goût, qu'une telle matière, lorsqu'on la brûle, produit une bonne odeur; en voilà affez pour la faire aimer quand on l'éprouvera. Le rapport des yeux préfente d'abord les huitres fous des similitudes dégoutantes; mais peu à peu ces premiéres idées s'affoiblissent, & cédent à d'autres plus flatteuses qu'on a conçues en y goûtant: ainsi comme les sensations dépendent en partie de la disposition de l'organe, les jugemens qui s'ensuivent, tiennent beaucoup aussi de celles de l'ame.





Leçons de Phys. Exper. 177

III. LEÇON.

De la Mobilité des Corps; du Mouvement, de ses propriétés & de ses loix.

PREMIERE SECTION.

De la Mobilité des Corps.

I L ne faut point confondre la mobilité avec le mouvement; ce font deux choses tout-à-fait différentes. La première est une propriété commune à tous les corps; l'autre est un état hors duquel on les considère souvent, & qui ne leur est point essentiel. Je me représente quelquesois telle ou telle matière comme étant en repos: mais je conçois toujours qu'elle peut recevoir le mouvement qu'elle n'a pas.

La mobilité est fondée sur certaines dispositions qui ne se trouvent pas au même dégré dans tous les corps; c'est ce qui fait que les uns III. Leçon.

III. LEÇON.

178 LEÇONS DE PHYSIQUE font plus mobiles que les autres, c'està-dire, qu'il faut employer moins de force pour les faire passer du repos au mouvement. Les principales de ces dispositions sont la figure, le poli de la surface, & la quantité de matiére contenue sous le volume d'un

corps qu'on veut mouvoir.

Pour concevoir ceci facilement, représentons-nous d'abord deux masfes de verre, d'ivoire, &c. d'égal poids, dont l'une foit un cube, & l'autre une boule, toutes deux posées fur une table. Ces deux corps ne différeront que par la figure, & cela suffira pour rendre le dernier beaucoup plus propre que le premier à recevoir & à conserver le mouvement. Donnonsleur maintenant la même figure, & ne changeons rien à l'égalité de leurs masses; mais imaginons seulement que la surface de l'un est raboteuse, & que celle de l'autre est unie : cette différence rendra celui-ci plus mobile ; une moindre force le fera mouvoir sur un plan solide, ou dans un fluide. Enfin supposons deux corps bien semblables par leur figure, & par le poli de leurs surfaces, mais différens par leurs quantités de matière; = une bille d'ivoire, par exemple, & une autre de plomb, de même diamétre, suspendues de même, ou posées sur le même plan horizontal & fort droit; ne faudra-t-il pas frapper celle-ci plus fortement que l'autre, pour la mouvoir? & la même force imprimée à l'une & à l'autre, ne trouverat-elle pas moins de résistance dans la plus légère que dans la plus pesante?

Cette résistance au mouvement, qu'on apperçoit dans tous les corps, ayant égard seulement à leur masse, se nomme force d'inertie : elle est, ainsi que la pesanteur proportionnelle à la quantité de matière propre de chaque corps. Mais quoique ces deux forces avent cela de commun entr'elles, on ne peut pas dire qu'elles foient la même chose; il y a des preuves du contraire : la pesanteur, comme nous le verrons dans la suite, exerce toujours son action de haut-en-bas. &, autant qu'elle peut, perpendiculairement à l'horizon; mais la force d'inertie résiste au mouvement dans quelque sens qu'on fasse effort pour mouvoir un corps.

III. Leçon. 180 LEÇONS DE PHYSIQUE

III. Leçon. Pour nous faire une idée juste de l'inertie, représentons-nous l'expérience proposée par M. Newton; Fig. 2. Imaginons un corps d'une grandeur & d'un poids déterminé, par exemple, une boule de plomb pesant une livre, suspendue librement par un fil fort long dans un air tranquille, & une autre boule de plomb semblable, pareillement suspendue, qui va heurter la premiére avec quatre dégrés de mouvement. Si la boule en repos ne faisoit aucune résistance à celle qui vient la heurter, après le choc, on les verroit toutes deux se mouvoir avec quatre dégrés de mouvement. Car pourquoi le mouvement diminueroitil dans la boule qui choque, s'il n'y avoit point de résistance de la part de celle qui est choquée? & par quelle raison la boule déplacée ne le seroitelle pas selon toute l'étendue du mouvement qui la pousse? Mais l'expérience fait voir autre chose: la boule en repos reçoit de celle qui la frappe une portion de son mouvement; & cette derniére perd dans le choc ce que l'autre paroît avoir acquis. Un corps en repos fait donc une ré-

EXPÉRIMENTALE. 181 fistance réelle à l'effort qui tend à le= mouvoir. Il y a plus encore; si la boule en repos Fig. 2, pése 30, ou 40 livres, l'autre qui n'a plus alors qu'une masse beaucoup moindre, avec le même effort, ne la porte pas aussi loin que dans le cas précédent; cependant si pour mouvoir un corps quelconque, il ne s'agissoit que de lui faire perdre son état de repos, le mouvement communiqué seroit le même dans une grosse que dans une petite masse. Il y a donc quelque chose de plus à vaincre, qu'une seule privation de mouvement.

Dira-t-on que la boule en repos ne résiste que parce qu'elle est appuyée par l'air qui l'environne, & qu'il faut qu'elle déplace, pour chan-

ger de lieu?

Mais, 1°. les corps qui se choquent dans le vuide sont voir la même chose que dans l'air, ou s'il y a des différences, elles ne sont pas sensibles.

2°. La résistance de l'air fait ellemême partie de la question présente; car il s'agit de l'inertie des corps en général. Si l'air en qualité de matiére, fait résistance au mouvement des III. Leçon.

182 LEÇONS DE PHYSIQUE corps qui tendent à le déplacer, & qu'on en convienne, l'inertie est III. LEÇON.

prouvée.

3°. Si la résistance que fait la boule en repos, venoit uniquement de celle de l'air, sur lequel elle s'appuie; pour résister une fois plus, il faudroit qu'elle répondît à un volume d'air une fois plus grand : mais le fait est qu'il suffit de doubler le poids de la boule, & tout le monde sçait qu'un solide sphérique, pour avoir le double de masse, ne reçoit pas une furface deux fois aussi grande que celle qu'il avoit.

Seroit-ce donc la pesanteur de la boule suspendue qui s'opposeroit à fon déplacement? De quelque longueur qu'on suppose le fil, dira-t-on, si le corps grave qu'il tient suspendu, est libre, il le tiendra tendu dans une situation verticale, & se placera au point le plus bas que la suspension lui puisse permettre d'obtenir. Il suit de-là, que si on le force d'en sortir, en quelqu'endroit qu'on le porte à l'entour, il fera plus haut; & qu'il faudra, pour l'y porter, vaincre sa pesanteur qui fait effort pour le retenir où il est.

III.

EXPÉRIMENTALE. 183 Cette objection est spécieuse, mais _ elle ne fera jamais conclure que la force d'inertie & la pesanteur sont la Legon. même chose dans les corps, à quiconque fera attention que dans les boules suspendues des expériences citées, la résistance est toujours proportionnelle aux masses considérées dans toute leur valeur; au lieu que la pesanteur, dans le tems du repos, est réduite à zéro par le fil qui suspend la boule, & qu'elle n'agit presque pas, lorsque cette même boule se meut, si le fil est fort long, comme on le suppose, & qu'on ne fasse décrire que de petits arcs.

Pour rendre ceci plus intelligible, supposons la boule en repos au bout du fil qui la tient suspendue, alors tout l'effort de sa pesanteur est vaincu par la résistance du point de suspension; si on la pousse avec le doigt dans un arc de cercle, à mesure qu'elle s'éloigne du lieu de son repos, on sent qu'elle pése de plus en plus sur la main qui la dirige, de manière que si le fil devient horizontal, elle fait sentir tout fon poids; & quand on la conduit en descendant par le même arc III. Leçon.

184 LECONS DE PHYSIQUE de cercle, on sent décroître proportionnellement l'effort de la pesanteur, jusqu'à ce que le fil soit vertical, & que le point de suspension soit chargé de tout. On conçoit donc que la boule en question ne résiste comme pesante, que quand le fil n'est plus vertical, quand elle a passé du lieu le plus bas à un autre plus élevé; ce déplacement doit donc précéder absolument la résistance, ou l'effort qui vient de la pesanteur; mais pour opérer ce déplacement, il faut employer une force réelle, capable de vaincre & de transporter toute la masse de cette boule; car si cette force qu'on emploie est trop petite, elle n'est pas moins une force réelle, & cependant elle n'a point l'effet qu'on demande fur un corps solide dont les parties font liées. Ainsi la boule suspendue a donc fait une résistance qu'il a fallu vaincre, avant que sa pesanteur pût se faire fentir.

De plus les fluides résistent aussi bien que les autres corps. Quand un solide se meut dans l'eau, en suivant une direction horizontale, on ne peut pas dire que la résistance qu'il éprouEXPÉRIMENTALE. 185 ve, vienne de la pesanteur du milieu, puisque toutes les parties de ce
milieu, qu'on suppose homogènes,
font en équilibre entr'elles, & qu'on
n'a rien à attendre de leur pesanteur,
quand on les transporte selon une direction qui lui est tout-à-fait indissérente, telle qu'on la suppose.

Enfin la force d'inertie se rencontre dans les corps en mouvement, comme dans ceux qui font en repos; celui qui se meut avec deux dégrés, n'en reçoit un troisiéme que par un nouvel effort qu'il faut faire pour le lui donner ; la même résistance qu'il oppose à la premiére force qui lui ôte son repos, il l'emploie également contre celle qui veut ajouter à fon nouvel état : c'est pourquoi après avoir rapporté les expériences qui prouvent la force d'inertie dans les corps en repos, j'en ajouterai une qui me paroît décisive, & qui ne permet pas de confondre les effets de l'inertie avec ceux de la pesanteur.

III. Leçon.

Tome I.

0

186 Leçons de Physique

III. Leçon.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La machine qui est représentée par la Fig. 3. porte environ à 6. pieds de hauteur deux billes d'ivoire A, B, d'un pouce ½ de diamétre chacune, & attachées ensemble avec un peu de cire: le marteau D, qui est de même matière, est mené par un resfort que l'on tend plus ou moins, & qui se détend quand on tire le cordon E, pour faire frapper le marteau sur une des deux billes.

EFFETS.

L'une des deux billes d'ivoire B; ayant été frappée par le marteau, se détache de l'autre A, & la précéde en tombant.

EXPLICATIONS.

Si les deux billes seulement détachées l'une de l'autre, n'obéissoient qu'à leur pesanteur, comme on suppose qu'elles commencent à tomber en même tems, qu'elles sont en tout semblables, & dans le même air, il

EXPÉRIMENTALE. 187 est indubitable qu'elles arriveroient ensemble sur le plan qui termine leur chûte: mais l'une des deux ayant recu un coup de marteau qui ajoute à l'effort de sa pesanteur, obéit encore à cette nouvelle impulsion, dont l'effet est de la faire précéder l'autre; & cette précession est d'autant plus prompte, que le coup de marteau a été plus grand. Voilà un nouvel effet qu'on ne peut attribuer à la pefanteur, puisque pour le faire naître cet effet, il faut employer une cause particulière, sans laquelle il est nul, & dont il fuit exactement les proportions. Or tout ce qui anéantit une force active, s'appelle résistance: un corps qui tombe librement, résiste donc à un mouvement plus prompt que celui de sa pesanteur, & ne le reçoit que d'une autre puissance dont

III. Leçon.

APPLICATIONS.


l'action est susceptible de plus & de


moins.

Une pierre que l'on jette avec la main contre un arbre de médiocre grosseur, y cause souvent une émotion qui passe sensiblement jusques

Qii

188 LEÇONS DE PHYSIQUE = aux branches, & retombe au pied du même arbre, où elle demeure fans LEÇON. mouvement : une pareille pierre lancée contre un rocher isolé retombe de même, & ne laisse appercevoir aucun signe de mouvement communiqué: on voit tout d'un coup la cause de cette différence, si l'on fait attention que tout ce qui est matiére, oppose son inertie au choc des autres corps; & que cette force par laquelle il résiste au mouvement, est toujours proportionnelle à sa masse. En supposant que la pierre portât successivement le même effort contre l'arbre & contre le rocher; le premier comme ayant beaucoup moins de matière, a fait une résistance trop foible, pour confumer entiérement la force qui l'a follicité à fe mouvoir fans être un peu déplacé; & ce déplacement a été sensible par l'agitation des branches: l'autre ayant une masse beaucoup plus grande, a fait une résistance complette, victorieuse (pour ainsi dire); & l'effort de la pierre distribué à un certain nombre de ses parties, n'a pas suffi pour s'étendre à toutes d'une manière sensi-





ble, & pour mouvoir le corps en fon entier.

III. Leçon:

On a vu ci-dessus qu'une boule de plomb qui pése une livre, & qui va heurter une autre boule de même matiére & de même poids, lui donne une certaine quantité de mouvement; & qu'elle en donne moins, ou, pour parler plus exactement, qu'elle déplace moins une troisiéme boule qui pése trente ou quarante fois autant. On en a conclu, comme on le devoit, que ce dernier corps, ayant plus de matiére, résistoit davantage; de-là il fuit que plus il aura de masse, plus il aura de réfistance; & qu'enfin il peut en avoir en telle quantité, que l'effort qu'il a à soutenir, ne suffise pas pour être distribué sensiblement à toutes ses parties. Cependant ce corps ne peut pas se déplacer, que toutes fes parties ne se meuvent en commun; c'est donc par cette raison que l'inertie des corps conserve les uns fensiblement en repos contre un effort qui met les autres en mouvement.

II. SECTION.

Du mouvement en général, & de ses propriétés.

On appelle mouvement, l'état d'un corps qui est actuellement transporté d'un lieu dans un autre, soit qu'on le considère en totalité, soit qu'on n'ait égard qu'à ses parties. Ainsi le bateau qu'on abandonne au courant de la rivière, est en mouvement, parce qu'il change continuellement de place; & l'on ne peut point nier que les aîles d'un moulin ne se meuvent, quoiqu'elles tournent dans le même lieu, parce que chacune d'elles passe successivement par tous les rayons du cercle qu'elle décrit.

Toutes les fois qu'un corps se meut, il change de situation respectivement aux objets qui l'environnent de près ou de loin: un homme, par exemple, assis dans un carrosse, ou dans un bateau qui le transporte, change continuellement de rapports, sinon avec les personnes qui l'accomEXPÉRIMENTALE. 191
pagnent, au moins à l'égard des différens lieux qu'il parcourt pendant

fon voyage.

Si j'apperçois à ma gauche ce que j'avois à ma droite, je puis donc conclure en toute fûreté, qu'il y a eu un mouvement réel; mais ce changement de rapport ne suffit pas seul pour m'apprendre si c'est moi qui ai passé du lieu que j'occupois, dans un autre. Car le même effet s'ensuivroit, quand j'aurois resté constamment en repos, pourvû qu'on eût déplacé ce que j'ai autour de moi. Que le soleil tourne en 24. heures autour de la terre, ou qu'en un pareil tems la terre tournant sur elle-même, préfente successivement tous les points de sa surface à la lumiére de cet astre. c'est la même chose, quant aux apparences; & le système qui attribue le mouvement réel à notre globe, pour expliquer les différens aspects du ciel, n'eût jamais été qu'une pure hypothèse, & ne l'emporteroit pas sur l'opinion contraire, s'il n'étoit appuyé d'ailleurs sur des raisons plus fortes que les positions relatives des corps célestes avec la terre.

III. Leçon. 192 Leçons de Physique

III. considérer dans un corps qui se meut : Leçon. sa direction, sa vîtesse, & la quantité de son mouvement.

La direction s'exprime par la ligne droite qu'un corps décrit, ou tend à décrire par son mouvement : car quoiqu'il parcoure un espace, qui, outre sa longueur, a encore les autres dimensions qu'il a lui-même ; cependant comme si sa matière étoit réduite en un point, on ne considére dans la direction que le chemin parcouru par ce seul point; c'est pour cela qu'en nommant deux termes feulement, on fait connoître fans équivoque de quelle maniére le mobile fe dirige; comme quand on dit : telle rivière coule de l'Est à l'Ouest; tel objet passe de droite à gauche.

Quand un corps commence à se mouvoir, c'est toujours par une ligne droite, qu'il suit autant qu'il peut; & quand il est obligé de la quitter, il recommence à en décrire une autre de la même espéce, qu'il n'abandonne encore, que quand on le sorce de se diriger autrement, mais toujours en ligne droite, comme nous

EXPÉRIMENTALE. 193 le ferons voir ci-après. Ainsi quand un mouvement se fait en ligne courbe, cette courbe n'est autre chose qu'une suite de petites lignes droites différemment dirigées. La fronde qu'on fait circuler, passe par une infinité de directions; & le cercle qu'elle décrit peut être considéré comme un polygone d'une infinité de côtés.

On donne aux directions des corps qui sont en mouvement, autant de noms différens, qu'il en appartient aux positions relatives des lignes droites; on dit, par exemple, tel corps se meut obliquement, parallélement, perpendiculairement, &c. à l'horison, à tel ou tel plan. La direction de la pluie est oblique à l'horison, quand il fait du vent.

La vîtesse du mouvement se connoît par l'espace qu'un mobile parcourt, & par le tems qu'il emploie à le parcourir. Pour avoir une idée distincte de la vîtesse, il ne suffit pas de dire : Un homme a fait dix lieues: il faut encore accuser pendant com-

bien d'heures il a marché.

De même quand il s'agit des vîtefses relatives, ce n'est point assez de Tome I.

LEÇON.

194 LEÇONS DE PHYSIQUE

IIII. Leçon. comparer le tems, ou les espaces seulement, pour sçavoir en quel rapport sont les vîtesses de deux corps. il faut diviser les espaces par les tems, & si l'on trouve, par exemple, qu'en tems égaux chacun d'eux ait parcouru une toise, on pourra conclure égalité de vîtesse; & l'inégalité au contraire, si l'un des deux emploie plus de tems à parcourir un espace donné, ou que dans un tems déterminé il ne parcoure pas autant d'espace que l'autre. Les aiguilles d'une pendule, ou d'une montre, font toutes deux le tour du cadran; elles parcourent le même espace; mais celle des heures emploie douze fois autant de tems que celle des minutes : la derniére a douze fois autant de vîtesse que la premiére; ou bien en prenant le tems de douze heures pour la mesure commune, on verra, en comparant les efpaces parcourus, que l'aiguille des minutes fait douze fois le chemin, que celle des heures ne parcourt qu'une seule fois; ce qui revient au même.

On confond assez souvent la vîtesse avec le mouvement; si l'on fait EXPÉRIMENTALE. 195
tourner un morceau de liége une fois =
plus vîte qu'un plomb de pareil volume, on dit communément, que le
liége a plus de mouvement. Cette
expression n'est point exacte, & l'on
verra bien-tôt que le plus & le moins
de mouvement ne vient pas seulement du dégré de vîtesse. Cependant
ceux-mêmes qui ne l'ignorent pas,
se conforment quelquesois à l'usage;
& l'on dit, un mouvement unisorme,
accéléré, retardé, &c. quoique ces modifications doivent toujours s'entendre de la vîtesse.

La vîtesse uniforme est celle d'un corps qui parcourt des espaces égaux en tems égaux. Comme si la boule qui roule sur un plan, parcourt une toise dans la seconde, une autre toise dans une seconde suivante, une toise encore dans la troisséme seconde, & toujours de même; de façon que les tems & les espaces parcourus soient toujours égaux entre eux. Cette uniformité se conçoit aisément comme possible; mais dans l'état naturel elle ne se rencontre presque jamais, à cause des obstacles inévitables dont nous parlerons ci-après.

III. Leçon.

Rij

196 Leçons de Physique

III. Leçon. On appelle vîtesse accelerée celle d'un mobile qui dans des tems égaux mesure des espaces qui vont toujours en augmentant, ou bien des espaces qui sont égaux entre eux, dans des tems qui décroissent de plus en plus : comme une pierre qui tombe librement, & qui va plus vîte vers la fin de sa chûte qu'au commencement.

Si tout au contraire, des espaces égaux ne s'achévent que dans des tems qui augmentent de plus en plus, ou, qu'en supposant l'égalité des tems, les espaces parcourus aillent toujours en décroissant, cette vîtesse est celle qu'on nomme retardée; telle est celle d'une bille qu'on fait rouler, & qui se rallentit peu à peu

jusqu'au repos.

La quantité du mouvement s'estime par la masse & par la vîtesse prises ensemble, de manière qu'en multipliant l'une par l'autre, on peut sçavoir au juste quel est le rapport des mouvemens des deux corps que l'on compare. Supposons, par exemple, qu'un des deux ait 100 grains de matière, que l'autre en ait 500, & que tous deux se meuvent avec 4 dé-

EXPÉRIMENTALE. 197 grés de vîtesse : la quantité du mouvement dans le premier sera 100 multiplié par 4, ce qui fera 400; & dans le dernier ce fera 700 multiplié par 4, le produit sera 2000 : ainsi ces deux quantités de mouvement comparées feront entr'elles comme 400, & 2000. On apperçoit aisément la raison pour laquelle on doit estimer ainsi la quantité du mouvement, quand on considère que toute la vîtesse avec laquelle on fait mouvoir un corps, appartient également à toutes les parties de sa masse; car si je mets un tout en état de parcourir une toise en une seconde de tems, je détermine par-là fa vîtesse, mais je l'imprime, cette vîtesse, à toutes les parties qui composent ce tout; de sorte que si après l'impulsion reçue, elles venoient à fe défunir, on ne conçoit pas qu'aucune d'elles dût demeurer en repos; on sent au contraire, qu'en obéissant toutes également à la même cause qui les a déterminées à se mouvoir, elles continueroient d'exécuter séparément ce qu'elles ont commencé en commun, en faisant abstraction néanmoins des obstacles qui aug-Riij

III. Leçon.

mentent en conséquence de la division, & que nous expliquerons ailleurs.

Un corps qui se meut, peut en mouvoir d'autres; & cette faculté est relative aussi à sa masse & à sa vîtesse. de façon qu'on peut compenser l'une par l'autre. Car celui qui a peu de masse fait autant d'effort avec beaucoup de vîtesse, qu'un autre en feroit avec moins de vîtesse, s'il avoit plus de masse. Avec un petit marteau qu'on fait agir promptement, on chasse aussi loin le même clou, qu'avec un plus gros qui tomberoit lentement; une petite baguette ne blesse pas comme un bâton, quand bien même l'une & l'autre frapperoient avec la même vîtesse.

Le mouvement des corps, quand il est employé pour en mouvoir d'autres, soit qu'il tende à les mouvoir seulement, soit qu'il les meuve en esset, se nomme puissance ou force motrice.

On avoit toujours pensé que cette force en toutes sortes de cas indistinctement, devoit être évaluée comme la quantité du mouvement par la masse

EXPÉRIMENTALE. 199 & par la vîtesse; & en effet, qu'un corps follicité à se mouvoir, se meuve réellement, ou bien qu'il foit retenu par des obstacles, on ne voit autre chose en lui que la vîtesse qu'il a ou qu'il auroit, multipliée autant de fois qu'il a de parties solides, ou (ce qui est la même chose) toute sa masse multipliée par sa simple vîtesse; & l'on ne voit pas que des oppositions invincibles, ou la liberté d'agir, puisse rien changer à sa quantité de matière, ni à l'impulsion qui a une fois réglé son dégré de vîtesse.

Cependant plusieurs Philosophes très-célébres ont embrassé le sentiment de M. Leibnitz, qui le premier a établi une distinction entre la force motrice qui est vaincue par un obstacle, & celle qui agit contre une résistance qui céde. Ils appellent la première force morte, & ils conviennent qu'elle doit être évaluée comme la quantité du mouvement, en multipliant la masse par la simple vîtesse. Quant à la derniére, qu'ils nomment force vive, ils prétendent que, pour l'estimer selon sa juste valeur, il faut multiplier la masse, non

LECON.

200 LEÇONS DE PHYSIQUE par la simple vîtesse, mais par le quarré de la vîtesse, c'est-à-dire, par la Leçon. vîtesse multipliée par elle-même. Si, par exemple, la vîtesse est 3, ce n'est point par 3, qu'il faudra multiplier la masse, mais par 9, qui est le produit de 3 multiplié par 3. Suivant cette opinion, un corps qui agit contre un obstacle avec 2 de masse, & une impulsion qui régle sa vîtesse à 4, n'a que 8 dégrés de force, tant que la résistance est victorieuse; mais si cette résistance vient à céder, la force à laquelle elle obéit devient vive, & de 8 elle s'éléve à 32.

> On juge bien qu'un Philosophe comme M. Leibnitz, & aussi versé qu'il l'étoit dans les Mathématiques, ne s'est point déterminé légérement à introduire un principe aussi nouveau, & qui paroît d'une aussi grande importance pour la méchanique; il l'a même annoncé par un titre qui marquoit sa confiance *; & en effet il appuie sa théorie sur des expériences & par des raisonnemens si

^{*} Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartesii, & aliorum, &c. Act. Erud. Lips. 1686. p. 161.

Expérimentale.

spécieux, qu'on ne doit point être surpris qu'il ait trouvé des défenseurs parmi les Physiciens les plus habiles Leçon. & les plus éclairés. Mais l'on ne peut dissimuler aussi que le plus grand nombre révolté contre cette nouvelle doctrine, l'a regardée comme un paradoxe; & qu'après de longues discussions, la plûpart ont pensé qu'il falloit plutôt chercher à concilier les phénoménes qui servent de preuves à l'opinion de M. Leibnitz, avec des principes connus & généralement avoués, que d'admettre une nouveauté qui ne paroissoit point liée avec les idées claires & distinctes qu'on s'étoit faites jusqu'alors du mouvement des corps.

Nous ne croyons pas devoir approfondir cette question dans un Ouvrage, où l'on ne s'est proposé que d'établir les principes les moins contestés: les piéces de ce fameux procès se trouvent mieux exposées que je ne pourrois le faire, dans plusieurs Ouvrages imprimés & très-connus. Je n'en citerai que deux; l'un est le vingt-uniéme & dernier chapitre d'un volume in-8°. imprimé en 1740.

LEÇON.

202 LEÇONS DE PHYSIQUE fous le titre d'Institutions de Physique; dans lequel Madame la Marquise du Châtelet a fait valoir avec toute la sagacité possible, tout ce qu'on peut dire en faveur des forces vives : l'autre est une Dissertation sur l'estimation des forces motrices des Corps, dans laquelle M. de Mairan, qui en est l'Auteur, rappelle un Mémoire qu'il avoit lû en 1728. à l'Académie des Sciences, & dans lequel il combat l'opinion des forces vives par des raisons bien fortes, & explique fort intelligiblement, & par les principes ordinaires, tout ce qui paroissoit ne pouvoir l'être qu'en admettant celui de M. Leibnitz.

> Je ne dois pas omettre cependant (& c'est une des raisons qui me dispensent de m'étendre davantage sur cette question) que si les sentimens font partagés sur la manière d'évaluer la force des corps en mouvement, on est parfaitement d'accord sur le produit de ces forces, & sur les effets qui en doivent résulter. Ceux qui n'admettent point la distinction Léibnitienne, conviennent cependant

EXPÉRIMENTALE. avec les défenseurs des forces vives, = que les effets sont quadruples de la part d'un corps qui se meut avec deux dégrés de vîtesse, par comparaison à celui qui n'en a qu'un. Mais, disentils, ce n'est pas parce que 4 est le quarré de 2, que cet effet s'ensuit; c'est seulement parce que le mobile qui a deux dégrés de vitesse, fait un effort qui est répété deux fois autant que celui d'un corps qui se meut avec un dégré de vîtesse. Ét il faut avouer que si l'on fait entrer la considération du tems dans l'examen des faits qu'on apporte en preuves des forces vives, on se retrouve alors dans la route ordinaire, & le quarré des vîtesses n'a pas plus lieu pour l'estimation des forces qui ne sont que retardées par des rélistances qui cédent, que pour évaluer celles qui agissent contre des obstacles invincibles.

Il suit de cet aveu & de sa restriction, que si l'affaire des forces vives n'est point une question de nom, au moins on peut dire qu'elle n'est pas d'une aussi grande conséquence qu'elle paroissoit devoir l'être pour la méchanique; & qu'on peut sans erreur III. Leçon.

estimer indistincement dans la pratiestimer indistincement dans la pratique, la force des corps par la quantité du mouvement, c'est-à-dire, par
leur masse & par leur simple vîtesse
actuelle, s'ils se meuvent réellement;
& s'ils sont retenus par des obstacles invincibles, par leur tendance au
mouvement qui est comme la masse,
& leur vîtesse initiale, c'est-à-dire,
celle avec laquelle ils commenceroient à se mouvoir, si l'obstacle
cédoit.

Le repos est l'état opposé au mouvement, c'est donc celui d'un corps qui persévère dans les mêmes rapports de situations avec les objets qui l'environnent de près ou de loin. Je dis, de près ou de loin, pour faire entendre qu'il s'agit ici du repos absolu; & qu'on ne regarde pas comme tel l'état d'un corps qui est emporté avec ce qui l'entoure, comme un homme qui voyage avec trois autres personnes dans la même voiture; car s'il est en repos relativement à ceux qui l'accompagnent, il ne l'est pas par rapport aux objets extérieurs.

Cette espece de repos à qui nous donnons l'exclusion, est peut-être le

EXPÉRIMENTALE. 205 feul cependant qu'on doive admettre en parlant à la rigueur : car si tout le globe que nous habitons, tourne sans cesse sur son axe, & qu'il décrive un orbe autour du soleil, comme il est très-probable, il n'y a aucun corps fur sa surface qui ne participe au mouvement qui est commun à toutes ses parties; & si quelque chose paroît en repos, ce n'est que relativement aux autres objets terrestres. Mais comme tout ce qui l'entoure à cet égard, s'étend autant que toute notre sphère, quand on ne compare que des corps terrestres entre eux, on peut regarder comme absolu le repos de celui qui ne change point de situation respectivement à eux.

Le repos n'a pas ses dégrés comme le mouvement, à moins qu'on ne le confonde avec la force d'inertie; il est toujours tout ce qu'il peut être: mais il peut arriver, (& c'est une chosse fort ordinaire,) qu'un corps soit en repos considéré comme un tout, & que ses parties soient dans un mouvement actuel. Un bloc de marbre qui s'échausse à l'ardeur du soleil, ne change point de place, mais toutes

III. Leçon.

206 LEÇONS DE PHYSIQUE fes parties font agitées; car tous les Physiciens conviennent qu'un des principaux effets de la chaleur, est de mettre en mouvement les parties de la masse sur laquelle elle agit.

III. SECTION.

Des Loix du Mouvement simple.

ON appelle Loix du mouvement certaines régles, suivant lesquelles tous les corps se meuvent généralement & constamment, lorsqu'ils obéissent à

quelque force motrice.

Le mouvement simple est celui d'un corps qui n'est déterminé à se mouvoir que vers un seul point. Tel est celui d'un homme qui glisse en ligne droite sur un canal glacé, ou celui d'un corps grave que son propre poids fait descendre par une ligne perpendiculaire à l'horison: un tel mouvement est l'esset d'une seule impulsion, ou de plusieurs qui se succédent dans la même direction.

Premiere Loi du Mouvement simple.

III. Leçon.

Tour corps qui est une fois mis en mouvement, continue de se mouvoir dans la direction, & avec le dégré de vîtesse qu'il a reçû, si son état n'est changé par

quelque cause nouvelle.

C'est-à-dire, que s'il quitte la ligne droite qu'il a commencé à décrire, si savîtesse se rallentit, ou s'accélère, ces changemens viennent d'une cause particulière qui le détermine autrement, qui ajoute, ou qui retranche à son mouvement, sans quoi la premiére cause ne cesseroit d'avoir pleinement son effet. Car pourquoi fon état changeroit-il? La force d'inertie qui l'a retenu, tant qu'elle a pû, dans son repos, & qu'il a fallu vaincre, pour lui faire prendre du mouvement, le fait résisser ensuite, autant qu'elle peut, à toute variation, & cette résssance doit être vaincue de nouveau par une force positive, avant qu'on apperçoive aucun dégré de plus ou de moins dans l'état du mobile.

208 Leçons de Physique

Mais pourquoi la nature s'est-elle fait une loi qui n'a jamais son esset ? ou plutôt, comment avons-nous pû assigner aux corps qui se meuvent, une constance de direction & de vîtesse, qui ne représente pas la nature? Quelqu'un a-t-il jamais vû un mouvement sans altération, & qui se perpétuât, sans avoir besoin d'être réparé? Le corps le plus mobile, & le plus violemment agité, ne revient-il pas au repos après un tems plus ou moins long?

Il faut avouer que nous n'avons en notre disposition aucune expérience qui prouve directement, & d'une manière positive, l'énoncé de cette pre-

miére loi.

LEÇON.

Mais, 1°. nous avons fait voir cidessus, qu'un corps en tel état qu'il soit, tend à y persévérer, par une force que nous avons nommée inertie. Ce principe sussit pour établir la loi dont ils'agit, puisqu'en faisant abstraction de toute résistance étrangère, lorsqu'une fois un corps est en mouvement, on ne voit plus rien en lui qui résiste à l'impulsion qu'il a reçue, ni qui détruise l'inertie qui s'oppose

Expériment ale. 209 s'oppose à son changement d'état.

2º. S'il est vrai que les corps perdent toujours leur mouvement après un certain tems, il n'est pas moins vrai qu'on connoît toujours des obstacles qui le leur font perdre; & parce que des résistances inévitables (quoiqu'étrangères,) font cesser le mouvement d'un corps, seroit-ce une raison pour conclure que le mouvement est de nature à ne pouvoir subfister? Ne doit-on pas plutôt juger tout le contraire, de cela même qu'il faut absolument des résistances positives pour le faire cesser? Voyons donc quelles sont les causes qui font cesser le mouvement, & choisissons par préférence celles qui sont tellement liées avec l'état naturel, qu'elles ne peuvent être évitées.

neur Dans quelque endroit & de quelque manière qu'on fasse mouvoir un corps, il se trouve toujours dans quelque fluide, qui à cet égard se nomme milieu, & qu'il est obligé de pousser sans cesse devant lui pour se faire un passage; & comme ce milieu est matériel, il fait une continuelle résistance au mobile qui tend à le dé-

Tome I. S

III.

210 LEÇONS DE PHYSIQUE

III. Leçon. placer. Celui-ci ne peut donc continuer de se mouvoir qu'en employant à chaque instant une partie de son mouvement, pour vaincre cette résissance; ainsi après un certain tems, il l'a tout employé, & se trouve ré-

duit au repos.

2ment Tous les corps étant pesans, aucun d'eux ne peut se mouvoir dans une direction différente de celle qui est propre à la pesanteur, s'il n'est foutenu par une suspension, ou par un plan; ou bien il gliffe dans quelque fluide qui le touche de toutes parts. De quelque maniére qu'on s'y prenne, il faut toujours qu'il passe par les différens points de la surface du plan qu'il parcourt, ou du milieu qu'il divise, ou que les piéces qui le suspendent fassent la même chose l'une sur l'autre. Cette application successive de surface à surface se nomme frottement, & résiste encore au mouvement: car la superficie des corps n'est jamais parfaitement unie; les parties hautes de l'une s'engagent dans les cavités de l'autre, ce qui fait qu'elles ne gliffent qu'avec quelque difficulté.

La résistance des milieux & celle

EXPÉRIMENTALE. 211

qui vient des frottemens, sont donc des causes qui empêchent que la première loi du mouvement n'ait un plein effet, parce qu'étant inévitables dans l'état naturel, il en résulte des résistances qui détruisent indispensablement une partie de la vîtesse des

corps à chaque instant.

Toute machine que l'on fait mouvoir, n'exerce donc jamais sur la résistance qu'on s'est proposé de vaincre, tout le mouvement qu'elle a reçu, puisque les causes dont nous venons de faire mention, en consument nécessairement une partie. Comme il est important de sçavoir ce qui doit lui en rester après cette déduction, nous allons exposer ici ce qu'on doit principalement considérer quand on veut évaluer les résistances qui naisfent ou des frottemens, ou des milieux.

ARTICLE PREMIER.

De la résistance des Milieux.

Les milieux, quoique fluides, résistent comme les autres corps par leur inertie qui s'oppose à leur déplace-

Leçon.

212 LEÇONS DE PHYSIQUE

III. Leçon. ment; mais l'inertie, comme nous l'avons déja dit, est toujours proportionnelle à la masse: toutes choses égales d'ailleurs, plus le milieu a de densité, plus il fait de résissance.

Mais la masse des corps ne dépend pas seulement de leur densité, elle dépend aussi de leur grandeur; car une pinte d'eau pése plus qu'une chopine de la même eau : ainsi le même milieu en pareilles circonstances résiste à proportion de la quantité qu'on en déplace; & cette quantité doit être mesurée par la surface antérieure du corps qui s'y meut, & par l'espace qu'on lui fait parcourir. Si je divise l'eau ou l'air avec le plat de la main; à chaque instant j'en déplace beaucoup plus que si je les divisois en tems égal, seulement avec le tranchant de la même main, & je trouve aussi plus de résistance.

La masse de cette portion du milieu qu'on doit déplacer, étant déterminée par sa densité, par la grandeur de la surface solide qui la pousse, elle doit l'être encore par la vîtesse du mobile; car on conçoit bien que si je sais mouvoir ma main dans l'eau, de la

EXPÉRIMENTALE. 213 longueur de deux pieds dans une seconde, je déplace une plus grande quantité du fluide, que si dans un tems égal ma main n'avoit parcouru qu'un espace d'un pied. Or une plus grande quantité d'eau fait une plus grande masse, qui résiste plus, & l'inertie s'oppose à une plus grande vîtesse, comme elle s'est opposée au premier dégré qu'on a fait prendre au fluide qui céde. Les expériences fuivantes feront preuves de ce que nous venons d'établir touchant la résistance des milieux, & acheveront d'éclaircir ce que nous en avons dit.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

On a divisé en deux parties égales une espéce de baquet ou d'auge, par une cloison qui s'étend d'un bout à l'autre, pour mettre de l'eau d'un côté; & laisser l'autre plein d'air seulement. Une double potence qui s'éléve sur le milieu de la cloison, suspend deux verges de la même longueur, aux bouts desquelles sont attachées deux boules de métal, qui sont semblables

214 LEÇONS DE PHYSIQUE par leurs poids & par leurs volumes, & qui peuvent, lorsqu'on les met en mouvement, aller & revenir chacune dans la partie du baquet, à laquelle elle répond. Voyez la Fig. 4.

EFFETS.

Les deux boules partant en même tems avec des quantités égales de mouvement; celle qui se meut dans l'eau perd toute sa vîtesse en 4 ou 5 secondes, au lieu que l'autre dont les balancemens se sont dans la partie de l'auge qui ne contient que de l'air, conserve fort long-tems sa vîtesse, & ne la perd entiérement qu'après un très-grand nombre de vibrations.

EXPLICATIONS.

Les deux boules étant de même métal, & ayant des volumes égaux, comme on le suppose, ont nécessairement des masses égales; & lorsqu'elles commencent à décrire des arcs semblables aux bouts de deux verges d'égales longueurs, leurs vîtesses sont aussi semblables, comme nous le serons voir dans la suite. Ainsi puisque

Expérimentale. 215 le mouvement se mesure par la masse = & par la vîtesse, les deux boules de notre expérience commencent à fe mouvoir avec pareilles quantités de mouvement. Dans le premier instant chacune d'elles déplace un égal volume du fluide dans lequel elle fe meut; mais le volume d'eau déplacé par F, est environ 800 fois plus dense que l'air poussé par G. Ces deux mobiles ont donc déployé leurs forces sur des résistances bien inégales, puisqu'elles sont dans le rapport de 1 à 800; ainsi la boule Fn'a point pû passer outre, qu'elle n'ait consumé une partie de sa force, qui égale 800 fois celle que la boule G a perdu de la sienne. Ce qui se fait dans le premier instant recommence dans l'inftant suivant; & les vîtesses des deux mobiles diminuent ainsi, avec une différence à peu près proportionnelle à celle des milieux, jusqu'à ce qu'enfin l'un & l'autre soient entiérement réduits au repos.

III. Leçon.

APPLICATIONS.

M. Newton a démontré qu'un corps sphérique qui se meut dans un

216 LEÇONS DE PHYSIQUE milieu tranquille, & d'une densité égale à la sienne, perdoit la moitié de son mouvement avant que d'avoir parcouru un espace égal en longueur à deux de ses diamétres. Qu'on se rappelle ici les principes que nous avons établis ci-dessus, & que nous venons de confirmer par l'expérience précédente; on concevra facilement comment on peut soumettre à un calcul exact la réfistance qu'un fluide peut faire au mouvement d'un corps folide qui y est plongé. Car supposez que ce soit une boule d'or qui se meuve en ligne droite dans l'eau, ce qu'elle déplace équivaut à un cylindre dont la base a pour diamétre celui de la boule; & pour axe la ligne que son centre décrit. On sçait quel est le rapport des denfités de l'or & de l'eau; on sçait aussi quel est le rapport d'une boule à un cylindre, d'un certain diamétre, & d'une hauteur donnée. Toutes ces quantités étant donc connues, on peut juger de la résistance que l'eau oppose à la boule pendant qu'elle parcourt tel ou tel espace : & en comparant ce qu'elle a perdu de sa vîtesse, avec ce qu'elle avoit en commençant

Expérimentale. commençant à se mouvoir, on peut

juger de ce qui lui en reste.

Nous avons déja dit, que pour Leçon. évaluer la résistance des fluides, il falloit avoir égard aussi à la vîtesse du mobile. Il n'y a point de milieu si divisible, qui n'exige un tems fini pour céder. Nous trouvons ordinairement ce tems fort court, parce que les vîtesses que nous employons, pour les diviser, ne sont point fort grandes; & la comparaison que nous faisons du tems employé contre eux, à celui avec lequel ils obeissent, nous fait porter ce jugement, dont on revient, quand on considére certains effets qu'on ne peut expliquer qu'en supposant qu'on n'a point donné au fluide le tems de céder. Pourquoi, par exemple, les coups de rames font-ils avancer un bateau? & pourquoi le font-ils avancer d'autant plus vîte qu'ils sont plus prompts & plus fréquens? C'est que lorsqu'on frappe l'eau plus vîte qu'elle ne peut céder, elle devient par cette lenteur à obéir le point d'appui d'un levier que le batelier fait agir. Les poissons font avec leurs queues ce que le batelier

Tome I.

fait avec ses rames, le nageur avec ses bras & ses jambes, les oiseaux aquatiques avec leurs pieds, qui pour cet effet sont conformés d'une manière propre à pousser un grand volume d'eau.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

HI, Figure 5. représente un mouvement d'horlogerie, dont le modérateur est un volant à deux aîles, 1, 2; on monte le ressort avec une clef, & la piéce K est un levier qui se meut de gauche à droite, & de droite à gauche, pour mettre le rouage en jeu, ou pour l'arrêter. On pose cet instrument sur la platine de la machine pneumatique que nous avons représentée entière dans la Figure 1. de la 2. Lecon; & on le couvre d'un récipient de verre garni par le haut d'une tige de métal, L, qui passe à travers d'une virole de cuivre pleine de cuirs gras, & avec laquelle on peut mener le levier K, sans laisser rentrer l'air, quand on a fait le vuide dans le récipient. Voyez la Figure 6.

EFFETS.

III. Lecone

Lorsqu'on met le rouage en jeu dans le vuide, on s'apperçoit par la fréquence des coups de marteaux qui battent sur le timbre, que le mouvement du rouage est beaucoup plus libre que quand le récipient est plein d'un air semblable à celui de l'atmosphère.

EXPLICATIONS.

Ce qu'on nomme communément le vuide de Boyle, n'est autre chose qu'un espace où l'on a rarésié l'air autant qu'il est possible, par le moyen de la machine pneumatique, que ce Philosophe Anglois a beaucoup perfectionnée; mais nous ferons voir, (& tous les Physiciens en conviennent,) que ce vuide n'est qu'un milieu moins dense que celui où nous voyons la plûpart des corps se mouvoir. Dans l'un & dans l'autre de ces deux milieux, c'est-à-dire, dans l'air ordinaire, & dans l'air raréfié, le rouage n'a point une entiére liberté, parce qu'indépendamment des autres causes, le volant a toujours quelque

Tij

résistance à vaincre, pour se mourésistance à vaincre, pour se mouIII. voir dans le fluide qui l'environne.
La résistance de ce fluide est proportionnelle à sa densité; & par cette
raison dans un air moins dense, le
modérateur moins gêné lui-même,
laisse plus de liberté aux roues, &
procure plus de fréquence aux mar-

teaux.

APPLICATIONS.

On voit par cette expérience, que l'air est un milieu résistant qui se comporte à l'égard des corps en mouvement, comme tous les autres fluides; à cela près, qu'étant beaucoup moins dense que la plûpart d'entre eux, il résiste moins en pareilles circonstances: c'est pourquoi pour trouver un point d'appui dans sa résistance, comme nous avons vû qu'on en trouve dans celle de l'eau, il faut le frapper avec bien plus de vîtesse, ou bien en pousser un plus grand volume en même tems. Les oiseaux s'élévent, se soutiennent, & font de longs trajets dans l'air, malgré le poids de leur corps qui excéde toujours considérablement celui du milieu qu'ils


EXPÉRIMENTALE. 221 occupent. Ceux qui volent longtems & fort loin, comme les hiron- III. delles, la plûpart des oiseaux de proie, plusieurs aquatiques, &c. ont ordinairement peu de corps, beaucoup de plumes, & des aîles fort grandes; ceux au contraire qui ontun vol plus court ou moins fréquent, ont d'ordinaire plus de chair, & des aîles plus petites par proportion. Mais si l'on y fait attention, on remarquera que ceux-ci battent plus promptement que les autres en volant; les moineaux, pinçons, chardonnerets, linotes, &c. volent comme par fauts, & ne se soutiennent point long-tems dans une même direction; leurs aîles ne peuvent élever & foutenir leurs corps que par une, vîtesse à laquelle ils peuvent à peine fournir quelques instans : pendant qu'ils se reposent pour recommencer, leur propre poids les gagne, & leur fait perdre une partie de l'élévation précédemment acquise; c'est pourquoi leur vol n'est qu'une suite d'élancemens.


Il y a des oiseaux qui se soutiennent pendant quelque tems à la même élé-

Tiij

222 LEÇONS DE PHYSIQUE = vation, fans paroître mouvoir les afles, (ce qu'on nomme planer;) on doit supposer qu'elles se meuvent pourtant, mais que leurs vibrations font si promptes & si courtes, qu'on ne peut les appercevoir à une certaine distance. La grande vîtesse de ce mouvement peut suppléer pendant quelque tems à des battemens plus ouverts; & l'on remarque aussi que les oiseaux qui planent, sont obligés de tems en tems de regagner par un vol ordinaire la hauteur qu'ils ont perdue insensiblement, & de reposer, pour ainsi dire, par des mouvemens plus lents & plus étendus, les muscles dont le ressort a été trop tendu pendant ces vibrations courtes & fréquentes.

On voit par-là pourquoi les oifeaux domestiques, ou ceux qui s'engraissent beaucoup en certaines saifons, volent si peu ou si mal. A mesure qu'ils augmentent en masse, il faudroit aussi que leurs aîles devinssent plus grandes, pour embrasser un plus grand volume d'air, ou que leurs forces augmentassent par proportion pour les faire agir avec plus de vîtes-





EXFERIMENTALE. 223 fe: mais le dégré de force, & la conformation dans chaque espéce, ne III. font pas variables comme l'embon- Leçon. point.

Que l'on compare maintenant le poids d'un homme avec la force qu'il lui faudroit avoir dans les bras, pour mouvoir des aîles d'une grandeur proportionnée à fa masse, avec une vîtesse capable de le soutenir en l'air, & l'on verra quelle a été la folie de ceux qui ont cherché les moyens de voler, & qui les ont regardés comme possibles. En vain s'imagineroiton qu'il ne faudroit que de la dextérité & de l'exercice; il seroit facile de faire voir que les bras d'un homme le plus robuste & le plus exercé, ne sont pas capables d'un effort suivi, qui pût produire un tel effet.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

L'instrument que représente la Fig. 7. est un double moulinet dont les aîles en même nombre pour chacun, sont aussi de même poids, de même largeur & de même longueur; avec Tiv

224 Leçons de Physique

cette différence, qu'à l'un des deux
le plan de chaque aîle peut s'incliner
à l'axe, de telle façon que l'on veut:
un même ressort qui se détend, quand
on baisse un bouton qu'on voit en M,
pousse également deux petites broches NN, qui sont fixées aux moyeux
des moulinets; ainsi en obéissant tous
deux à cette impulsion commune, ils
commencent à se mouvoir avec des
vîtesses égales.

EFFETS.

Si toutes les aîles des moulinets font dans des positions semblables relativement à leurs axes, par exemple, si dans l'un & dans l'autre le plan de chaque aîle est paralléle à l'axe commun, le mouvement imprimé par le ressort dure également dans tous les deux; ils font un pareil nombre de tours, & finissent ensemble de fe mouvoir. Si au contraire dans l'un des deux moulinets la largeur des aîles tombe sur l'axe à angles droits. ou, (ce qui est la même chose,) que leurs plans se trouvent tous dans celui d'un même cercle; alors la même impulsion fait tourner celui-ci

EXPÉRIMENTALE. 225 bien plus vîte & beaucoup plus longtems que l'autre.

III. Leçon.

EXPLICATIONS.

Dans le premier cas de l'expérience précédente, les aîles de chaque moulinet se présentent de face au milieu commun qu'elles ont à déplacer, pour se mouvoir: elles ne différent d'ailleurs par aucune circonstance, comme on le suppose; elles éprouvent donc en même tems des résistances égales; elles perdent par conséquent pareilles quantités de forces dans les mêmes instans; quand la vîtesse manque tout-à-fait à l'un des deux moulinets, elle doit pareillement manguer à l'autre. Tout au contraire dans le second cas, l'un des deux moulinets présente ses aîles de champ; dans cette position ce ne sont plus que des lames qui divisent facilement l'air, & qui n'éprouvent plus à beaucoup près la même opposition de sa part, puisque le volume qui doit se déplacer est beaucoup moindre; ainsi celui qui dans des tems égaux perd moins de sa force, doit tourner plus vîte & plus long-tems que l'autre.

APPLICATIONS.

Cette derniére expérience fait voir qu'une même masse peut éprouver des résistances dissérentes dans le même milieu, selon qu'elle lui présente directement une surface plus ou moins grande. Le batelier fait agir sa rame par le plat, quand il cherche un point d'appui dans la résistance de l'eau; mais il la reléve par le tranchant, pour se moins satiguer, quand il veut se mettre en état de recommencer.

C'est par la même raison, qu'un corps conserve ordinairement mieux son mouvement, lorsqu'il est entier, que s'il est divisé: car la division multiplie les surfaces, & par conséquent la résistance du milieu. Quand une once de plomb sort d'un sus quelque quantité de surface qu'elle soit, l'impulsion de la poudre qui détermine sa vîtesse est la même: cependant tout le monde sçait qu'une balle est toujours portée beaucoup plus loin qu'une pareille quantité de plomb en grains: cette dissérence vient de la résistance de

EXPÉRIMENTALE. 227 l'air qui agit en raison des surfaces; car chaque petit grain de plomb ainsi que la balle, présente toujours à l'air Leçon. qu'il divise, la moitié de sa superficie sphérique; & à poids égaux, la somme des petites surfaces hémisphériques du plomb grainé, excéde beaucoup celle d'une feule balle.

Comme il arrive souvent qu'on ne compte point assez sur la résistance du milieu, quelquefois aussi le préjugé lui en prête plus qu'il n'en a. Qui est-ce qui n'a pas oui dire, par exemple, qu'un coup de fusil qui passe audessus de l'eau, ou qui trayerse d'un bord à l'autre d'une riviére ou d'un étang, ne porte pas le plomb aussi loin que par-tout ailleurs? La raifon qu'on en donne, en disant que la vapeur de l'eau épaissit l'air, a bien quelque vrai-semblance; mais on la fait trop valoir, quand on attribue des effets sensibles à ce prétendu épaississement de l'air. L'expérience précédente a fait voir qu'on ne fait varier considérablement sa résistance, qu'en faisant naître des différences considérables dans sa densité; & des

épreuves que j'ai plusieurs fois répé-

228 LEÇONS DE PHYSIQUE tées avec soin, m'ont appris que le fait en question est pour le moins une exagération. Si quelqu'un s'est apperçu qu'il n'atteignoit point les objets étant sur l'eau, comme lorsqu'on tire ailleurs, c'est qu'il a été trompé par la distance, qui nous paroît toujours moindre, quand nous ne voyons qu'une étendue trop uniforme, & que nous n'y trouvons pas d'objets qui nous aident à l'estimer. Ainsi il ne seroit pas surprenant qu'on eût manqué de tuer à 60 pas un oiseau, qu'on croyoit tirerà 50; mais la densité du milieu augmentée par la vapeur de l'eau, auroit bien peu de part à cet effet. Ajoutez à cela, que presque tous les oiseaux aquatiques plus difficiles que les autres à percer, doivent être tirés de plus près.

Jusques ici nous avons considéré le milieu comme tranquille; mais s'il est agité, sa résistance sera augmentée ou diminuée par son propre mouvement. Le poisson qui remonte le courant d'une rivière, a deux résistances à vaincre: l'une est le mouvement de l'eau dont la direction est contraire à la sienne; l'autre est l'iner-

EXPÉRIMENTALE. 229 tie du volume auquel il répond, &= qu'il doit déplacer, comme il feroit dans une eau dormante. Un homme Leçon, qui marche contre le vent, a la même chose à faire; & c'est pour cette raison, que quand on fait mouvoir un corps contre la direction d'un fluide dont le mouvement est rapide, on diminue fon volume, autant qu'il est possible, pour donner moins de prise à l'effort du courant. Un vaisseau qui a le vent contraire, plie ses voiles; & en pareil cas, le batelier fait asseoir ceux qu'il passe d'un bord à l'autre de la riviére.

Si le mobile & le fluide qui lui fert de milieu, se meuvent tous deux dans la même direction; ou ils ont des vîtesses égales, ou l'un des deux en a plus que l'autre : dans le premier cas, la réliftance du milieu est nulle; tel est le mouvement d'un poisson qui fuit précisément le courant de l'eau: dans le dernier cas, celui des deux qui a le plus de vîtesse, en communique à l'autre, aux dépens de celle qu'il à. Un boulet de canon qui part dans la direction du vent, ne trouve pas autant - de résistance dans l'air, qu'il en souffriroit dans un tems calme; mais com-

230 LEÇONS DE PHYSIQUE

me il va plus vîte que le vent, il faut
toujours qu'il s'ouvre un passage dans
ce milieu qui fuit devant lui avec trop
de lenteur. Si l'on connoît par les régles que nous avons établies, quelle seroit la résistance d'un milieu, s'il étoit
en repos; on connoîtra de même ce
que son dégré de vîtesse pour ou contre
ajoute ou retranche à cette résistance.

ARTICLE II.

De la résistance des frottemens.

Pour se faire une juste idée des frottemens, il faut observer que la furface d'un corps quelconque n'est jamais parfaitement unie : quand on supposeroit que toutes les parties solides qui la composent sont exactement dans le même plan, (& quand cela se trouve-t-il?) les pores qui les séparent nous obligeroient encore à nous représenter cette superficie comme un assemblage de petites éminences & de petites cavités. Supposons que deux plans de cette espéce se touchent dans toute leur étendue, les parties hautes de l'une entreront dans les creux de l'autre

Expérimentale. 231 comme il arrive à-peu-près à une pelote couverte de velours, que l'on pose sur un tapis de même étosse; ou bien, si c'est un corps solide que l'on plonge dans un liquide, celui-ci en conséquence de la ténuité & de la fluidité de ses parties, se moule exactement dans toutes les cavités de l'autre, comme on peut le remarquer par l'humidité qu'on y apperçoit, quand il en sort.

S'il s'agit maintenant de faire parcourir à un corps la surface d'un autre corps, cela peut s'exécuter de deux manières différentes qu'il est important de bien distinguer: 1°. En appliquant successivement les mêmes parties de l'un à différentes parties de l'autre, comme quand on fait glisser un livre sur une table : & nous nommerons ce frottement, celui de la premiére espèce. 2°. En faisant toucher fuccessivement différentes parties d'une surface à différentes parties d'une autre surface, comme lorsqu'on fait rouler une boule fur un billard: & nous nommerons ce dernier frottement, de la seconde espéce.

Dans le premier cas, le mouvement

III.

232 Leçons de Physique que l'on fait faire à celui des deux corps qui passe sur l'autre, a une direction perpendiculaire à celle selon laquelle les parties des surfaces sont réciproquement engagées. Car selon notre supposition, la surface que l'on fait glisser horizontalement, est celle d'un corps grave que son poids appuie verticalement sur la table; & cette efpéce de frottement occasionne souvent la rupture de ces petites éminences qui forment l'inégalité des superficies, comme on peut le remarquer par la poussière qu'on fait naître de deux marbres, ou de deux morceaux de bois dressés, qu'on frotte l'un sur l'autre un peu rudement.

Dans le fecond cas, ces mêmes parties engagées se quittent à-peu-près comme les dents des deux roues de montre se désengrennent en rou-lant l'une sur l'autre: s'il arrive qu'elles ayent peine à se quitter, c'est qu'il y a disproportion entre les parties faillantes, & les vuides qui les reçoivent; mais jamais cette dernière espéce de frottement n'est aussi efficace que l'autre, pour rallentir le mouve-

ment.

L'usage

Expérimentale. 233

L'usage où l'on est d'enrayer les toues des voitures dans les descentes rapides, nous fournit un exemple familier des différens effets que produisent ces deux sortes de frottemens. Quand on craint qu'un carrosse, ou une charrette, ne se précipite en descendant trop vîte, on empêche les roues de tourner sur leur axe; alors le même point de la circonférence traîne successivement sur une suite de points pris sur le terrein; c'est un frottement de la première espèce, qui résiste considérablement au mouvement de la voiture. Il n'en est pas de même quand chaque roue tourne à l'ordinaire sur son essieu; elle se déploie sur les différentes parties du plan qu'elle a à parcourir; son frottement, quant à sa circonférence, n'est que de la seconde espéce; & son mouvement beaucoup plus libre, le seroit trop, s'il se trouvoit encore favorisé par une pente trop roide.

Il n'est pas aussi facile d'estimer la résistance qui vient des frottemens, que celle des milieux considérés par rapport à leur densité, au volume & à la vîtesse du mobile qui les dé-

III. Leçon.

V

234 LEÇONS DE PHYSIQUE

place. Le passage successif d'une surface fur une autre, est d'autant plus retardé, qu'elles ont toutes deux plus d'inégalités; mais ce plus ou ce moins varie à l'infini, non-seulement par la nature des corps, mais aussi par le dégré de perfection qu'ils peuvent recevoir de l'art. Un ouvrier ne peut jamais dire qu'il a poli également deux morceaux du même bois, du même métal, de la même pierre, &c. & quand il auroit une régle certaine pour s'en affûrer, on ne pourroit pas compter sur la constance de cet état; toutes les matiéres s'usent & s'altèrent peu à-peu, & ces accidens dont on ne peut guère estimer la valeur, augmentent quelquefois, & plus fouvent diminuent le poli des furfaces.

Les autres quantités qui entrent dans l'évaluation des frottemens, la grandeur des superficies, la pression qu'elles ont l'une sur l'autre, leur dégré de vîtesse, sont des choses plus faciles à mesurer; mais comme leur valeur est relative à l'état actuel des surfaces, il reste toujours beaucoup d'incertitude dans l'estimation des

Experimentale. rélistances qui en résultent. On se con-LECON.

tente pour l'ordinaire d'un à-peu-près qui fouvent n'en est point un, en supposant qu'un tiers de la puissance, ou du mouvement imprimé à une machine, est employé à vaincre les frottemens: mais on voit bien que cela doit s'entendre d'une machine en grand, & qu'il doit y avoir beaucoup de variété, fuivant son dégré de simplicité, & selon la persection des

piéces qui la composent.

Quelques Phyliciens * ont préten- *M. Amondu que la grandeur des surfaces n'en-l'Acad. des troit pour rien dans le frottement, Sc. 1699. P. & qu'on ne devoit avoir égard qu'au Exp. de M. dégré de pression. « Un corps, difent- de la Hire. » ils, qui a plus de largeur que d'épaif-» seur, ne doit pas faire plus de résisstance, quand on le traîne sur sa plus orgrande surface, que lorsqu'il frotte » par fon côté le plus étroit; parce » que la pression qui vient de son » poids, étant la même dans l'un & adans l'autre cas; si dans le premier wil y a plus de parties engagées, el-» les le sont moins profondément que » dans le fecond. »

Ce raisonnement, qui ne conclu-Vij

tons, hift. de

236 Leçons de Physique

III.
LEÇON.
*V. EHift. de
PAcad. des
Sciences de
1703.p'. 108.

roit pas seul, & auquel on peut en opposer bien d'autres *, a été appuyé de quelques expériences très-ingénieules, & en apparence très-favorables à l'opinion qu'on vient d'exposer: mais dans une matière comme celle-ci, où l'on ne peut pas tirer des conséquences du particulier au général, il faut se régler sur ce qui arrive le plus ordinairement. Des épreuves réitérées m'ont presque toujours fait voir, comme à M. Muschenbroek, qui en a fait beaucoup en ce genre, qu'il falloit compter les furfaces pour quelque chose, pour beaucoup moins cependant que les preffions; quant au rapport des unes & des autres avec les effets, je n'ai rien trouvé d'assez constant, pour en pouvoir faire le fondement d'une exacte théorie.

Outre la pression & la grandeur des surfaces, on doit encore faire entrer la vîtesse dans l'évaluation des frottemens; car comme cette sorte de résistance vient des parties engagées qu'il faut rompre, ou qu'on ne peut dégager qu'en faisant céder la pression qui tient les surfaces appli-

EXPÉRIMENTALE. 237
quées l'une à l'autre; il est évident
que la somme des résistances doit
être d'autant plus grande, que le
corps frottant aura plus de chemin
à faire dans un tems déterminé; parce qu'alors il faut que les parties engagées se rompent en plus grand
nombre, ou se dégagent plus fréquemment.

Mais une chose très-remarquable, c'est que cette augmentation de résistance qui vient de la vîtesse avec
laquelle on fait frotter les surfaces,
a ses bornes, au-delà desquelles on
peut accélérer les mouvemens, sans
que les frottemens en deviennent plus
considérables; ainsi l'on peut dire
en quelque saçon, qu'en augmentant
la cause, on n'augmente plus son effet; paradoxe qui mérite d'être expliqué.

Supposons que DE, & FG, Fig. 8. représentent deux surfaces de corps durs, dont les inégalités insensibles soient engrenées les unes dans les autres; que la pression qui les joint, agisse dans la direction AB, perpendiculaire à celle du mouvement qui fait glisser ces deux corps l'un sur l'au-

III. Leçon. III LEÇON.

238 LEÇONS DE PHYSIQUE tre. On voit bien que celui de desfus ne peut se mouvoir selon la direction BC, à moins que ses parties les plus élevées e, f, g, h, ne se dégagent des creux dans lesquels elles sont enfoncées, ce qui ne se peut faire qu'autant que le corps entier DE, fera soulevé contre l'effort de la presfion. Si cette pression est assez grande pour faire retomber ces parties qui ont été dégagées, dans les creux qui fuivent immédiatement ceux qu'elles ont quittés, c'est-à-dire, que la partiee, fortant du 1 retombe au 2, au 3, &c. il est visible que l'effort qu'il faudra faire pour soulever le corps DE, ou (ce quiest la même chose,) pour désengrener les parties, se répétera autant de fois qu'il y a de ces petites élévations à la furface FG; & plus le corps frottant fera de chemin dans un tems donné, sur celui auquel il est appliqué, plus ces soulévemens & ces rechûtes auront lieu; ainsi la résistance des frottemens augmente par la vîtesse, tant que cette vîtesse n'empêche pas que les parties hautes d'une surface se logent successivement dans toutes les parties

EXPÉRIMENTALE. 239 basses de l'autre surface, de la ma-

niére qu'on vient de l'exposer.

Mais il peut arriver que le mouvement qui se fait selon la direction BC, soit si rapide, que lorsque les parties saillantes e, f, g, h, ont été dégagées, elles foient entraînées d'une quantité confidérable avant que la pression les engage de nouveau; que la partie e, par exemple, ayant quitté le 1. creux de la surface FG, au lieu de retomber dans le 2, soit transportée jusqu'au 3, ou jusqu'au 4, & alors on conçoit aisément que le corps frottant DE, pourra parcourir 2 ou 3 fois autant de surface sur FG, sans cependant que ses parties y soient plus fréquemment engagées.

Les expériences que je vais rapporter, feront voir ce qui m'a paru invariable dans les frottemens. 1°. Oue le frottement de la première efpéce fait beaucoup plus de résistance, que celui de la seconde. 2°. Que le frottement augmente par l'augmentation des furfaces, toutes choses égales d'ailleurs. 3°. Que la pression fait croître aussi la résistance du frottement, de quelque espéce qu'il

III. LECON. foit. 4°. Qu'à proportions égales, la résistance des frottemens augmente plus considérablement par les pressions que par les surfaces.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La Fig. 9. représente un instrument composé 1°. de quatre rouleaux, 1, 2, 3, 4, suspendus par des pivots très-fins dans deux doubles montans PP; 2°. d'un autre rouleau plus grand que les précédens, & dont l'axe OO a dans toute sa longueur environ 2 lignes 1 de diamétre, & se termine par deux pivots d'acier, qui roulent dans deux vis QQ, percées felon leur longueur, ou bien fur les deux intersections des deux paires de rouleaux; un ressort spiral fixé d'une part à l'un des doubles montans, & de l'autre à l'axe de ce dernier rouleau, le fait tourner alternativement fur deux fens, & l'on compte la durée du mouvement du rouleau par le nombre des vibrations du ressort: 3°. d'une piéce R, représentée seule par la Fig. 10. qui repose sur l'axe

Expérimentale. 241

l'axe du rouleau, tantôt par une furface s, tantôt par deux autres tt,
femblables à s, & au bout de laquelle on attache un ou plusieurs petits
poids, pour augmenter la pression
fur l'axe. Quand on tend le ressort,
on avance le levier V, pour appuyer
un des croisillons du grand rouleau,
afin d'être sûr du dégré de tension, &
pour le détendre avec justesse.

On met d'abord les pivots du rouleau dans les trous des vis, QQ, & ensuite on les fait reposer sur les intersections des rouleaux, sans charger l'axe avec la pièce R; & dans l'une & dans l'autre épreuve, on a soin que

le ressort soit tendu également.

EFFETS.

Le ressort ayant été détendu; si dans le premier cas on a compté 29 ou 30 vibrations ayant que le mouvement cesse entiérement; dans le second on en compte environ 400, dont chacune dure près d'une seconde.

EXPLICATIONS.

L'EXPÉRIENCE précédente confidétée dans les deux faits qu'elle établit, Tome I. X III. Leçon. III. Leçon,

242 LEÇONS DE PHYSIQUE = prouve visiblement que les frottemens, de quelque sorte qu'ils soient, détruisent le mouvement par une résistance qui ne diffère que du plus au moins. Mais elle fait voir en même tems, que des deux espéces de frottemens que nous avons distinguées, la premiére a des effets bien plus considérables que l'autre : quand les pivots tournent dans les vis percées, c'est un frottement de la premiére forte; toute leur surface cylindrique passe successivement sur la partie inférieure de chacun des trous : quand au contraire ces mêmes pivots font tourner par leur mouvement les rouleaux qui les portent, ce n'est plus qu'un frottement de la seconde espéce; car alors la circonférence des uns ne fait plus que se développer sur celle des autres ; la partie qui a touché, ne touche plus l'instant d'après, & celle qui la précéde lui sert de point d'appui, pour se dégager fuivant une direction favorable, comme la dent d'une roue qui commence à engrener le pignon, favorise le désengrénage de celle qui avoit engrené avant elle. Wash asi ansb son

APPLICATIONS.

III. Leçon.

RIEN n'est si commun que les effets du frottement; on les rencontre par-tout, & l'on peut dire en général que c'est la principale cause des altérations & du dépérissement que nous remarquons dans tous les ouvrages de l'art, & fur-tout dans ceux dont nous faisons un fréquent usage. Les habits, les meubles, les bijoux, les instrumens, &c. ne durent qu'un certain tems, parce que les frottemens aufquels ils font continuellement exposés, changent insensiblement les furfaces & les formes, & leur font perdre les qualités qui en dépendent. Les matières les plus dures & les plus folides, ne tiennent point contre un long service sans donner des marques de diminution; un rasoir, un couteau, une hache, perdent bientôt le fil de leur tranchant; le foc d'une charrue a besoin d'être réparé de tems en tems; & le cheval dont le pied glisse sur le pavé, y laisse une trace où les yeux les moins attentifs ne peuvent méconnoître les parties de son fer, que le frottement

X ij

III, Legon,

244 LEÇONS DE PHYSIQUE y a fait rester. Mais comme rien ne s'anéantit dans l'univers, toutes ces particules ainsi détachées de leurs masses, se mêlent avec différentes matiéres, dans lesquelles elles se retrouvent lorsqu'on y pense le moins. De bons Physiciens ont été surpris de trouver du fer dans l'argile & dans la cendre des plantes, parce qu'ils ne faisoient point assez d'attention à la prodigieuse divisibilité des métaux en général, & en particulier à la dispersion continuelle qui se fait des parties de celui-ci, tant par les outils que l'on use à cultiver la terre, que par une infinité d'autres usages qui le mettent en état d'être répandu partout. D'autres plus attentifs à cette grande & continuelle confommation des ouvrages de fer, l'ont reconnu, ce métal, dans la boue des grandes villes, & lui ont attribué la couleur noire qu'elles ont, & dont il est trèsvraisemblablement la cause. Si l'or étoit aussi commun que le fer, & qu'on en fit un usage aussi fréquent & aussi étendu, ne doutons pas qu'on ne le rencontrât de même dans toutes les matiéres où l'on prendroit la

EXPERIMENTALE. peine de le chercher avec soin : mais = celui qui l'auroit trouvé quelque part que ce pût être, seroit-il en droit de dire qu'il a fait de l'or ? pas plus, ce me femble, que celui qui trouve aujourd'hui du fer dans la cendre, ne peut se vanter d'avoir fait du fer. Parmi tous ces fameux Adeptes qui ont enrichi le monde de leurs promesses, s'il s'est trouvé quelque faiseur d'or qui le fût de bonne foi, c'est que dans un grand nombre de matiéres passées au creuset, il se sera trouvé par hasard quelque parcelle d'or qui ne devoit rien autre chose à l'opération de l'artiste, que d'avoir été séparée des corps étrangers dans lesquels elle étoit cachée. Faire de l'or de cette manière me paroît une chose possible; mais je doute fort qu'on en fit assez pour payer la dépense du charbon.

Si les frottemens nuisent en beaucoup d'occasions, il y en a bien d'autres aussi où nous les mettons à profit; les arts ont sçu tourner à leur avantage, jusques aux choses même qui semblent opposées à leur progrès. Une lime n'est autre chose qu'une surface hérissée exprès de pointes

III. Leçon.

X iij

246 LEÇONS DE PHYSIQUE & de tranchans; son frottement sur les matiéres les plus dures, est un moyen très-commode de les figurer à son gré par une diminution de volume bien ménagée; aussi cet outil est-il en usage dans un grand nombre de métiers. L'ouvrier intelligent qui l'employe, tire du même moyen différens avantages suivant les modifications qu'il y met. Tantôt pour gagner du tems, il fait agir une lime dont l'apreté exige plus de force de sa part; tantôt il la choisit d'une taille plus fine, pour adoucir ce que la premiére n'a fait qu'ébaucher; & enfin quand la plus douce de ses limes ne l'est point encore assez, il la frotte d'huile qui retient les parties du métal à mesure qu'elles se détachent; par ce moyen les petits creux de l'outil se remplissent, de façon que ses pointes en deviennent plus courtes, & sa furface moins rude.

Ce que nous disons des limes, doit s'entendre des meules & autres pierres à aiguiser, qui n'en différent, quant à l'effet du frottement, que par une plus grande dureté.

Les compas, & généralement tous

Expériment à charnières, qui doiles instrumens à charnières, qui doivent rester ouverts ou fermés à dissérens dégrés, tiennent pour l'ordinaire cette propriété d'un frottement bien égal; & l'on gagne beaucoup de tems dans l'usage qu'on en fait, quand on n'est point obligé de les fixer par d'autres moyens, comme lorsqu'on

les arrête avec des vis ou autrement. On diminue la résistance des frottemens, en enduisant les surfaces de quelque fluide ou de quelque matiére grasse. On frotte de savon les bords d'une boîte dont le couvercle tient trop; on met de l'huile aux charniéres pour en faciliter le jeu; on graisse les moyeux des roues en dedans; ce font autant de moyens par lesquels on remplit les inégalités les plus grofsiéres des surfaces, & qui par conséquent les rendent plus lisses & plus propres à glisser l'une sur l'autre. D'ailleurs les parties de ces fluides ou de ces corps gras interposés, changent l'espece du frottement : ce font autant de petits globules qui roulent entre les surfaces, qui leur servent de véhicule commun, & qui font en petit ce que nous voyons d'une ma-

III. Leçon.

Xiv

niére plus sensible, quand on met des rouleaux sous une pierre, ou sous une pourre pour en faciliter le transport.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

On laisse les pivots du grand rouleau sur les intersections des 4 petits : & l'on tend le ressort au même dégré que dans l'expérience précédente. On fait d'abord poser la pièce R sur l'axe du grand rouleau par une seule surface s, & avec son propre poids seulement; & ensuite on la retourne pour faire porter les deux surfaces st, sans augmenter le poids, & l'on compte les vibrations dans l'un & dans l'autre cas.

EFFETS.

Lorsque le frottement se fait par une seule surface, comme dans le premier cas, on compte 40 vibrations; lorsque la surface qui frotte est double comme dans le second, on n'en compte plus que 29 ½; toutes choses étant égales d'ailleurs, ainsi qu'on l'a supposé.

EXPLICATIONS.

III.

L'inegalité des surfaces étant la cause premiére des frottemens, il est bien plausible qu'en augmentant l'étendue qui frotte, on doit faire croître aussi le nombre de ces inégalités: s'il se trouve quelque cas où cela n'arrive point fensiblement, ce sera sans doute une exception dûe à la disposition particulière des superficies; ou bien lorsqu'on employera une si grande quantité de mouvement que la résistance des frottemens deviendra trop peu considérable pour êrre mesurée, & par conséquent pour être comparée. Mais comme dans les grandes machines, où les frottemens font d'une bien plus grande conféquence qu'ailleurs, les piéces ont toujours des surfaces assez rudes, nous croyons qu'on ne doit point négliger la quantité de leur étendue. On voit cependant par l'expérience précédente, que la résistance des frottemens, quoique dépendante en partie de la grandeur des surfaces, ne la fuit pas dans toutes ses proportions. Dans l'un des deux cas cités la super-

ficie étant double, les frottemens ne font point doublés: & il feroit trèsdifficile, pour ne rien dire de plus, de déterminer le rapport de ces résistances avec une quantité de surface donnée.

APPLICATIONS.

Les frottemens considérés en raifon des surfaces, retardent la vîtesse
de tous les corps indisséremment;
nous venons de le prouver pour les
folides, & l'on peut remarquer tous
les jours que la même chose se passe
à l'égard des fluides & des liqueurs.
Les jets d'eau ne s'élévent jamais à
la hauteur à laquelle ils devroient
monter, eu égard à leur quantité de
mouvement; & les riviéres coulent
plus lentement dans le tems des eaux
basses.

L'eau qui est amenée par un tuyau & qui rejaillit en l'air, éprouve partout du frottement; la surface intérieure & immobile du tuyau la retarde d'une part, & quand elle passe dans l'air, elle doit être regardée encore comme dans un autre tuyau, dont la surface ne diffère de l'autre

Expérimentale. 251 que par la rareté & par la mobilité de =

fes parties.

Quoique la surface d'un gros tuyau foit plus grande que celle d'un plus étroit, elle est cependant moindre relativement à sa capacité; car c'est une chose démontrée, que celui qui a 2 pouces de diamétre (nous parlons de tuyaux ronds & cylindriques) contient quatre fois plus d'eau que celui dont le diamétre n'est que d'un pouce; & que la circonférence du premier n'est que deux fois aussi grande que celle du dernier. On voit parlà que dans de pareils tuyaux, le frottement qui vient des surfaces, diminue à mesure qu'on augmente la capacité; puisque si le volume d'eau qui est quadruple dans le plus gros, étoit contenu dans quatre semblables au petit, il répondroit à des surfaces dont la somme seroit double de celle qui le contient. L'expérience est tout-à-fait d'accord avec cette théorie; car plus on diminue la capacité des tuyaux dans les pompes, dans les aqueducs, dans les fontaines, &c. plus on trouve de retardement dans la vîtesse des eaux.

III. Leçon, 252 Leçons de Physique

III. Leçon. C'est par la même raison, que les rivières sont plus rapides dans le tems des grandes eaux; les frottemens qu'elles ont à vaincre de la part de leurs lits sont partagés alors à une masse plus considérable, & s'opposent moins par conséquent au mouvement du fluide.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

L'INSTRUMENT étant disposé comme dans l'expérience précédente, il faut que la pièce R repose sur l'axe du grand rouleau par la surface s, & attacher en X le petit poids Y qui double la pression.

EFFETS.

Dans ce dernier cas on ne compte que 21 vibrations, quoique le reffort ait été tendu comme dans les épreuves précédentes.

EXPLICATIONS.

LE poids qu'on ajoute augmentant la pression, fait croître aussi le frottement, parce que les parties des

III. Leçona

EXPÉRIMENTALE. 253 Turfaces quis'engagent mutuellement, = s'enfoncent bien plus avant, & réfistent davantage au mouvement qui tend à les féparer. On voit par cette derniére expérience, qu'une double pression fait plus qu'une surface augmentée de moitié : car nous avons vû précédemment, qu'en faisant frotter deux surfaces au lieu d'une, le nombre des vibrations n'a été diminué que d'un quart, & nous voyons maintenant en mettant la pression double, qu'il ne se fait plus que 21 vibrations au lieu de 40, ce qui est presque la moitié de diminution.

APPLICATIONS.

Dans les grandes chaleurs les mouvemens d'horlogerie se rallentissent sensiblement; cet accident qui dérange les pendules & les montres, dépend ordinairement de plusieurs causes qui concourent au même effet. Il en est une à laquelle on fait peu d'attention, mais qui mérite cependant d'être comptée comme les autres : c'est le frottement qui augmente par la pression à mesure que les piéces s'échaussent. Car on sçait, &

nous le prouverons quand il en sera tems, que les métaux, ainsi que toutes les autres matiéres augmentent en volume par le chaud, comme ils diminuent de grandeur par le froid; la même cause dilatant les platines rend les trous plus étroits, & grossit les pivots, de manière que par ce double effet, le frottement augmente par pression, & le mouvement en est d'autant plus gêné.

Un Tourneur qui façonne un morceau de métal entre deux pointes fixes, est quelquesois surpris de sentir que sa piéce résiste au mouvement de l'archet après avoir tourné librement pendant quelques minutes; c'est que le frottement augmente par la pression à mesure que le métal s'allonge en s'échauffant: aussi le reméde le plus prompt & le plus en usage, c'est de le mouiller avec un peu d'eau pour

le refroidir.

Le service que l'on tire des pinces, des tenailles, & de tout ce qui est analogue à ces instrumens, ne vient encore que d'un frottement augmenté par une forte pression.

Une remarque qu'il est à propos

EXPERIMENTALE. 255 de faire ici, c'est que les machines qui font leur effet en petit, ne le font pas toujours quand on vient à les exécu- Leçon. ter en grand, quoiqu'on y garde les mêmes proportions : cela vient pour l'ordinaire de ce que les frottemens ne fuivent point dans leur accroissement, la proportion des furfaces seulement, mais plutôt celles des pressions qui augmentent affez fouvent, comme le poids ou la solidité des piéces; c'està-dire, par exemple, que si dans le modéle on avoit réduit toutes les dimensions au pouce pour pied, en construisant en grand, le chevron qui auroit 12 pieds de long, & 6 pouces d'écarrissage, péseroit 1728 fois autant que ce qui le réprésente en petit, s'il est de même matière. Cette considération qu'on ne peut négliger quand on a des principes, fait quelquefois juger désavantageusement d'une machine dont le succès paroît être assuré par l'expérience même.

DE tout ce que nous avons dit & prouvé touchant la résistance des milieux & des frottemens, il faut conclure que dans l'état naturel il ne

peut y avoir aucun mouvement méchanique inaltérable; 1°. parce qu'un corps ne peut se mouvoir que dans un espace, & qu'il n'y a aucun lieu parfaitement vuide de toute matière; 2°, parce qu'un corps, tel qu'il foit, ne peut exercer fon mouvement que fur quelque surface, ou bien il faut le fuspendre à quelque point fixe, autour duquel il se puisse mouvoir: dans I'un & dans l'autre cas il y a frottement, ou sur le plan, ou au point de suspension, ou dans le milieu même dans lequel il passe. La quantité du mouvement qu'on lui aura imprimée, fera donc nécessairement diminuée par ce double obstacle : ainsi pour se mouvoir perpétuellement, il faudroit qu'il prît à chaque instant de nouvelles forces, pour réparer celles qu'il perd; ce qui est contraire à la premiere loi du mouvement, qui veut qu'un mobile garde constamment l'état qu'on lui a fait prendre, si cet état n'est changé par une cause nouvelle. De-là il paroît évidemment démontré qu'il ne peut y avoir de mouvement perpétuel méchanique dans l'état naturel, & que ceux qui

256 LEÇONS DE PHYSIQUE

EXPÉRIMENTALE. 257 le cherchent avec obstination, & = qui multiplient les frais dans cette III. vûe, perdent leur tems, leurs peines, Leçon.

& leurs dépenses.

Si quelqu'un prend pour perpétuel, le mouvement d'un pendule qui continue ses vibrations égales par le moyen d'un ressort ou d'un poids qu'on remonte au bout d'un tems, ou de toute autre chose équivalente, il n'entend pas l'état de la question; car il s'agit d'un mouvement une fois imprimé, auquel on n'ajoute plus rien par la suite, & qui se suffise à luimême pour se perpétuer. Le ressort ou le poids par son effort constant, répare fans cesse le dégré de vîtesse perdu dans l'instant précédent, & cette réparation est une addition au mouvement primitif.


Ceux qui s'en laissent imposer par l'inspection d'une machine, ou par une prétendue démonstration géométrique, sur laquelle on s'appuie quelquefois, pour établir la découverte du mouvement perpétuel, font les dupes de la mauvaise foi ou d'un paralogisme qui ne tiennent guères contre des gens instruits. Le

Tome I.

mouvement perpétuel est la pierre philosophale de la méchanique; ordinairement ceux qui s'y heurtent, ne font pas fort initiés dans cette science, de même qu'une recherche obstinée de la quadrature du cercle, ou du grand œuvre, n'annoncent à préfent ni un Géométre sublime, ni un

habile Chymiste.







EXPERIMENTALE. 259

IV. LEÇON.

Suite des Loix du Mouvement simple.

Des causes qui changent la direction du Mouvement.

A Pre's avoir enseigné dans la dernière section de la Leçon précédente, ce qui diminue indispensablement
la vîtesse du mobile, il nous reste à
faire connoître les causes qui changent sa direction, quand il ne garde
pas celle qu'il avoit d'abord. Mais
pour le faire d'une manière plus intelligible, nous commencerons par
établir la seconde & la troisséme loi
du mouvement simple, sur lesquelles
sont sondées la plûpart des choses
que nous avons à dire touchant cette
matière.

IV. Leçon.

260 Leçons de Physique

IV. Leçon.

Seconde Loi du Mouvement simple.

Le changement qui arrive en plus ou en moins au mouvement d'un corps, est toujours proportionnel à la cause qui le

produit.

Dans un mobile dont on suppose la masse constante, il n'y a de variables que sa vîtesse & sa direction: pour changer l'une ou l'autre, il faut une force politive qui n'est point dans le mobile avant le changement, & qu'il n'a pas la faculté de se donner à lui-même. Cette force, quand elle agit, ne peut produire que ce dont elle est capable, ainsi l'on peut juger de sa valeur par celle de son effet. Comme une livre de plomb dans le bassin d'une balance, n'a ni plus ni moins que le poids d'une livre, on ne doit pas s'attendre que son action contre l'autre bassin excéde, ou vaille moins qu'un pareil poids, si la balance est juste; & réciproquement si ce dernier bassin est tenu en équilibre, on peut en toute fûreté conclure que le poids de l'autre part qui en est la cause, égale une livre.

Troisiéme Loi du Mouvement simple.

IV. Leçone

La réaction est égale à la compression.

Lorsqu'un corps en mouvement, ou qui tend à se mouvoir, agit sur un autre corps, il le comprime, & ce dernier exerce réciproquement sur lui une compression égale. Quand avec le bout du doigt j'appuie sur un bassin vuide de balance, pour soulever une livre de plomb qui est dans l'autre bassin, c'est la même chofé que si je recevois la livre de plomb fur le bout de mon doigt pour la soutenir. Qu'un homme sur le rivage tire son bateau à bord avec une corde, ou qu'il se tienne dans le bateau pour tirer la même corde attachée à un pieu fur le rivage, il s'ensuivra le même effet ; car la résistance ou la réaction du point fixe, égale l'action de celui qui agit contre elle.

Examinons maintenant comment un mobile change de direction, & quelle régle il fuit dans ce change-

ment.

Quand un corps en mouvement change de direction, c'est qu'il y est,

forcé par un obstacle; car selon la premiére loi, il tend de lui-même à persévérer dans son état: mais cet obstacle peut être une matière fluide, dans laquelle il s'ouvre un passage; ou bien un corps solide qui lui oppose toute sa masse à cause de la liaison de ses parties. Une pierre jettée dans l'eau nous représente le premier cas; une balle de paume lancée contre la muraille, est un exemple du second.

PREMIERE SECTION.

Du changement de Direction occasionné par la rencontre d'une matiére fluide.

S I le mobile que l'on a déterminé vers un certain point, vient à rencontrer quelque matière fluide, ou comme telle à fon égard, il ne fait que passer d'un milieu dans un autre; & ordinairement ces milieux ne sont point également pénétrables pour lui, soit par la dissérence de leurs densités, soit par quelque autre cau-

EXPÉRIMENTALE. 263 fe qu'il n'est point tems d'examiner = ici. Ce plus ou moins de résistance IV. qu'il éprouve en entrant dans le nou- Leçon. veau milieu, ne manque point de lui faire quitter sa premiére direction, toutes les fois qu'il entre obliquement; & ce changement se nomme réfraction, pour faire entendre que la direction du mobile est comme brisée à l'endroit où les deux milieux se joignent. Eclaircissons ceci par une figure, & par quelques exemples.

Supposons un grand bassin plein d'eau dont la coupe soit représentée par ABCD, Fig. 1. & une pierre, ou tout autre corps dur E, placé dans l'air, & que l'on dirige vers la surface de l'eau avec assez de vîtesse pour l'y faire entrer, & I'y faire continuer son

mouvement.

Pour cet effet, on ne peut diriger cette pierre que de deux maniéres : sçavoir par la ligne perpendiculaire PF, ou bien par une ligne oblique prise entre PF, & CF. Car il est évident que si elle suivoit CF, ou sa paralléle, elle n'entreroit jamais dans l'eau, ou (ce qui est la même chose) elle ne changeroit point de milieu,

264 LECONS DE PHYSIQUE = Si le corps E vient à la surface de l'eau par la ligne PF, il continue de se LECON. mouvoir par Fp, & sa direction ne

reçoit aucun changement.

Mais s'il fuit une ligne oblique comme e F, dès qu'il sera parvenu en F, l'eau sera pour lui un milieu réfringent : au lieu de continuer son mouvement par FG, il prendra une nouvelle direction qui fera entre F G & FA, telle, par exemple, que FH. C'est-à dire, que la pierre, ou en général le mobile, souffrira réfraction, & que cette réfraction l'éloignera de la perpendiculaire imaginée Fp, plus qu'il n'auroit fait, s'il avoit continué de se mouvoir selon sa première direction.

La réfraction se feroit en sens contraire, si le mobile passoit d'un milieu plus rélistant, dans un autre qui le fût moins, par exemple, s'il fortoit de l'eau pour entrer dans l'air : de façon que s'il avoit décrit la ligne HF, il ne continueroit point par FK, ni par aucune autre entre K & C; mais la réfraction qu'il fouffriroit en F, le détermineroit dans une nouvelle direction entre K & P, ce qui l'appro-

cheroit

EXPÉRIMENTALE. 265 cheroit davantage de la perpendicu-

IV. Leçona

Pour ôter toute équivoque sur cette perpendiculaire que l'on prend pour terme de comparaison, lorsqu'on veut exprimer en quel sens se fait la réfraction; il est bon d'observer qu'elle n'a rien de commun avec l'horizon, qu'autant que la surface du milieu réfringent est horizontale, comme il arrive quand c'est un liquide en repos ; car c'est toujours de la perpendiculaire à cette surface qu'il s'agit : dans quelque position que puisse être le milieu qui cause la réfraction. Si par exemple, au lieu d'une eau dormante, telle que nous l'avons supposée, on choisissoit celle d'une cascade, ou d'une riviér qui eût une pente considérable, pour y lancer une pierre; la perpendiculaire à laquelle on rapporteroit la direction de ce corps, tant avant qu'après son entrée dans l'eau, seroit une ligne inclinée à l'horizon; elle seroit même horizontale, si la surface réfringente étoit verticale.

La réfraction dépend donc de deux conditions, fans l'une ou l'autre Tome I.

266 LEÇONS DE PHYSIQUE desquelles elle n'a plus lieu: la premiére est l'obliquité d'incidence de la part du mobile; la seconde, qu'il y ait plus de résistance dans un milieu que dans l'autre; prouvons d'abord ceci par des faits, & tâchons ensuite d'en faire connoître la cause.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La machine qui est représentée par la Fig. 2. porte à deux pieds $\frac{1}{2}$ au-defus de sa base un petit canon de cuivre I, par lequel on fait tomber une balle de plomb du poids d'une once environ, dans un vase de crystal L, qui a 12 ou 14 pouces de hauteur, & au fond duquel on a étendu un lit de terre glaise, ou de cire molle, d'un pouce d'épaisseur.

La balle ayant marqué fa place par cette première chûte, on la fair tomber de même une seconde fois, après avoir empli d'eau le vais-

feau L.

EFFETS.

On trouve la balle de plomb après

EXPÉRIMENTALE. 267 la seconde chûte, dans le même endroit qu'elle avoit marqué en tombant la première fois.

LECON.

EXPLICATIONSO

Il paroît par cette expérience, que la balle de plomb a toujours confervé sa premiére direction, soit qu'elle fît tout fon mouvement dans l'air, foit qu'elle tombât en passant de l'air dans l'eau. Mais par quelle raison se seroitelle détournée, si les obstacles qu'elle a rencontrés, se sont toujours oppofés également de toutes parts; si l'effort de sa pesanteur à qui elle obéisfoit, n'a jamais eu à vaincre que des résistances qui cédoient toutes ensemble avec la même facilité, ou qui la retardoient avec des quantités égales? Considérons cette balle dans les différens instans de sa chûte.

1°. Lorsqu'elle est encore entiérement dans l'air, ce fluide qu'on suppose en repos, & d'une densité uniforme autour du mobile, ne fait que retarder sa vîtesse. Mais cette résistance n'influe en rien sur la direction, puisqu'elle agit indifféremment en

toutes sortes de sens.

268 LEÇONS DE PHYSIQUE

2°. On peut dire la même chose en considérant la balle dans le tems qu'elle est entiérement plongée dans l'eau; car la difficulté qu'elle trouve à s'ouvrir un passage dans ce liquide, quoique plus grande que dans l'air, ne l'empêche point de tendre au même but, mais seulement d'y arriver avec autant de vîtesse qu'elle en auroit dans un milieu moins résissant.

3°. Enfin, si l'on examine ce qui se fait pendant que la balle passe de l'air dans l'eau, & qu'elle est encore partie dans l'un, & partie dans l'autre de ces deux milieux; on concevra facilement que cette immersion ne doit rien changer à sa première di-

rection.

LECON.

Car lorsque le corps M, Fig. 3. descend par la ligne P p; toutes les parties de la surface décrivent des paralléles comme NT, nt; & la résistance du milieu s'exerce sur tout l'hémisphère NO n. Quand il commence à se plonger, l'eau résiste directement en O; & à mesure qu'il s'ensonce, les parties O S, SR, RN, & leurs correspondantes O s, sr, rn, participent successivement à la résis-

EXPÉRIMENTALE. 269 tance du nouveau milieu. Mais comme ces différentes parties forment des plans plus obliques les uns que les Leçon. autres depuis O jusqu'en N, de part & d'autre; la résistance de l'eau pendant cette derniére immersion, augmente par des quantités qui vont toujours en décroissant.


Dans tout ceci l'on n'apperçoit aucune cause qui doive faire perdre au corps M, sa première direction; en conséquence de sa figure sphérique, les obstacles qui se rencontrent en N, en R, en S, &c. font justement compensés par les rélistances qui s'opposent aux parties n, r, s, &c. & cet équilibre maintient toujours le centre M dans la ligne P p. Cette expérience prouve donc que l'obliquité d'incidence de la part du mobile, est absolument nécessaire pour la réfraction, puisque sans elle il continue son mouvement suivant sa premiére direction, quoiqu'il passe d'un milieu moins résistant dans un autre milieu qui l'est plus.


APPLICATIONS.

Un corps grave que son propre Ziij

270 LECONS DE PHYSIQUÉ poids fait tomber dans l'eau, doit se trouver au fond dans un endroit qui réponde perpendiculairement à celui de la surface par lequel il a passé en tombant. Mais 1°. il faut supposer pour cela que le fluide étoit en repos pendant le tems de la chûte. Car on scait que ce qui tombe dans une rivière ou dans un torrent, est entraîné par le courant de l'eau en même tems qu'il obéit à la force de sa pesanteur. C'est pourquoi les gens qui se novent dans les eaux qui coulent, ne se trouvent jamais vis-à-vis du lieu où ils ont commencé à difparoître.

2°. La figure du corps qui s'enfonce dans un fluide, contribue beaucoup, ou à lui faire garder, ou à lui faire perdre fa premiére direction indépendamment de la réfraction; car cette figure peut être telle qu'elle occasionne des inégalités dans la résistance du même fluide, Si, par exemple, au lieu de faire tomber dans l'eau un corps sphérique, tel que celui de notre expérience, on se servoit d'un hémisphère ou de quelque chose semblable, & qu'on le diri-





EXPÉRIMENTALE. 271
geât parallélement à sa partie plane;
il suit de l'explication que nous avons
donnée ci-dessus, que ce dernier mobile plus arrêté d'un côté que de l'autre par le fluide qu'il divise, à cause
de sa figure, ne garderoit point sa premiére direction, & qu'il décriroit une
ligne courbe, quoique dans un milieu très-uniforme.

IV. Leçon.

C'est une chose qui se trouve bien consirmée par une expérience aussi simple que fréquente. Toutes les sois qu'on jette horizontalement quelque corps tranchant & convexe d'un côté, comme une écaille d'huître, ou toute autre chose équivalante, on ne le voit jamais suivre la direction qu'on lui a donnée; & si l'on a tourné la convexité en embas, on remarque très-souvent qu'il s'éléve malgré le penchant de son propre poids.

On peut observer aussi que les oifeaux pesants, comme les corbeaux, les pigeons, les pies, &c. quand ils s'abattent après un long vol; ne manquent point de courber leurs aîles & leur queue, pour se donner une figure convexe en-dessous; ce

Ziv

272 LEÇONS DE PHYSIQUE

qui les dirige nécessairement dans une courbe fort allongée qui adoucit leur chûte. Ces mêmes oiseaux au contraire se posent d'une manière pesante, & se heurtent souvent contre la terre, lorsqu'ils sont trop jeunes, parce qu'ils descendent par une ligne moins inclinée à l'horizon, soit qu'ils ne sçachent point encore prendre une sigure qui les dirige autrement, soit que leurs plumes encore trop courtes, ou leurs membres trop foibles, ne le leur permettent pas.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

ABC, Fig. 4. est un quart de cercle, auquel on a fixé un canon de fusil sur le rayon AB, & que l'on a attaché à une muraille, ou à quelque chose d'inébranlable, de maniére cependant qu'il puisse tourner sur le point B; à 18 ou 20 pieds de distance, est un baquet ou une baignoire de 4 ou 5 pieds de longueur, pleine d'eau, dont on couvre la surface avec une gaze tendue, ou avec de grandes seuilles de papier. Fest un

EXPÉRIMENTALE.

chassis garni de gaze ou de papier, = qui a environ 18 pouces de hauteur & 1 pied de largeur. Ce chassis s'élève perpendiculairement à la surface de l'eau; & fa basse DE, qui est une planche un peu pesante, se place sur les bords du baquet, à une distance suffisante de son extrémité G. Il faut avoir soin de revêtir le petit côté G du baquet avec une planche de sapin fort épaisse & bien unie, qui le préferve d'accident, & fur laquelle on puisse appercevoir l'impression d'une balle. Enfin, tout étant ainsi disposé, on charge le canon avec de la poudre en suffisante quantité, & avec une balle de plomb, qui foit de calibre, s'il est possible; on le dirige vers le point I, de maniére qu'il fasse avec la surface de l'eau un angle de 30 ou 40 dégrés, & l'on y met le feu avec une petite méche placée en a. Voyez la figure citée.

EFFETS.

La balle après avoir percé les deux gazes en I & en K, au lieu de continuer fon mouvement dans cette direction pour venir en L, va frapper

IV. LEÇON.

la planche de sapin en H, par une la gne qui fait angle avec la premiére qu'elle a suivie en venant d' A en K : ce que l'on apperçoit facilement en faisant écouler l'eau du baquet, & en plaçant l'œil ensuite en I; car on remarque que le point H est sensiblement au-dessus de sa première direction, & que la résraction qu'elle a soufferte au point K, en entrant dans l'eau, l'a éloignée de la perpendiculaire P p, plus qu'elle ne l'auroit été, si elle avoit continué de se mouvoir directement jusqu'en L.

EXPLICATIONS.

C'est une suite des loix du mouvement, qu'un mobile se porte toujours du côté où il trouve moins de résistance; car l'esset étant proportionnel à sa cause, un corps qui rencontre en même tems deux obstacles, doit soussir davantage de celui qui est le plus fort, & vaincre aussi plus aisément celui qui l'est moins: or vaincre plus aisément un obstacle, c'est le repousser d'une certaine quantité en moins de tems, ou le repousfer davantage dans un tems déterEXPÉRIMENTALE. 275
miné. Car un obstacle, tel qu'il soit,
ne céde jamais sensiblement dans un
instant indivisible; le plus soible est
donc celui qui se laisse vaincre dans

un tems plus court.

L'air & l'eau dans lesquels la balle de notre expérience a passé successivement, ont fait obstacle l'un après l'autre à son mouvement; mais tant qu'elle a été entiérement dans l'un ou dans l'autre de ces deux milieux, la rélistance ayant été également difpersée à toutes les parties de l'hémisphère antérieur, comme nous l'avons fait voir dans l'explication de la premiere expérience, sa direction n'a point dû changer; les obstacles, ou les parties résistantes du fluide se faifant équilibre de part & d'autre, elle a dû persévérer constamment dans la ligne AK, & ensuite dans la ligne KH.


Si l'égalité des obstacles contre toutes les parties de l'hémisphère antérieur nop, Fig. 5. entretient le corps m dans sa direction, tant qu'il est dans un seul & même milieu; il est évident qu'en passant obliquement de l'air dans l'eau, ce même hémisphère, penIV. Leçone


276 LEÇONS DE PHYSIQUE dant tout le tems de son immersion; rencontre des obstacles plus diffici-LECON. les à vaincre d'un côté que de l'autre de sa surface. Car, par exemple, le point R venant à toucher l'eau, éprouve plus de résistance que le point Q, qui ne rencontre encore que de l'air. Ainsi l'équilibre étant rompu entre les obstacles de part & d'autre, le centre M se porte du côté des plus foibles, & commence à s'écarter de sa premiére direction ST. Mais comme la différence qu'il y a entre la résistance de l'eau & celle de l'air, est principalement fondée fur le tems qu'il faut employer pour repousser l'un ou l'autre de ces deux fluides, cette différence augmente à mesure que la vîtesse du mobile diminue; car si la balle de plomb repoussoit l'air & l'eau avec une vîtesse infinie, leurs résistances étant nulles, ou in-

> Le mouvement du corps Mrallenti de plus en plus par son immersion dans l'eau, doit donc se ressentir de cette différence augmentée entre la résistance qui se fait en la partie ORP,

> finiment petites, il n'y auroit point

de différence entre elles.





EXPERIMENTALE. 277 & celle qui agit contre O Q N. Ainsi le centre M doit abandonner de plus en plus sa première direction, & descendre par une petite ligne courbe, dont le dernier élément commence la nouvelle direction VX, que la balle suit après son immersion.

IV. Leçon.

APPLICATIONS.

L'expérience précédente nous conduit naturellement à une remarque qui peut être de quelque utilité à ceux qui veulent tuer du poisson à coups de fusil. Quelque bons tireurs qu'ils puissent être, ils manqueroient fouvent leur proie, s'ils omettoient d'avoir égard à la réfraction que doit souffrir le plomb en entrant dans l'eau. Ce que nous avons fait voir cidessus, prouve qu'il faut tirer plus bas que l'objet, puisque le coup se reléve toujours dans l'eau, quand on tire obliquement. A la vérité, comme on ne peut tirer qu'à une petite profondeur, à cause de la grande résistance de l'eau, & que la pefanteur du plomb dont la vîtesse est affoiblie, détruit une partie de la réfraction en le faisant baisser; comme d'ailleurs

on doit supposer que l'objet qu'on se propose de toucher, a une certaine étendue; il semble que dans la pratique ce changement de direction qu'éprouve le plomb en entrant dans l'eau, n'est point une chose fort importante par elle-même, & qu'on pourroit la négliger. Mais il faut faire attention que le poisson que nous voulons tirer, ne se voit que par des rayons de lumiére qui viennent de lui à nous, qui passent obliquement de l'eau dans l'air, & qui étant par conféquent dans le cas de la réfraction, ne nous représentent point l'objet dans le vrai lieu où il est. Ajoutez à cela, (& c'est ce qu'il y a de plus nécessaire à remarquer,) que la réfraction de la lumière se fait en sens contraire de celle des autres corps, comme nous le ferons voir en traitant de l'optique; de sorte que le lieu apparent du poisson est plus élevé que fon lieu réel : ce qui donne de nouvelles forces à la raison qu'on auroit de tirer plus bas, quand on n'auroit égard qu'à la réfraction du plomb. Quoique les réfractions s'observent

278 LECONS DE PHYSIQUE

IV.

Expérimentale. 279 le plus ordinairement dans des milieux fluides, on peut dire en général qu'elles ont lieu dans tous les corps, même solides, lorsque le mobile qui les pénétre, y rencontre obliquement des couches de matiéres plus résiftantes les unes que les autres. Il arrive, par exemple, très-fouvent, lorsqu'on veut percer une planche avec un poinçon, ou avec une aiguille mince & flexible, que le fer se courbe, & ne suit point la direction qu'on s'est efforcé de lui donner ; c'est que la pointe a rencontré obliquement des parties plus dures les unes que les autres, comme il est aisé d'en remarquer dans le fapin, où ces fortes de réfractions se font souvent; car on a de la peine à y chaffer un clou felon son gré, fur-tout s'il est long & mince.

La réfraction est susceptible de plus & de moins. Nous avons vu qu'elle est nulle, lorsque la direction du mobile est perpendiculaire à la surface du milieu réfringent; elle commence avec l'obliquité d'incidence, & elle augmente avec elle, & proportionnellement à elle. Car la balle qui tombe par ST, Fig. 5. souffre moins

280 LEÇONS DE PHYSIQUE de réfraction, que celle qui est dirigée par s t; & si l'on se rappelle ce que nous avons dit pour rendre raifon de la réfraction en général, on appercevra facilement, & par l'infpection seule de la figure, que la cause de cet effet augmente à mesure que l'immersion devient plus oblique.Car on voit que plus la direction est inclinée à la furface de l'eau, plus la partie O Q N de l'hémisphère antérieur est de tems dans l'air; & par conséquent, plus les résistances qui se font de la part de l'eau en la partie O R P, ont l'avantage fur celles qui agissent contre les points correspondans O Q N.

Mais dans quelque dégré que l'on considère la réfraction, on la trouve toujours proportionnelle à l'incidence du mobile, quand les milieux ne changent point; & l'on en juge en comparant les angles d'incidence ACP & BFD Fig. 6, avec ceux de réfraction a C p & b F d, que l'on mesure par les lignes P A, ap, qui en sont les sinus; car si P A est à ap, comme 2 est à 3, les deux lignes semblables DB & db, qui représentent

EXPÉRIMENTALE. 281 le cas d'une réfraction plus grande, font encore dans le même rapport entre elles.

LECON.

Nous n'entreprendrons point de prouver ceci par des expériences; la difficulté de diriger des corps graves dans des lignes parfaitement droites & obliques à la direction naturelle de leur pesanteur, ne nous le permet pas. Nous aurons lieu de le faire commodément, en traitant de la lumiére qui n'a pas cet inconvénient.

Nous ajouterons feulement, & nous le prouverons par le fait, que quand l'incidence est parvenue à un certain point d'obliquité, la réfraction se fait hors du milieu réfringent, (ce que l'on nomme alors réflection,) de maniére, par exemple, qu'une pierre, ou une balle de plomb, au lieu de paffer de l'air dans l'eau, comme nous l'avons vû précédemment, se reléve après avoir touché la surface, & forme avec elle un angle presque semblable à celui qu'elle avoit fait en tombant. Voyez la Fig. 7.

282 Leçons de Physique III. EXPERIENCE.

IV. Leçon.

PREPARATION.

Il faut disposer le quart de cercle de la Fig. 4. de manière que le canon & sa ligne de direction MN, Fig. 7. fassent avec la surface de l'eau NP, un angle d'environ 5 dégrés, & placer à l'autre bout du baquet une planche de bois tendre S, qui s'élève perpendiculairement à la surface de l'eau, & qui se présente de face à la longueur du même baquet; il faut aussi placer à fleur d'eau un chassis de gaze, qui ait environ un pied de longueur. Le canon ayant été chargé comme précédemment, il faut y mettre le seu.

EFFETS.

La balle de plomb étant parvenue en N, au lieu d'entrer dans l'eau, & d'y fouffrir une réfraction, comme dans la feconde expérience, rejaillit du point de contact, & va frapper la planche en S, faifant fon angle de réflection ONS, à peu près égal à celui de fon incidence MNP.

EXPLICATIONS.

En expliquant ci-dessus les causes de la réfraction, nous avons fait con-

LECON

Expérimentale. 283 noître que la résistance du milieu = contre une boule qui se meut en ligne droite, s'exerce sur la moitié de la surface sphérique NO n, Figure 3. nous avons fait voir aussi en expliquant la feconde expérience, que quand cet hémisphère vient à toucher en même tems deux milieux dont l'un résiste plus que l'autre, le corps entier dont il fait partie, se porte davantage du côté du plus foible. De-là il suit que cette déviation doit être d'autant plus grande, que les fluides résistans diffèrent plus entre eux, & que le plus foible des deux occupe une plus grande partie de l'hémisphère PROQN. Fig. 5. La résistance de l'air est très-petite, ou dure très-peu en comparaison de celle de l'eau, & quand la balle de plomb est dirigée par une ligne fort inclinée, comme dans notre expérience, on peut voir par la Figure que la partie qui répond à l'air, est beaucoup plus grande que celle qui touche l'eau. Ainsi l'excès de résistance de la part de ce dernier milieu, devient comme un point fixe qui refuse le passage au mobile, assez long-

Aaij

284 Leçons de Physique

IV. nuer fon mouvement dans l'air, qui Leçon. lui céde très-promptement.

Jusqu'ici l'on voit assez bien pourquoi la balle n'entre point dans l'eau, & par quelle raison elle achéve son mouvement dans l'air, après avoir touché par une direction fort oblique le milieu le plus résistant. Mais il faut convenir que ce que nous avons dit ne suffit pas pour faire entendre ce qui la détermine à remonter de bas en haut, par une autre direction oblique, qui se trouve dans Ie même plan que celle de son incidence : car de ce qu'elle doit achever fon mouvement dans l'air, il ne s'ensuit pas qu'elle soit obligée de s'élever après avoir descendu; s'il n'y avoit aucune cause pour produire cet effet, il paroît qu'on ne devroit s'attendre qu'à voir glisser ou rouler cette balle fur la furface de l'eau, quand une fois elle y seroit parvenue, & qu'il lui resteroit assez de vîtesse pour rendre l'effet de sa pesanteur insensible. En un mot, tout ce que peut faire la résistance de l'eau, c'est d'interdire le passage au mobile; mais en ne con-

IV. Leçona

Expérimentale. 285 sidérant en elle qu'un obstacle invincible, on ne voit pas qu'elle puisfe déterminer à monter, ce qui jusqu'au point de contact est bien déterminé à descendre. Il y a donc quelque chose de plus à considérer, soit dans l'eau qui réfléchit, soit dans la balle qui souffre cette réflection, ou bien dans l'une & dans l'autre, relativement aux circonstances où elles se trouvent dans notre expérience. Mais comme ce qui se passe ici à la rencontre d'une surface fluide dans le cas d'une incidence fort oblique, arrive toujours, quand un mobile tombe fur un plan solide à telle inclinaifon que ce soit; nous remettons à en examiner la cause en parlant du mouvement réfléchi dans la fection suivante : il nous suffira pour le présent d'avoir fait connoître qu'il y a telle obliquité d'incidence où la furface de l'eau se comporte à l'égard d'une balle de plomb, ou de tout autre corps dur, comme un plan solide & impénétrable.

APPLICATIONS.

L'expérience que nous venons d'expliquer, doit servir de régle à

rection.

286 LEÇONS DE PHYSIQUE ceux qui tirent dans l'eau. S'ils ne tirent pas de fort près ou d'un lieu élevé, la direction du coup peut devenir trop oblique, & le plomb pourroit bien ne pas entrer dans l'eau. Telle personne qui se croiroit en sûreté sur le rivage opposé, courroit rique d'être blessée: & c'est toujours une précaution fort sage, de ne se point rencontrer dans le plan de la réflexion. Dans un combat naval, combien de boulets de canon voiton se relever ainsi, après avoir touché la mer, & faire par un mouvement réfléchi ce qui sembleroit devoir manquer par leur premiére di-

Mais sans aller chercher des exemples si terribles, un jeu d'enfans que tout le monde connoît sur le nom de ricochets, nous montre la même chose avec moins de danger. Une pierre un peu tranchante par les bords, plus épaisse du milieu, & lancée fort obliquement à la surface de l'eau, se reléve du point de contact par les raisons que nous avons rapportées; & si elle a reçu une quantité suffisante de mouvement, lors-

EXPÉRIMENTALE. 287 que son propre poids la détermine de nouveau dans une incidence oblique, IV. il donne occasion à une nouvelle Leçonréflection qui se réstère souvent 5 ou 6 fois de suite.

Des expériences que j'ai répétées avec soin, mais que je n'ai point encore eû occasion de faire assez en grand, pour voir jusqu'à quel point la pratique s'approche de la théorie, m'ont déja fait voir que la surface de l'eau ne commence point à réfléchir sous le même angle, ou à pareille obliquité d'incidence, toutes fortes de corps indifféremment. J'ai remarqué qu'une balle de 6 lignes de diamétre entroit dans l'eau, quand sa direction faisoit un angle de 6 dégrés avec la surface, tandis qu'une plus grosse, à pareille incidence, étoit réfléchie: & je ne doute pas qu'un boulet de canon ne le foit fous un angle beaucoup plus ouvert, & que cela ne varie autant que le diamétre des boulets. Car la résistance de l'eau est d'autant plus grande, que les parties choquées sont en plus grand nombre; quand un mobile sphérique tombe sur sa surface, & vient à la tou288 LECONS DE PHYSIQUE


LEÇON.


cher avec un mouvement considéra ble, on ne doit point croire que ce foit par un seul point, c'est toujours par un segment, & ce segment éprouve d'autant plus de résistance, qu'il fait partie d'une sphère plus grande; parce qu'ayant plus d'étendue avec moins de convexité, il heurte plus directement, & un plus grand nombre de parties d'eau.

En général on peut dire que la déviation occasionnée par la rencontre du nouveau milieu, dépend de la réliftance plus ou moins grande qu'il oppose à une partie de l'hémisphère antérieur du boulet : or pour évaluer cette résistance, il faut avoir égard à la densité du milieu réfringent, à la grandeur du mobile, à la vîtesse, & à l'obliquité de son incidence.

Après avoir examiné les changemens qui arrivent à la direction d'un mobile, quand il rencontre un obstacle qu'il peut pénétrer, ou dans lequel il peut continuer son mouvement ; voyons maintenant ce qui arrive à ce même mobile, quand l'obftacle est un corps solide qui lui resuse le passage.

II.





II. SECTION.

Du Mouvement réfléchi.

Nous avons supposé dans la Section précédente, que ce qui tendoit à changer la direction du mobile, étoit une matiére qu'il pouvoit pénétrer, & dans laquelle il avoit la liberté de continuer fon mouvement d'une maniére assez considérable, pour donner lieu d'appercevoir s'il obéissoit à une nouvelle détermination. Maintenant nous supposons un obstacle invincible, une masse inébranlable qu'il ne puisse déplacer, ni entr'ouvrir, pour passer outre. Je dis, pour paffer outre: car comme il n'y a point de matiére parfaitement dure, & dont les parties ne cédent à une force suffisante; lorsqu'un corps en choque un autre, quand bien même ce dernier ne pourroit être déplacé à cause de sa grandeur, il se fait toujours un enfoncement à l'endroit du contact ; & si cet enfoncement est tel que le mobile s'introduise dans la masse, Tome I. Bb

comme lorsqu'un boulet de canon s'enterre, ou qu'on tire une balle de mousquet dans du sable, ou dans de la neige accumulée; alors l'obstacle ensoncé devient un nouveau milieu, & s'il y a réfraction, elle se fait selon les loix que nous avons établies cidessus.

L'obstacle, ou le corps choqué, étant donc tel qu'on le suppose, inébranlable quant à sa masse totale, mais slexible quant à ses parties, il est question de sçavoir comment le mobile sera dirigé après le choc.

Mais avant que de répondre à cette demande, il est à propos d'examiner si le corps qui choque, continuera de se mouvoir; car s'il devoit rester sans mouvement, en vain chercheroit-on quelle doit être sa direction, & il y a bien des cas où l'obstacle le réduit au repos, sans lui rien

Pour fixer nos idées, représentonsnous une bille d'acier lancée contre une muraille; & pour plus de simplicité, regardons le corps choquant comme parfaitement dur, & ne considérons que la flexibilité du corps choqué. Au premier instant du contact la bille exerce, contre un trèspetit espace de la pierre qu'elle rencontre, un effort qui est comme sa masse & sa vîtesse actuelle. Ce petit nombre de parties ainsi comprimées par l'acier, cédent à son mouvement, reculent sur les parties les plus pro-

chaines, & celles-ci fur d'autres; la pierre se condense en cet endroit, &

Expérimentale. 291

IV. Leçon.

il se fait un petit ensoncement; mais cet effet ne se produit pas avec une vîtesse égale à celle qu'avoit le mobile au moment qu'il a commencé à toucher; car ce qui a été déplacé, a résisté, & toute résistance (quoique vaincue) détruit une partie de la force qui la fait céder: ainsi à la fin du premier instant la bille d'acier se trouve retardée, & son effort au commencement du second instant est moindre qu'il n'étoit d'abord.

Mais comme les parties choquées pendant le premier instant, ont cédé en arrière, leur introcession, ou enfoncement, a donné lieu à la bille d'acier de toucher la pierre par une plus grande surface. Le mobile perdra donc plus de sa vîtesse pendant le se-

Bbij

IV.

292 LEÇONS DE PHYSIQUE

cond instant que pendant le premier:

1°. parce qu'il aura plus de parties à repousser; 2°. parce que celles du milieu qui ont été enfoncées précédemment, résistent davantage qu'elles n'ont pû faire pendant le premier instant; car alors la matière choquée étoit moins condensée, & le corps choquant avoit plus de mouvement.

On voit par l'examen de ces deux premiers instans, que la bille d'acier en formant un enfoncement dans la pierre, doit diminuer de vîtesse, par des quantités qui vont toujours en augmentant, puisque les parties qui reçoivent son effort, se multiplient à chaque instant, & que se trouvant de plus en plus appuyées par celles de derrière, leur résistance commune croît pour le moins en raison de ces deux causes.

La vîtesse du mobile a beau être retardée uniformément, ou non, cette diminution ne doit point empêcher qu'il ne persévère dans sa première direction, tant qu'il lui reste du mouvement : ainsi l'enfoncement qui se fait dans la pierre, n'est achevé que quand la bille cesse de se mou-

i d a

IV. LECON.

EXPÉRÎMENTALE. 293 voir; & réciproquement on peut conclure qu'elle est réduite au repos, quand les parties de la pierre ne cédent plus: de sorte que s'il ne se trouve alors quelque nouvelle cause pour rétablir le mouvement dans la bille. comme elle a consumé entiérement celui qu'elle avoit reçu dans sa premiére détermination, on ne voit pas qu'elle puisse se mouvoir davantage, & en effet l'expérience fait voir qu'elle ne se meut plus; car, si l'endroit de la muraille qui est exposé au choc est de la pierre tendre, ou du plâtre, la bille demeure dans le trou qu'elle a fait, ou bien elle retombe par son propre poids, si rien ne l'arrête.

Il n'en est pas de même si le mobile rencontre pour obstacle une pierre dure, on le voit rejaillir après le choc, & dans un sens différent de sa premiére direction : ce mouvement se nomme réfléchi. Voyons donc quelle en est la cause, & quelles sont les loix

qui le dirigent.

Dans la pierre, comme dans le plâtre, il se fait pendant le choc un enfoncement qui ne diffère que du plus au moins. Mais quand l'obstacle est

Bbin

élastique, que les parties enfoncées ont la vertu de se rétablir dans le lieu & dans l'ordre où elles étoient avant leur déplacement, il est aisé de voir pourquoi le corps choquant recommence à se mouvoir, & ce qui le détermine dans une direction dissérente de celle qu'il avoit d'abord : car ces parties enfoncées en se rétablissant, repoussent le mobile devant elles, & tendent à le diriger comme elles le sont elles-mêmes.

Mais tous les corps élastiques ne le sont pas également, & l'on peut dire qu'on n'en connoît aucun qui le soit parfaitement: nous le suppoferons cependant pour rendre notre théorie plus simple, & nous considérerons d'abord le choc direct, c'est-à-dire, celui d'un mobile dirigé perpendiculairement à la surface de l'obstacle.

En supposant que l'obstacle DE, Fig. 8. est un corps dont l'élassicité est parfaite, le point de contact A, porté en B, par l'effort du mobile C, doit revenir de B en A, avec une vîtesse égale à celle avec laquelle il avoit été déplacé. Le corps C, qu'il

Expérimentale.

chasse devant lui, parcourt en même = tems le même chemin; & lorsque par cette réaction il est redevenu tangent à la surface DE, il se trouve qu'il a pour aller d'A en F, le même dégré de mouvement qu'il avoit lorsqu'en arrivant d'F en A, il a commencé l'enfoncement d B e. Ainsi l'obstacle dont le ressort seroit parfait, rendroit au mobile, par une réaction complette, tout le mouvement qu'il lui auroit fait perdre dans le tems de la compression. Il s'agit maintenant de régler la direction de ce mouvement réfléchi.

IV.

LEÇON.

En expliquant la réfraction, * nous * Pag: 268; avons fait voir que quand le mobile Fig. 3. M tombe perpendiculairement sur le milieu réfringent, il ne quitte point la ligne de sa premiere direction, & qu'après comme avant l'immersion, il tend au même terme; parce que toutes les parties de son hémisphère antérieur sont également soutenues par la résistance du fluide, & qu'il n'y a aucune cause qui favorise ou qui rallentisse fon mouvement plus d'un côté que de l'autre. Par une raifon femblable, fi la furface DE, Fig. 8. Bhiv

296 LEÇONS DE PHYSIQUE est folide & parfaitement élastique, le mobile qui vient d'F en A, après avoir formé l'enfoncement dBe, sera renvoyé dans la même ligne exactement & vers le point F, parce que les parties correspondantes G, H, obéissent à des réactions parfaitement semblables, dont l'équilibre entretient nécessairement le centre C dans une ligne qui a pour termes A, F.

* Pag. 2750 Fig. 50 Nous avons encore prouvé * que dans le cas de l'immersion oblique, le mobile abandonne sa première direction, & nous en avons fait voir la cause dans l'inégalité des résistances qui agissent sur les points P, R, O, Q, N, pendant que cet hémisphère se plonge dans le milieu résringent. Nous avons remarqué aussi que cette déviation du mobile étant causée par des retardemens qui vont toujours en augmentant, jusqu'à ce qu'il soit plongé, le centre M suit une petite courbe MV.

La même chose arrive, & par des raisons semblables, lorsqu'un corps sphérique tombe obliquement sur un plan solide & à ressort. Fig. 9. Les parties ensoncées sont autant de petits

ressorts qui ont été tendus par l'effort = du mobile, & qui rallentissent sa vîtesse de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin il ait consumé tout le mouvement qu'il avoit lorsqu'il a commencé à toucher la surface du plan en I. De-là vient la petite courbe i l, que décrit le centre du mobile; & il est évident que si ce plan enfoncé sinifoit au point L, la bille s'échapperoit par la ligne LM; & son centre par conséquent suivroit la paralléle lm.

Mais comme pendant l'enfoncement elle touche le plan par une furface, & non par un point; & que tous les ressorts qu'elle a tendus se déploient fuccessivement, & selon l'ordre dans lequel ils ont été comprimés, il s'ensuit ce double effet : 1°. Elle reprend son premier dégré de mouvement; parce qu'elle est repoussée avec autant de force qu'elle a comprimé. 2°. Elle remonte par une courbe MP, Fig. 10. semblable à celle qu'elle a suivie en faisant son enfoncement; parce que les ressorts qu'elle a tendus, se débandent contre sa partie postérieure, & lui donnent une vîtesse qui s'accélère depuis IV. Leçon

298 LECONS DE PHYSIQUE M jusqu'en P, de même que celle qu'elle avoit d'abord a été retardée LECON. depuis I jusqu'en M. Ainsi comme l'extrémité I de la ligne de son incidence a été le commencement de la premiére courbe, celle de la réflection P Q est la continuation de la seconde, & de cette manière l'angle RMQ devient égal à SMT. L'égalité des angles d'incidence & de réflection se démontre d'une manière plus géométrique, en supposant un principe que nous prouverons ci-après, en parlant du mouve-

ment composé, sçavoir, que le mobile qui parcourt la ligne TM se comporte comme s'il obéissoit à deux puissances; dont une lui auroit donné la vîtesse nécessaire pour parcourir la ligne TV, pendant que l'autre le feroit descendre de la hauteur TS. Si, lorsqu'il est parvenu en M, une cause quelconque anéantit son mouvement de haut en bas, sans rien diminuer de celui qui le transporte horizontalement; il est évident que dans un tems semblable à celui qu'il a employé pour venir de T en M, il ira d'M en R, n'étant plus commandé

Expérimentale. 299

que par une seule puissance. Mais au lieu de cette supposition, si lorsque le mobile est en M, la puissance qui le commandoit de haut en bas, se trouve tout d'un coup convertie en une autre d'égale force, mais qui le sollicite à se mouvoir de bas en haut; il remontera sans doute par MQ, avec le même dégré de vîtesse qu'il avoit en descendant par TM. Or nous avons vû précédemment comment de ces deux mouvemens dont l'incidence oblique est composée, celui qui est perpendiculaire au plan s'anéantit dans le mobile, & se change, à pareil dégré, en un autre qui est opposé dans la même ligne.

Jusqu'ici nous avons supposé le mobile inflexible, & nous n'avons considéré que le ressort du plan qui résléchit; mais il est aisé de concevoir que les mêmes essets auroient lieu, si le plan étoit parfaitement dur, & que la bille sût un corps à ressort; car dans le choc elle s'applatiroit, & les parties ensoncées en se rétablissant, s'appuieroient sur le plan, & repousserient le mobile avec la même vîtesse avec laquelle elles auroient


IV. Leçono goo Leçons de Physique été comprimées, & dans un fens IV. contraire.


Leçon.

A la vérité, ni l'une ni l'autre de ces deux suppositions ne représentent la nature; car si l'on ne connoît pas de corps dont le ressort soit parfait, on ne voit pas non plus de corps solides qui en soient entiérement privés. Ainsi toutes les sois qu'il y a réslection, l'on peut dire que le mobile & l'obstacle y ont tous deux parts, selon leur dégré d'élasticité.

Il peut même arriver qu'un troifiéme pressé entre l'un & l'autre dans le tems du choc, entre pour quelque chose dans le mouvement résiéchi, en faisant l'office d'un ressort qui se débande d'une part contre le plan, & de l'autre contre le mobile; & alors, soit que l'incidence soit directe, soit qu'elle soit oblique, on doit encore en attendre tout ce qui a été énoncé cidessus, lorsque nous n'avons supposé du ressort que dans l'obstacle ou corps choqué.

Il paroît donc que les choses les plus importantes à sçavoir touchant le mouvement réfléchi, peuvent se





EXPÉRIMENTALE. 301 réduire à ces deux chefs: 1°. Que le ressort est la cause nécessaire de la réslection; 2°. Que la direction du mouvement résléchiest telle que l'angle de réslection est égal à celui de l'incidence du mobile, lorsque la réaction est parsaite.

IV. Leçone

Quoique ces deux propositions ne puissent se prouver par des expériences rigoureusement exactes, parce que nous ne connoissons aucun corps solide qui ait un ressort parsait, ou qui n'en ait pas du tout, & que d'ailleurs la pesanteur du mobile & la résistance de l'air détruisent une partie des essets; cependant on peut faire sentir ce qui doit être, en faisant voir par des à-peu-près ce qui est. Nous aurons soin de remarquer ce qui se mêlera d'étranger dans les faits, & le restant nous représentera suffisamment ce que nous venons d'enseigner.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION

La machine qui est représentée par la Fig. 11, doit être placée de maniés

302 LEÇONS DE PHYSIQUE = re que sa base soit dans un plan horizontal; AB est une cuvette qui a environ un pouce de profondeur; on la remplit de terre-glaife que l'on a mêlée avec du fable fin, en telle quantité qu'elle soit très-flexible, sans être cependant trop visqueuse. Cette cuvette se peut mouvoir sur un pivot qui est au point A, & elle s'arrête à tel dégré d'inclinaison que l'on veut, par le moyen d'une agraffe & d'une vis qui est en B. C est un petit canon de cuivre fixé à un coulant à resfort, qui glisse dans une rainure à jour pratiquée au bras de la potence, & par lequel on fait passer une balle de plomb calibrée. Toute nob imp so

EFFETS.

Quand on laisse tomber la balle de plomb par le petit canon C, soit qu'elle arrive perpendiculairement à la surface de la cuvette, soit que cette cuvette se présente obliquement à sa chûte, il se fait un ensoncement dans la terre molle, & la balle y perd tout son mouvement.

EXPLICATIONS

IV.

Quand la balle en tombant a commencé à toucher la terre molle, elle avoit une certaine quantité de mouvement; c'est aux dépens de ce mouvement, qu'elle a déplacé une portion de la matière siexible. Elle a donc dû cesser de se mouvoir quand les parties qu'elle a rencontrées en repos dans sa direction, ont été portées aussi loin que l'exigeoit la valeur de son effort; & elle n'a pas dû cesser plutôt, parce qu'un corps en mouvement ne peut être réduit au repos, que par un obstacle dont la résistance égale le produit de sa force.

Que la balle tombe perpendiculais rement fur un plan incliné à l'horizon, comme dans l'une des deux expériences précédentes, ou bien qu'elle vienne par une ligne oblique contre un plan horizontal, comme le représente la Fig. 12; c'est absolument la même chose, quant à l'effet qui doit s'ensuivre; & si le plan est flexible & sans ressort, comme nous le supposons, le mouvement de la balle doit s'y consumer entières

concevoir

IV. Lecon.

ment, aussi-bien que dans le cas précédent; car la direction oblique ne change rien à ce que nous avons dit pour la chûte perpendiculaire; elle ne pourroit tout au plus qu'occasionner une petite réfraction que nous négligeons, parce que nous supposons l'enfoncement peu considérable; mais elle n'a rien par elle-même qui puisse remettre le mobile au-dessus du plan qu'il a une sois touché.

APPLICATIONS.

Les corps fans ressort, ou dont l'élasticité est très-foible, sont plus propres que d'autres à rompre les efforts violens, parce qu'ils retardent par dégrés la vîtesse du mobile, & qu'ils le réduisent au repos en cédant de plus en moins. Pour bien entendre ceci, il faut faire attention qu'il n'y a nul mouvement, si prompt qu'il puisse être, qui n'emploie un tems fini; ainsi quand le corps M, Fig. 13. descend par la ligne DE, pour faire la place de son hémisphère dans la terre molle, quoiqu'à nos sens cet effet paroisse se passer dans un instant indivisible, il faut pourtant concevoir EXPÉRIMENTALE. 305 concevoir le tems de cet enfonce-se ment comme partagé en plusieurs instans égaux, pendant lesquels le mobile déploie sa force contre les parties qui cédent. Mais cette force diminue à chaque instant, & elle diminue par des quantités qui croisfent beaucoup plus que les tems; car au second instant les résistances sont en plus grand nombre que dans le premier, puisque l'hémisphère plus

enfoncé présente une plus grande surface à la terre molle qu'il faut repousser; & les parties déja comprimées s'opposent davantage à leur deplacement. On peut donc considérer les 3 espaces D, F, E, comme les produits de trois instans égaux, pendant lesquels le corps M a consumé toute sa vîtesse en parcourant la

IV. Leçon.

ligne DE.

Tous les obstacles qui cédent ainsi, partagent l'effort du mobile, & arrêtent comme en plusieurs fois une puissance qui ne manqueroit pas de les forcer, si toute son action étoit réunie dans un tems plus court. Un tambour résisteroit-il à un seul coup qui égaleroit en force la somme des

CG

Tome I.

206 Leçons de Physique ecoups de baguettes qu'il reçoit en une heure? Une planche de chêne arrête-t-elle une balle de mousquet qu'un fac rempli de laine ne manque point d'amortir?

C'est par une semblable raison qu'on n'est point blessé par la chûte d'un corps dur qu'on reçoit dans sa main, pourvû que la main céde pendant quelques instans, au lieu de se roidir contre. On risqueroit de rompre la corde, quand on arrête un bateau que le courant de la riviére emporte, si l'on ne prenoit la précaution de la siler peu à peu pour vaincre l'essort par dégrés.

IV. EXPERIENCE.

PREPARATION.

On se sert pour cette expérience de la même machine qui a servi pour la précédente, & qui est représentée par la Figure 11. Au lieu de la cuvette pleine de terre molle, on y place une tablette de marbre noir bien polie, & enduite d'une très-légère couche d'huile; & la balle qu'on fait tomber par le petit canon de cuivre, est d'ivoire.

Ouand on laisse tomber la balle d'ivoire perpendiculairement sur le marbre, après avoir touché le plan, elle remonte par la même ligne qu'elle a suivie en tombant, mais moins haut que le lieu d'où elle est descendue, & l'on remarque sur la tablette une tache ronde qui a environ une ligne de diamétre.

EXPLICATIONS.

Ce que l'on a dit ci-dessus en établiffant la question du mouvement réfléchi, suffit pour expliquer le fait que nous venons de rapporter; la tache qu'on trouve sur le marbre, prouve bien que dans le choc il y a eu compression de parties dans l'un des deux corps, & vraisemblablement dans tous les deux, comme on l'a fait voir en parlant du ressort: * & * Pag. 127. comme après l'expérience on retrouve les surfaces dans le même état où elles étoient avant le contact, il est indubitable qu'elles se sont rétablies, & nous avons fait voir que ce rétablissement, s'il étoit parfait, se-Ccij

roit suffisant pour rendre au mobile dans un sens contraire, tout le mouvement qu'il avoit consumé en suivant sa première direction. Si cet effet n'a pas lieu, c'est que la résistance de l'air s'y oppose d'une part, & qu'on a raison de croire que l'ivoire & le marbre ne se rétablissent pas avec la même vîtesse avec laquelle on peut les comprimer.

APPLICATIONS.

Un corps à ressort que l'on a comprimé, & qui a la liberté de se remettre, ne revient à son premier état qu'après un certain nombre de balancemens, qu'on nomme vibrations, & qu'il est facile d'appercevoir dans une lame d'acier, dans une corde de clavessin, dans une branche d'arbre, &c. que l'on a pliée & qu'on abandonne à elle-même. Ce mouvement qui raméne le corps élastique au-delà dulieu de son repos, vient de ce que la partie comprimée en se rétablissant reprend le même dégré de vîtesse qu'elle a reçu au premier instant du choc, & dans un sens contraire, comme nous l'avons expliqué page

EXPÉRIMENTALE. 309 294. Prenons pour exemple une corde de viole ou de clavessin, Fig. 14. tendue entre deux points fixes G, H, & contre laquelle on fait heurter un corps solide avec une quantité de mouvement suffisante pour la mener du point I au point K. Cette percussion allonge la corde; car il est évident que la somme des deux longueurs GK & HK, est plus grande que GH. Si elle est libre de se remettre, son ressort raménera le point K en I, & alors elle aura dans la direction IL une vîtesse égale à celle que lui avoit fait prendre la percussion pour aller en K. Cette vîtesse doit avoir son effet; elle doit transporter le point I vers L, jusqu'à ce que des rélistances suffisantes l'ayent fait cesser. Mais si le milieu de la corde se meut ainsi, les parties qui la compofent de part & d'autre doivent s'allonger, & leur résistance affoiblira de plus en plus ce mouvement; il finira enfin, quand toute la vîtesse de la réaction fera confumée, & l'on

voit que si la corde en revenant de K en I, se trouve avoir le même dégré de vîtesse qu'elle avoit reçu par le

IV. Leçon

310 LECONS DE PHYSIQUE choc pour descendre en K, la ligne IL doit devenir égale à IK. Si les ressorts étoient parfaits, & que leurs vibrations se fissent dans un milieu non résistant, ces sortes de mouvemens seroient perpétuels. Car lorsque la corde, en vertu de sa réaction, est parvenue en L, elle a le même dégré de tension qu'elle avoit, lorsqu'elle étoit comprimée au point K; & par conséquent elle auroit la force nécessaire pour y retourner à la seconde vibration. On en pourroit dire autant de la troisième, & d'une infinité d'autres; mais la réaction n'étant jamais complette par les raisons que nous avons dites, la seconde vibration a moins d'étendue que la première, & la troisiéme moins encore que la feconde, & ces diminutions enfin laissent reprendre à la corde son premier état. Ob omab & med ob

J'ai pris une corde pour exemple, afin de rendre cette explication plus fensible; mais on doit concevoir que la même chose arrive à tous les corps élastiques, à la différence près du plus au moins, selon la figure & la roideur de leurs parties. Ainsi la peau

EXPÉRIMENTALE. d'un tambour devient alternativement concave & convexe; & la bille d'ivoire qui est tombée sur un marbre, ne reprend sa figure sphérique, qu'après avoir été quelque tems un ellipsoide, dont le grand diamétre est de deux fois une, horizontal & vertical. Fig. 15.

C'est une chose remarquable, que le même ressort fait toutes ses vibrations isochrones, c'est-à-dire, dans des tems égaux, foit qu'elles foient petites ou grandes: & l'on a occasion d'en voir la preuve, lorsqu'on met en jeu la machine, * avec laquelle nous . He. Leçons avons mesuré les frottemens. Car en Fig. 9. comparant les vibrations du ressort spiral avec les oscillations d'un pendule à secondes, on remarquera trèsfacilement que la premiére & la trentième se font dans des tems sensible-

Il faut remarquer encore que les ressorts tendus se rétablissent avec d'autant plus de vîtesse, qu'il a fallu plus de force pour les tendre; ainsi quand deux lames seroient également élastiques, si l'une des deux est moins flexible que l'autre, elle fera des vi-

ment égaux.

IV. LECON

brations qui auront moins d'étendue, mais qui seront plus fréquentes, comme nous le ferons voir en parlant des fons.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

On emploie pour cette expérience la machine qui a fervi dans la précédente, Figure 11. mais au lieu de laiffer la tablette de marbre dans fa fituation horizontale, on l'incline comme la ligne AD, & l'on avance le petit canon C dans fa coulisse, de façon qu'il réponde directement au point E.

EFFETS.

Si la balle d'ivoire tombe fur la tablette de marbre par la ligne NE, elle va par EF se loger dans une ouverture pratiquée à la pièce G, & dont la largeur est égale à son diamétre; & l'on peut remarquer à la surface du marbre une tache qui n'est point parsaitement ronde, comme dans l'expérience précédente, mais un peu oblongue, & située de manière que son grand diamètre se trouve dans le plan de réslection.

EXPLICATIONS.

EXPLICATIONS.

IV. LEÇON.

Nous avons suffisamment expliqué les causes du mouvement réfléchi; & l'expérience fait voir que l'angle de réflection A E F, est presqu'égal à celui d'incidence H E D. Je dois donc moins m'arrêter à établir l'égalité de ces angles, qu'à faire connoître pourquoi celui de réflection n'est pas rigoureusement semblable à l'autre dans le fait. Trois causes concourent à le rendre plus petit: 1°. La balle qui choque, & le plan qui la renvoie, n'ont point un ressort parfait; la réaction n'est donc pas complette. 2°. L'air qu'il faut diviser pour passer d'E en F, retarde un peu la vîtesse du mobile; il est donc plus long-tems en chemin qu'il n'y devroit être, & ce retardement donne lieu au progrès d'une troisiéme cause. Car 3°. la pesanteur agit sur la boule d'ivoire, tant qu'elle parcourt EF, & la rappelle de haut en bas. C'est pourquoi au lieu de décrire une droite rigoureuse, elle parvient en G par une courbe dont l'extrémité est un

Tome I.

peu plus bas que la direction de fon mouvement réfléchi.


IV. Leçon.


Mais si l'égalité des angles n'a jamais lieu dans l'état naturel, n'entrevoit-on pas à travers ces obstacles, qu'elle n'est pas moins une régle établie dans la nature, & fondée sur des loix généralement reconnues?

La petite tache oblongue que l'on voit sur le marbre après le contact, est une preuve que la boule qui choque obliquement un obstacle, s'y enfonce par une ligne courbe, comme nous l'avons dit à la page 296, & qu'elle sort de cet ensoncement par une pareille ligne; ainsi le grand diamétre de la tache oblongue est représenté par la ligne p i. Fig. 10.

APPLICATIONS.

Le jeu de billard, & celui de la paume, sont presqu'entiérement son-dés sur la régle que nous venons d'établir & de prouver: dans l'un c'est un mobile sphérique, que l'on pousse le plus souvent contre un plan, suivant une direction oblique ou perpendiculaire; dans l'autre, c'est le plan même qu'on présente au mobi-





Expérimentale. 315 le, fous différens dégrés d'inclinaifon; & la principale chofe confiste à bien estimer le mouvement réstéchi,

par l'angle d'incidence.

Lorsqu'un boulet de canon tiré horizontalement vient à toucher terre, il rebondit à plusieurs reprises, & l'on remarque sur le terrein des traces beaucoup plus longues que profondes. C'est que le boulet s'enfonce & fe reléve comme la bille de notre expérience, en fuivant deux courbes qui se joignent au dernier dégré de l'enfoncement, où naît la réflection. Et comme sa vîtesse de haut en bas est beaucoup moindre que son mouvement horizontal, il parcourt une très-grande longueur dans le tems qu'il descend à peu de profondeur; & de-là vient la grande différence qu'on remarque dans ces deux dimensions, lorsqu'on examine les traces dont nous parlons.

IV. Leçon.



III. SECTION.

De la Communication du Mouvement dans le Choc des Corps.

Uoique les obstacles solides qui arrêtent ou qui réfléchissent les corps qui se meuvent, n'aient leurs effets qu'en vertu du mouvement qui leur est communiqué par le mobile, & que cette communication se fasse se-Ion les régles que nous avons à établir dans cette section; cependant nous avons cru devoir traiter séparément de cette action des corps, considérée dans les cas où la masse choquée laisse appercevoir des marques de la percussion qu'elle souffre, par un déplacement sensible de tout son volume; c'est-à-dire, qu'après avoir enseigné ce qui arrive à un mobile, tant par rapport à sa vîtesse, que par rapport à sa direction, de la part d'un obstacle inébranlable, ou considéré comme tel, nous allons examiner les changemens dont l'une & l'autre

EXPÉRIMENTALE. 317
(la vîtesse & la direction) sont susceptibles, quand l'obstacle est déplacé ou peut l'être par le choc. Et pour
procéder du plus simple au plus composé, nous considérerons premiérement les effets de la percussion dans
les corps mols, où la réaction n'a pas
lieu, pour passer ensuite au choc des

corps à ressort. Nous supposons toujours, pour rendre notre théorie plus simple & plus facile à saisir; 1°, Que les corps qui se choquent, ont un ressort parfait, ou qu'ils n'en ont point du tout: 2°. Que leur mouvement se fait dans un milieu fans réfistance, & sans frottemens; de sorte que la doctrine que nous allons exposer seroit fausse, si les faits qu'elle annoncera, se trouvoient exactement représentés par l'expérience, puisque les empêchemens dont nous faisons abstraction, entrent nécessairement pour quelque chose dans les résultats. Ainsi nos preuves ne doivent passer pour justes, que quand elles paroîtront faire un peu moins que ce qu'on en aura attendu. Si, par exemple, le corps

A, venant heurter le corps B, Fig.

Ddiij

IV. Leçon.

318 Leçons de Physique

16. faifoit fur lui toute l'impression
qu'il peut faire, en vertu du mouvement qu'il a en partant du point a;
il auroit fait plus, puisqu'il auroit encore vaincu les frottemens, la réssitance du milieu, &c. Il n'exercera
donc sur le corps B, qui est son dernier obstacle, que ce qui lui restera
de force après avoir surmonté les autres; & si l'on ne tient pas compte
de ce qu'il aura perdu pour vaincre
ceux-ci, on ne doit pas s'attendre à
un esse de choc se
fera en b.

Nous ne considérons ici que le choc direct, c'est-à-dire, celui de deux corps dont les centres de gravités se trouvent dans la direction de leurs mouvemens, comme dans la Fig. 16. & pour en rendre l'exécution plus facile, nous ferons toutes nos expériences avec des corps sphériques, que nous suspendrons à des sils fort déliés, Fig. 20. asin de diminuer autant qu'il est possible les frottemens & la résistance de l'air: & comme nous aurons souvent besoin de connoître le dégré de vîtesse de ces petits globes, nous les tiendrons suspendus à des

Experimentale. 319 points fixes, autour desquels ils pourront décrire des arcs de cercles qui seront mesurés par des graduations. Fig. 21. Ce que nous enseignerons dans la fuite touchant la pesanteur, fera connoître comment on peut par la grandeur de ces arcs régler la vîtesse des corps qui les décrivent. C'est un procédé qui a été employé avec succès par plusieurs habiles Physiciens, & fur-tout par M. Mariotte. La machine dont je me sers, & qui est représentée par la Figure 17. n'est autre chose que la sienne, dont j'ai étendu les usages, & que j'ai rendue plus commode.

Avant que deux corps se choquent, il y a entre eux un espace qui doit être parcouru, ou par l'un des deux entièrement, ou en partie par l'un, & en partie par l'autre: autrement il n'y auroit point de choc. Cet espace ne peut être parcouru que dans un certain tems, & la durée de ce tems mesure la vîtesse respective de ces deux corps; c'est-à-dire, la vîtesse avec laquelle la distance diminue, soit que l'un des deux reste en repos; soit qu'ils se meuvent tous

Ddiv

320 LEÇONS DE PHYSIQUE deux dans le même sens, ou en sens contraires, également, plus ou moins vîte l'un que l'autre : de sorte que si deux corps A, B, Fig. 16. distans de 4 pieds, se joignent en une seconde, la vîtesse respective est la même, soit que B seul parcoure l'espace entier, foit qu'il rencontre A venant à lui au deuxiéme ou au troisiéme pied, &c. pourvû que le mouvement qui les approche l'un de l'autre, se passe dans une seconde. Il ne faut donc pas confondre cette vîtesse respective avec la vîtesse absolue, ou propre de chaque mobile; car on voit par cet exemple, que celle-ci peut varier dans des cas où l'autre ne changeroit point.

La vîtesse respective étant donnée, il faut encore considérer les masses; car le corps choqué oppose son inertie au corps choquant, & nous avons vu ailleurs que cette espéce de résistance se mesure par la quantité de matière contenue & liée sous le même volume. Ainsi l'on doit s'attendre que dans le choc une grande masse recevra moins de vîtesse qu'une plus petite; & que pour faire prendre plus de mouvement à un même corps.

EXPÉRIMENTALE. 321
il en faudra donner aussi davantage au
mobile qui doit le communiquer,
parce que l'inertie résiste non-seulement au mouvement, mais aussi à un
plus grand mouvement, comme nous
l'avons prouvé ailleurs.

IV. Leçon.

Quand nous avons parlé du mouvement en général, nous nous sommes abstenus d'examiner la nature de cette espéce d'être, ou de modification, parce que ces fortes de queftions appartiennent plutôt à la Métaphysique, qu'à la Physique expérimentale. Par la même raison nous ne nous arrêterons pas à discuter de quelle manière la vîtesse passe d'un corps à l'autre. Nous nous bornerons aux faits qui peuvent être constatés; & en parcourant les cas les plus généraux, nous établirons par voie d'expérience des propositions qu'on pourra regarder comme des principes ou des loix, aufquelles on pourra rapporter d'autres effets plus détaillés, comme autant de conséquences.



322 LEÇONS DE PHYSIQUE

IV. Leçon. ARTICLE PREMIER.

Du Choc des Corps non Elaftiques.

PREMIERE PROPOSITION.

Quand un corps en repos est choqué par un autre corps, la vîtesse du corps choquant doit se partager entre les deux selon

le rapport des masses.

C'est-à-dire, qu'après le choc, les deux corps continueront de se mouvoir selon la direction du corps choquant; & que la vîtesse de celui-ci ayant été diminuée par la résistance de l'autre, le restant qui sera commun aux deux, doit être d'autant moindre, que le corps choqué aura plus de masse.

Ainsi le corps en repos ayant été choqué par une masse égale à la sienne, la vîtesse après le choc sera réduite à moitié.

Il restera les deux tiers de la vîtesse, si le corps qui choque est double de l'autre.

Si c'est le corps choqué qui est double en masse, la vîtesse après le EXFÉRIMENTALE. 323 choc ne fera que le tiers de ce qu'elle = étoit auparavant : mettons ces trois cas en expérience.

IV. Leçon.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La machine qui est représentée par la Fig. 17. étant disposée de façon que le fil à plomb soit paralléle à la ligne AB; que les deux fils de suspension CD, EF, foutiennent dans une même ligne, & à même hauteur, les centres de deux boules de terre molle, qui pésent chacune 2 onces, & de manière qu'étant en repos leurs furfaces se touchent en un point; que la premiére graduation de chacune des deux régles mobiles G, H, foit vis-à-vis de chacun des fils, & qu'enfin le petit curseur ou index L, foit placé un peu avant la troisiéme graduation de la régle G, & l'autre index M, vis-à-vis la sixième de l'autre régle H.

EFFETS.

La boule F portée en M, & abandonnée à fon propre poids, va frapper l'autre boule D; l'une & l'autre

LEÇON.

324 LECONS DE PHYSIQUE s'applatissent également à l'endroit du contact, & après le choc elles se meuvent toutes deux du même côté, & le fil qui suspend la boule D, va toucher l'index L.

EXPLICATIONS.

Quand la boule F est tombée par un arc de six dégrés, si elle ne trouvoit point d'obstacles, elle remonteroit dans la partie opposée, par un arc semblable. C'est une chose dont on peut s'assurer en ôtant de fon chemin la boule D, & nous en dirons la raison en expliquant les phénoménes de la pesanteur. Ainsi lorsqu'en venant du point M, elle se trouve en F; fon mouvement alors est tel, qu'il peut élever sa masse de deux onces dans un arc de fix dégrés. Mais une force qui peut transporter une masse de deux onces à six dégrés de distance dans un tems donné, ne peut porter qu'à la moitié de cette distance une masse double en pareil tems. Or quand la boule Frencontre la boule D, qui ne lui permet de passer outre qu'en l'emportant avec elle; c'est une vîtesse de

EXPÉRIMENTALE. 325 6 dégrés appliquée à une masse de 4 = onces, & l'une & l'autre ensemble doivent cesser de se mouvoir, après avoir parcouru seulement trois dégrés, comme l'expérience le fait voir.

IV. Leçon.

Il se fait dans le tems du choc un applatissement aux deux boules, & dans le cas présent cet applatissement est égal de part & d'autre; ces deux faits méritent d'être observés & ex-


pliqués.


Nous avons déja dit que rien ne se faitavec précision, & par saut, dans la nature; & que les effets les plus prompts, & qui paroissent instantanés à nos sens, ne sont jamais produits que dans un tems fini, c'est-àdire, dans un tems dont la durée n'est pas la plus courte qu'on puisse imaginer. Lorsque les deux boules commencent à se toucher, les parties les plus avancées de la boule choquante ont déja perdu une partie de leur vîtesse, pendant que le centre & les parties les plus reculées ont encore toute la leur; ce n'est donc qu'après quelques instans (fort courts à la vérité) que cette masse rallentie

prend une vîtesse également retardée dans toutes ses parties. Mais si les parties d'un corps se meuvent plus vîte les unes que les autres, leur position relative, ou (ce qui est la même chose) la figure du corps doit être changée. L'applatissement de la boule F est donc un esset & une preuve de sa vîtesse retardée successivement en plusieurs tems.

On doit dire la même chose de la boule choquée: elle ne passe pas toute en un même instant de son état de repos à trois dégrés de vîtesse; les parties immédiatement exposées au choc, se meuvent & plutôt & plus vîte que le centre & l'hémisphère qui est audelà; & ces déplacemens successifs occasionnent une introcession de matiére qui change la figure.

Mais ces applatissemens dans l'une & dans l'autre boule, sont causés par l'inertie qui s'oppose au changement d'état de chacune d'elles; & cette inertie est égale à la masse: ainsi dans le choc de deux corps, dont les poids sont égaux & de même matière, les applatissemens doivent aussi se faire également de part & d'autre.





II. EXPERIENCE.

IV. Leçon.

PREPARATION.

On fait la boule D de 4 onces, la boule F de 2 onces: on laisse la première en repos, & l'on donne à l'autre 6 dégrés de vîtesse, le reste étant disposé comme dans l'expérience précédente.

EFFETS.

Après le choc, les deux boules continuant de se toucher parcourent ensemble deux espaces de l'échelle, & l'applatissement de part & d'autre est plus grand que dans le cas précédent.

EXPLICATIONS.

La boule F en descendant de 6 espaces reçoit 6 dégrés de vîtesse, c'est-à-dire, qu'elle peut porter son propre poids l'espace de 6 dégrés vers la partie opposée. Mais ce poids étant augmenté de deux tiers en sus par la rencontre de la boule D, qu'elle emporte avec elle, sa force ne suffit plus que pour un tiers de l'espace qu'elle auroit parcouru si

328 LEÇONS DE PHYSIQUE rien ne s'étoit opposé à son passage.

IV. Leçon.

Quant à l'applatissement, il doit être d'autant plus grand, que le corps choqué a résissé plus long tems à son déplacement; puisque, comme nous l'avons dit, c'est cette résissance qui interrompt l'uniformité de vîtesse dans les parties de chaque boule: or dans le cas présent, la boule D résiste une sois plus que n'auroit sait une boule de deux onces. Il y a donc eu lieu à l'ensoncement d'un plus grand nombre de parties.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

Dans cette expérience on procéde comme dans les deux autres; excepté seulement qu'on donne à la boule D, qui est en repos, deux onces de masse, & quatre onces à la boule F que l'on fait mouvoir avec 6 dégrés de vîtesse.

EFFETS.

Les deux boules unies après le choc parcourent quatre espaces; & les applatissemens sont moins forts que dans les deux cas précédens.

EXPLICATIONS

EXPLICATIONS.

IV. Leçon.

Ce que nous avons dit pour expliquer les deux expériences précédentes, suffit pour rendre raison de celle-ci. Il faut toujours considérer les deux boules après le choc, comme ne faisant qu'une même masse; & l'on doit faire attention aussi, que 6 dégrés de force qui pouvoient porter une masse de 4 onces dans un espace de 6 dégrés, n'en peuvent pas tranfporter une de 6 aussi loin. Si la résistance de 4 onces devoit consumer toute la force après cet espace parcouru, un tiers d'augmentation au poids doit aussi diminuer le tiers de l'espace, & par conséquent au lieu de 6 dégrés qu'auroit parcourus la boule F toute seule & fans obstacle, étant jointe à la boule D qu'elle a mise en mouvement, elle n'en peut plus parcourir que 4.

Mais comme la boule D, qui ne pése que deux onces, a moins résisté que lorsqu'elle en pesoit quatre ou trois, elle a moins donné lieu à l'enfoncement de ses parties, & réciproquement elle a moins retardé les par-

Tome I.

Ee

330 LEÇONS DE PHYSIQUE ties antérieures de la boule F. Car on conçoit aifément que si elle prenoit tout d'un coup, & dans un inftant indivisible, toute la vîtesse qui lui doit être communiquée, il n'y auroit aucun applatissement de part ni d'autre, puisqu'elle suiroit devant la boule F dès l'instant du contact, avec une vîtesse égale à celle du corps choquant, ce qui la feroit échapper à son action.

APPLICATIONS.

Puisque dans le choc où l'un des deux corps est en repos, la vîtesse du corps choquant diminue à proportion de la masse du corps choqué, on doit en tirer cette conséquence, que le mouvement doit être insenfible après le choc, si celui qui est en repos, est infiniment plus grand que celui qui vient le frapper; & c'est par cette raison, sans doute, qu'un boulet de canon paroît avoir perdu tout fon mouvement, quand on l'a tiré contre un rempart ou contre une groffe tour; car la vîtesse qui lui reste après le coup est à celle qu'il a communiquée, comme fa masse est à celExpérimentale. 331 le de l'obstacle qu'il a frappé, c'està-dire, comme une quantité infiniment petite à une quantité infiniment

grande.

C'est aussi en conséquence de ce principe, que l'on dit, que la plus grosse masse est toujours déplacée, (quoiqu'infiniment peu) par la percussion du plus petit corps. Mais je ne vois pas qu'on foit obligé d'admettre cette proposition comme une fuite nécessaire de la loi que nous venons d'établir, à moins qu'on ne suppose le corps choqué absolument inflexible; autrement, s'il est aussi grand qu'on peut l'imaginer, fa réfistance fera affez durable pour confumer toute la vîtesse sensible du mobile par l'introcession des parties occasionnée par le choc. and in institut

Les expériences que nous venons de rapporter, nous apprennent aussi pourquoi en général tous les corps se rompent, ou perdent plutôt leur figure en heurtant contre des obstacles inébranlables, que lorsqu'ils en rencontrent de mobiles. Une chaloupe se brise contre un rocher, & elle ne périt point par le choc d'une au-

Eeij

IV. Legon. 332 LEÇONS DE PHYSIQUE

IV. Leçon.

tre chaloupe qu'elle rencontree n'repos. C'est que le rocher ne cédant que peu ou point au mouvement de la chaloupe, les parties de celle-ci qui commencent le choc, ont déja perdu toute leur vîtesse, pendant que les autres ont encore toute la leur. Il se fait donc un changement de figure, les piéces sont contraintes & se rompent, si le choc est assez violent; au lieu que si le bateau rencontre un corps flottant qui obéisse à son impulsion, les parties exposées au choc ne sont point entiérement arrêtées, & les autres sont peu-à-peu retardées comme elles.

Les ouvriers qui travaillent du marteau disent, que le coup porte à faux, quand la matière qu'ils travaillent lui échappe, soit parce qu'elle n'est pas suffisamment soutenue, soit parce que l'instrument est mal dirigé: & le forgeron se plaint avec raison d'une enclume trop légère, ou qui est placée sur un plancher peu solide; car alors le fer qu'il travaille, cédant avec son point d'appui, le coup n'a point tout son effet, comme il l'auroit si l'enclume

EXPÉRIMENTALE. 333 plus ferme tenoit dans un parfait : repos le côté du fer qui la touche, pendant que le marteau frappe fur Leçon, l'autre

Le jeu du mail a tant de rapport à notre premiére proposition sur le choc des corps, & aux expériences que nous avons employées pour la prouver, qu'il est presqu'inutile d'en faire ici l'application. Pour peu qu'on y fasse attention, on verra bien-tôt fur quoi sont fondées les proportions qu'il faut mettre entre la masse du mail & la boule; comment l'un au moyen d'un long manche, reçoit du joueur une très-grande vîtesse; pourquoi, & dans quel rapport, une partie de cette vîtesse est communiquée à l'autre, &c.

II. PROPOSITION.

Quand deux corps qui se meuvent du même sens avec des vîtesses inégales, viennent à se heurter, soit que leurs masses soient égales, ou non, ils continuent de se mouvoir ensemble & dans leur premiere direction, avec une vîtesse commune, moins grande que celle du corps cho334 LEÇONS DE PHYSIQUE

quant, mais plus grande que celle du corps

IV. choqué, avant la percussion.

IV. Leçon.

Dès qu'on suppose que les deux corps se meuvent dans le même sens, il faut nécessairement que celui qui précéde aille moins vîte que l'autre pour être choqué: car s'ils alloient tous deux avec des vîtesses égales, il est évident qu'ils ne s'approcheroient point, & par conséquent il n'y auroit point de choc. Quand le corps qui a le plus de vîtesse rencontre celui qui en a moins, la lenteur de l'un fait obstacle à l'autre; mais cet obstacle est mobile, & il doit partager l'excès de vîtesse du corps choquant, à raison de sa masse, comme on l'a fait voir ci-dessus. Les expériences qui suivent, feront connoître dans quel rapport la vîtesse est retardée dans l'un & accélérée dans l'autre.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

Il faut faire les boules D & F du poids de 2 onces chacune, & les laiffer tomber en même tems, l'une par EXPÉRIMENTALE. 335 un arc de 3 dégrés, & l'autre par un = arc de 6, pris du même côté.

IV. Leçon.

EFFETS.

Ces deux boules se joignent à l'endroit où leurs fils de suspension se trouvent perpendiculaires à l'horizon: il se fait à l'une & à l'autre un petit applatissement, après quoi elles continuent de se mouvoir ensemble du même côté, & remontent un arc de 4 dégrés ½.

EXPLICATIONS.

La boule F ayant 6 dégrés de vîtesse propre contre 3, s'estapprochée de la boule D avec une vîtesse respective, qui étoit 3 excès de 6 sur 3. Nous dirons ailleurs pourquoi lorsque leur mouvement se fait dans des arcs du même cercle, quoiqu'inégaux, les deux boules se choquent précisément à l'endroit le plus bas de leur chûte.

Quant aux enfoncemens des parties qui se touchent dans le choc, ils doivent être proportionnels à la vîtesse respective, qui est moindre que la vîtesse absolue ou propre de 336 Leçons de Physique
la boule choquante, dans le cas préIV. fent, où la boule choquée qui se meus
Leçon. du même sens, échappe en partie à
son effort.

Enfin les deux boules remontent ensemble un arc de 4 dégrés 1; c'est-à-dire, que leur vîtesse commune comparée à celle de la boule F avant le choc, se trouve diminuée d'un quart; & c'est à quoi l'on devoits'attendre: car le corps choquant avant 6 dégrés de vîtesse, & rencontrant un autre corps d'une masse égale à la sienne qui n'en a que 3, doit en perdre autant qu'il faut qu'il en communique à l'autre pour le mettre en état d'aller aussi vîte que lui : or l'égalité des masses exige qu'il lui en donne 1 & 1, qui est la moitié de 3, différence des deux vîtesses avant le choc: & 1 & 1 ôté de 6 & ajouté à 3, fait qu'il se trouve 4 & dans l'un, & autant dans l'autre.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

Cette expérience se fait comme la première, avec cette différence que

EXPERIMENTALE. que la boule D pése 4 onces, & la boule F, 2 onces: les vîtesses restant dans le rapport de 3 à 6.

LEÇON.

EFFETS.

Après le choc les deux boules continuent de se mouvoir ensemble : les applatissemens sont plus grands que dans l'expérience précédente, & l'arc qu'elles parcourent est de 4 dégrés.

EXPLICATIONS.

Tout ce que nous avons dit pour expliquer la premiére expérience, suffit pour faire entendre celle-ci, il ne s'agit que d'appliquer les mêmes raifons en gardant les proportions. L'excès de vîtesse dans la boule Favant le choc étoit 3', qui a dû diminuer des deux tiers par la résistance de la boule D, dont la masse est double : ainsi après le choc il a dû se trouver 4 dégrés de vîtesse, puisque de 6 qui étoient dans le corps choquant, il ne s'en est perdu que 2, par l'action qui a rendu la vîtesse uniforme dans les deux boules.

Les applatissemens ont été plus Tome I.

grands que dans la premiére expérience; parce que la résistance du corps choqué a été plus forte; c'est ce que l'on reconnoîtra d'abord, si l'on fait attention que la boule D étant de 4 onces, a consumé un tiers de la vîtesse du corps choquant, au lieu qu'étant seulement de 2 onces dans le cas précédent, elle n'en a consumé que le quart.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

On donne à la boule D 2 onces de masse, à la boule F 4 onces, & l'on met les vîtesses dans le rapport de 6 à 3.

EFFETS.

La boule D, après le choc, est emportée par la boule F, de sorte qu'elles parcourent ensemble un arc de 5 graduations; & les applatissemens sont moindres que dans les deux expériences précédentes.

EXPLICATIONS,

La boule F partageant son excès

EXPÉRIMENTALE. de vîtesse qui est 3, avec une masse = qui est moitié moins grande que la sienne, en retient les deux tiers; les deux masses jointes ensemble après le choc, doivent donc représenter 6 dégrés de vîtesse, moins un, que la résistance du corps choqué a retranché, avant que de prendre un mouvement uniforme à celui du corps

Les applatissemens ont été moins grands que dans les cas précédens, parce que la rélistance a été moins forte de la part du corps choqué; car 2 onces de masse résistent moins à 4 onces, que 4 à 2, ou 2 à 2; les vîtesses étant toujours en même rap-

choquant.

port.

APPLICATIONS.

Il est aisé de voir par les expériences de la feconde proposition, qu'après le choc de deux corps, dont l'un va plus vîte que l'autre dans la même direction, les vîtesses propres, pour devenir uniformes, changent, dans l'un de plus en moins, & dans l'autre de moins en plus ; puisque celle du corps D a toujours été augmen-

Ffii

IV. LECON. 340 Leçons de Physique

IV. Leçon,

traire a toujours fouffert quelque ditraire a toujours fouffert quelque diminution. C'est ainsi qu'un bateau qui obéit à l'impulsion des rames, reçoit un accroissement de vîtesse, en retardant celle d'un volume d'air agité, dans la direction duquel on le méne; il va moins vîte que le vent, mais son mouvement est toujours plus prompt que s'il n'alloit qu'à force de bras.

Le vol le plus rapide, la course la plus légére, n'empêche pas que le plomb du chasseur ne frappe la piéce de gibier qui fuit devant lui; mais à égale distance le coup est moins fûr que si l'animal étoit posé, ou qu'il vînt en sens contraire: & l'on scait qu'un liévre, un chevreuil, &c. tiré en flanc, est plus facilement arrêté, que quand il fuit devant le coup. Une des raisons qu'on en peut donner, c'est qu'alors la vîtesse respective du plomb est plus grande, parce que l'animal se meut dans une direction qui ne l'éloigne que peu ou point du chasseur, & qu'à cet égard il est comme fixe. Nous avons vû par les expériences de la premiére proposition

Expérimentale. 341 qu'en pareil cas, le choc est plus grand.

IV. Leçon.

III. PROPOSITION.

Sr les deux corps qui doivent se choquer, se meuvent en sens directement contraires, le mouvement périra dans l'un & dans l'autre, ou au moins dans l'un des deux: s'il en reste après le choc, les deux corps iront du même sens; & la quantité de leur commun mouvement sera égale à l'excès de l'un des deux avant le choc.

C'est-à-dire, que dans le cas où les deux mouvemens seroient égaux avant le choc, les deux mobiles seroient réduits au repos. Et si l'un des deux avant le contact en avoit davantage, il ne resteroit après la percussion que la quantité excédente, qui seroit le mouvement commun des deux corps. Deux expériences mettront ceci en évidence.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La boule D pesant 2 onces, & la boule F autant, on éléve l'une par F f iij un arc de 6 dégrés d'une part, & l'au-IV. tre par un arc femblable du côté op-Leçon. pofé; & on les laisse tomber en même

tems.

EFFETS.

Ces deux corps se rencontrent au lieu le plus bas de leur chûte où ils demeurent en repos; & leurs applatissemens sont plus grands que dans les cas où la boule Fest tombée par un arc semblable contre D en repos, ou qui suyoit devant elle.

EXPLICATIONS.

Dans cette expérience la quantité du mouvement est égale de part & d'autre; car dans l'une & dans l'autre boule avant le choc, on compte 6 dégrés de vîtesse multipliés par 2 onces de masse. Deux corps qui se rencontrent allant en sens contraires, se sont réciproquement résistance; ici de part & d'autre la force ou la puissance est retenue en équilibre par une résistance égale, & cet équilibre fait naître le repos dans les deux mobiles.

Les applatissemens sont plus grands qu'ils n'ont été dans les expériences

EXPERIMENTALE. des deux premiéres propositions; où nous avons toujours donné 6 dégrés de vîtesse au corps choquant; mais il faut faire attention que dans celleci la vîtesse respective d'où dépend la force du choc, est doublée ou plus que doublée. Car lorsque la boule D étoit en repos avant le choc, la vîtesse respective de F n'étoit autre chose que sa vîtesse propre, c'est-àdire, 6; ou moins que 6, lorsque la boule D fuyoit devant elle : ici les deux boules ayant chacune 6 dégrés de vîtesse propre en allant l'une vers l'autre, la vîtesse respective est 12; c'est-à-dire, que l'espace qui les sépare avant le choc, est parcouru en une fois moins de tems.

IV. Leçon.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

On fait mouvoir les deux boules D & F l'une vers l'autre, comme dans l'expérience précédente, & l'on met leurs quantités de mouvement dans le rapport de 12 à 24, en doublant la masse ou la vîtesse de F.

Ffiiij

344 Leçons de Physique

IV. Leçon. EFFETS.

Les deux boules, après le choc, continuent de se mouvoir dans la direction d'Favec 2 dégrés de vîtesse, si l'on a doublé le mouvement par la masse, ou avec 3, si c'est par la vîtesse.

EXPLICATIONS:

Si les 24 dégrés de mouvement de la boule F lui viennent de 4 onces de masse & de 6 dégrés de vîtesse : lorsqu'elle rencontre la boule D venant contre elle avec 12 dégrés de mouvement, produit de 2 onces par 6 de vîtesse, elle oppose sa double masse & la moitié de sa vîtesse pour l'arrêter, & cela suffit; car 3 de vîtesse multipliant 4 de masse, égale tout le mouvement de la boule D qui est 12; il reste donc à la boule F 3 dégrés de vîtesse, avec lesquels elle continue d'agir fur D, qu'on doit considérer comme en repos immédiatement après le contact. Mais elle ne peut mouvoir un corps en repos qu'en lui communiquant de la vîtesse aux dépens de la sienne, & nous EXPÉRIMENTALE.

avons vû que cette communication se fait en raison des masses; comme la boule D n'a que 2 onces de masse, contre 4, la boule F ne perd qu'un tiers de la vîtesse qui lui reste; ainsi la vîtesse commune après le choc est 2 pour deux masses, qui prises ensem-

ble égalent 6 onces.

On voit donc, 1°. que le mouvement qui reste après le choc, est égal à la différence des deux quantités avant le choc; car 12 est l'excès de 24 fur 12: 2°. que cette différence divisée par la somme des masses, donne la vîtesse commune après le choc; car 12 divisé par 6, somme de 2 & de 4 onces, donne 2 de vîtesse, comme l'expérience l'a représenté.

On trouveroit la même chose, si l'on avoit doublé le mouvement de la boule F, en doublant sa vîtesse propre. Car alors pour arrêter la boule D qu'on suppose avoir 12 dégrés de mouvement, & égale en masse, elle perdroit 6 dégrés de vîtesse; & pour l'emporter avec elle, il faudroit qu'elle lui en communiquat encore 3, de 6 qui lui restent. Après le choc, il resteroit donc 3 dégrés de vîtesse

346 Leçons de Physique e commune à 4 onces de masse, somme des deux boules, & par conséquent la quantité de mouvement seroit toujours 12, dissérence de 24 à 12.

APPLICATIONS.

Ces derniéres expériences font connoître en général, pourquoi il faut employer plus de force pour repousser un mobile dans un sens contraire à son mouvement, que pour l'arrêter simplement : car non-seulement il faut employer une force équivalente à la sienne, pour vaincre son premier mouvement; mais il faut encore ajouter toute celle qui est nécessaire, pour lui en faire reprendre un autre. C'est pourquoi l'on fait plus d'effort pour faire rétrograder une boule qui roule fur un plan, que pour la fixer en s'opposant à son passage. Mais nous avons vû en même tems, que l'effort d'un mobile qui vient contre un autre, peut croître, & par la vîtesse, & par la masse. On ne doit donc pas être furpris que les joueurs de paume trouvent quelquefois le battoir ou la raquette trop lé-

EXPERIMENTALE. 347 gere; puisqu'en supposant le coup frappé avec la même vîtesse, son effet IV. doit être moins grand, si la masse avec Leçon. laquelle il est porté, est plus soible.

COROLLAIRE.

Il suit des deux premiéres propositions & des expériences qu'on a employées pour les prouver : 1°. Que quand les mouvemens ne sont point réciproquement opposés, les deux masses réunies après le choc représentent la même quantité de mouvement qui subsistoit dans l'une d'elles, ou dans toutes les deux avant le contact. Prenons la premiére expérience de la premiére proposition pour exemple.

Avant le choc, tout le mouvement résidoit dans la boule F, & sa quantité étoit 12, produit de 6 dégrés de vîtesse par 2 onces de masse. Après le choc, la quantité du mouvement dans les deux boules réunies est encore 12, produit de 4 onces de masse par 3 de vîtesse commune. On peut aisément appliquer ce calcul aux autres expériences, & l'on trouvera toujours la même chose.

348 Leçons de Physique

IV. Leçon. De cette premiére conféquence; il en naît une autre; c'est que si l'on connoît la vîtesse commune après le choc, on peut connoître quelle est la somme des masses; & réciproquement la somme des masses fera connoître la vîtesse commune. Prenons pour exemple la premiére expérience

de la feconde proposition.

La fomme des mouvemens avant le choc, étoit 18, sçavoir 12, produit de 2 onces par 6 de vîtesse; & 6 produit de 2 onces par 3 de vîtesse. Selon la premiére conséquence, après le choc, les deux masses doivent représenter ensemble une quantité de mouvement qui égale 18. Je sçais que la masse totale est 4 onces; je divise 18, quantité du mouvement, par 4, somme des masses, & j'ai 4 ½ pour la vîtesse commune.

De même je sçais que la vîtesse commune est 4 ½; je connois que la somme des masses est 4, en divisant 18

par $4^{\frac{1}{2}}$.

Enfin l'on voit par la troisséme proposition, 1°. que quand les corps se heurtent en sens contraires, il périt une partie du mouvement; 2°. que EXPÉRIMENTALE. 349

Fon peut juger, comme dans les autres cas, par la vîtesse commune après le choc, & par le rapport des masses, quelles ont été les vîtesses propres avant le choc; ou bien, quel est le rapport des masses, par la comparaifon de la vîtesse commune, avec les vîtesses propres.

IV. Leçon.

ARTICLE II.

Du Choc des Corps à ressort.

Dans toutes les expériences qui ont servi de preuves aux propositions énoncées sur le choc des corps non élastiques, nous avons toujours observé deux effets principaux, sçavoir une communication de mouvement du corps choquant au corps choqué, & un changement de figure ou applatissement à l'un & à l'autre à l'endroit du contact. Ces deux effets ont une cause commune, qui est la percussion; c'est par cette action que la vîtesse se transmet, & se distribue uniformément entre les deux maffes: mais pendant que cette répartition se fait entre les deux corps, leurs figures changent, & l'applatif-

fement qui en résulte, dépend particuliérement de la résistance plus ou
moins longue du corps choqué: c'est
pourquoi, quand bien même la vîtesse
respective seroit toujours la même,
la grandeur des applatissemens varieroit toujours, suivant le rapport
des masses qui se choquent, comme
on a pu le remarquer par les expé-

riences précédentes.

Dans le choc des corps à reffort, la nature suit toujours les mêmes loix qu'elle s'est prescrites, & que nous avons reconnues dans la percussion des corps non élastiques: mais comme les parties enfoncées par le choc se rétablissent avec la même vîtesse qu'elles ont été déplacées, ce dernier esse qui se mêle à celui du mouvement communiqué par le choc, apporte beaucoup de changement aux résultats.

Il faudra donc soigneusement distinguer deux sortes de mouvemens dans la percussion des corps élastiques, l'un qui est indépendant du ressort, & que nous nommerons mouvement primitif; l'autre qui naît de la réaction des corps applatis ou com-

EXPÉRIMENTALE. 351
primés dans le choc, & que nous appellerons mouvement de ressort, mouvement réslèchi, ou simplement réaction. Le

IV. Leçon,

PREMIERE PROPOSITION.

Quand un corps à ressort va frapper un autre corps à ressort qui est en repos, ou qui se meut du même sens que lui; ce-lui-ci après le choc se meut dans la direction du corps qui l'a frappé, & avec une vîtesse composée de celle qui lui a été donnée immédiatement, ou par communication, & de celle qu'il acquiert par sa réaction après le choc; & le corps choquant dont le ressort agit en sens contraire, perd en tout ou en partie ce qu'il avoit gardé de sa vîtesse première: & st son mouvement réstéchi excéde le restant de sa vîtesse première, il rétrograde suivant la valeur de cet excès.

Ces expressions générales s'entendront mieux, si nous en faisons des applications. Supposons donc que les masses soient égales; en conséquence de cette première proposition, je dis qu'après le choc, celui des deux corps qui étoit en repos, recevra tant par communication que par sa réaction, une quantité de mou-

352 Leçons de Physique

vement égale à celle qu'avoit l'autre corps avant la percussion; & que ce-lui-ci sera réduit au repos par son reffort, qui détruira le reste de sa vîtesse primitive.

Si l'on suppose les masses inégales, & que le corps choqué soit le plus petit, tous deux après le choc iront dans la direction du corps choquant; mais celui-ci aura moins de vîtesse

que l'autre.

LECON.

Enfin si le corps choqué a plus de masse que l'autre, il ira seul dans la direction du corps choquant, & ce-

lui-ci retournera en arriére.

Réalisons ces trois suppositions par autant d'expériences qui serviront de preuves à notre première proposition, & aux conséquences que nous en tirerons. Nous employons des boules d'ivoire bien rondes, que l'on sufpend à des fils comme celles de terre molle, & avec la même machine.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La boule D en repos, pése 2 onces; EXPÉRIMENTALE. 353
ces; la boule F qui est égale, descend =
par un arc de 6 dégrés.

IV. Leçon.

EFFETS.

Après le choc, la boule F demeure en repos à l'endroit du contact, & la boule D parcourt un arc de 6 dégrés dans la partie opposée; ce qui fait voir que le corps choqué a reçu une vîtesse égale à celle du corps choquant.

EXPLICATIONS

La boule Fayant rencontré la boule D en repos, lui a communiqué la moitié de sa vîtesse, à cause de l'égalité des masses; & elle en a gardé 3' par la même raison, pour continuer de se mouvoir dans la même direction. Tel seroit l'effet total de cette percussion, si les boules n'avoient point de ressort, comme on l'a vû par la premiére expérience de l'article premier. Mais à cause de l'élasticité, la boule D comprimée ou applatie, se rétablit en s'appuyant contre la boule F; ce qui fait que cette réaction la porte en avant, avec autant de vîtesse qu'elle a été compri-

Tome I. Gg

IV. Leçon. 354 LEÇONS DE PHYSIQUE mée. Or cette vîtesse est la moitié de celle qui a fait rencontrer les deux boules, c'est-à-dire, 3 dégrés. Ainsi après le choc la boule D se meut avec 6 dégrés de vîtesse, sçavoir 3 qu'elle a reçus par communication, & 3 qui lui viennent de sa réaction.

La boule F a gardé 3 dégrés de sa vîtesse primitive; mais sa réaction qui est égale se fait en sens contraire, &

la réduit au repos.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION.

La boule D étant de 2 onces, & la boule F de 4 onces, on donne à celleci 6 dégrés de vîtesse, l'autre étant en repos.

EFFETS.

Après le choc, la boule D parcourt 8 espaces dans la direction de la boule F, & celle - ci continue de se mouvoir du même côté, & parcourt 2 espaces.

EXPLICATIONS.

Il faut confidérer d'abord le mou-

EXPÉRIMENTALE. 355 vement communiqué en raison des masses indépendamment du ressort; IV. & voir ensuite ce que la réaction ajoute à ce premier effet, ou ce qu'elle en diminue.

LEÇON.

Si les boules n'étoient point élastiques, F de 4 onces rencontrant D de 2 onces en repos, ne perdroit que 2 dégrés de vîtesse des 6 qu'elle a, & les deux masses s'en iroient du même côté avec un mouvement commun, dont la vîtesse seroit 4, comme nous l'avons vû ci-dessus. * Mais après le choc, il y a réaction réci- III. Exp. proque entre les deux boules à cause de leur élasticité; & cette réaction est égale à 4 dégrés de vîtesse communiquée, qui ont causé la compression. Il faut donc regarder cette réaction, comme une force qui se déploie entre les deux boules pour les repousser de part & d'autre; elle concourt avec le mouvement communiqué à la boule D, & elle l'augmente de moitié. Elle tend au contraire à détruire celui qui reste à la boule F; mais il faut faire attention que cette derniére masse est de 4 onces, double de l'autre, & que la

* I. Prép.

Ggij

réaction qui peut faire avancer deux IV. onces de 4 espaces, n'en peut faire rétrograder que 2 à un poids qui est double: ainsi la boule F malgré sa réaction, avance encore 2 graduations après le choc, en vertu de son mouvement primitif.

III. EXPERIENCE.

PREPARATION.

La boule F de 2 onces va frapper avec 6 dégrés de vîtesse, la boule D en repos qui pése 4 onces.

EFFETS.

Après le choc, la boule D parcourt 4 espaces dans la direction de la boule F, & celle-ci retourne de deux espaces en arrière.

EXPLICATIONS.

La résistance de la boule D contre la boule F, a réduit la vîtesse premiére de 6 à deux, en vertu de sa double masse; mais les deux dégrés de vîtesse qu'elle a reçus par communication, ont occasionné une réaction de même valeur; ce qui fait qu'elle par

Expériment ale. 357
court 4 espaces en avant. La même = réaction agissant sur F, qui ne pése que 2 onces, a dû produire un effet double, c'est-à-dire, qu'en vertu de son ressort, elle parcouroit 4 espaces en arrière; mais elle a gardé 2 dégrés de sa première vîtesse: cet esset se réduit donc à moitié, elle n'en parcourt que 2.

IV. Leçon.

APPLICATIONS

On a pû remarquer par les résultats des trois expériences que nous venons de rapporter en preuves de notre premiere proposition, que le mouvement de réaction double toujours celui que le corps choqué acquiert par communication. Car lorsque la boule D en vertu du mouvement primitif de F, n'auroit dû avoir que 2,3, ou 4 dégrés de vîtesse; on a vu qu'elle en avoit 4,6, ou 8.

On a dû observer encore que cette même réaction qui double le mouvement du corps choqué pour aller en avant, tend avec autant de force à repousser le corps choquant en arrière; mais que ce dernier effet diminue comme la masse augmente. Car, IV. Leçon.

358 Leçons de Physique
par exemple, lorsqu'en vertu de cette
force la boule D de 2 onces recevoit
4 dégrés de vîtesse en avant, la boule
F de 4 onces n'en recevoit que 2 en
arrière.

Ces deux observations feront comprendre la raison de plusieurs essets qu'on a tous les jours sous les yeux, & qu'on auroit peine à expliquer, si

l'on ignoroit ces principes.

Tous les Artistes qui travaillent en chambre sur des enclumaux, ou sur des tas d'acier, comme les Planeurs, Orfévres, Horlogers, &c. ne manquent pas d'amortir les coups par un rouleau de nattes, ou choses équivalentes, sur quoi ils établissent le billot qui porte l'instrument. Sans cette précaution, une grande partie de la force imprimée par le marteau, seroit transmise au plancher, & causeroir des ébranlemens préjudiciables à la charpente.

C'est par de semblables raisons, que l'on construit de briques les remparts des places sortissées: si on les faisoit de grais ou de quelqu'autre pierre dure, les coups de canon venant à frapper ces corps élastiques,

Expérimentale. 359 transmettroient leur mouvement à :

une plus grande profondeur, & cau-

feroient plus de dommage.

Les effets qui résultent de la réaction réciproque de deux corps élastiques qui sont comprimés par le choc, seroient les mêmes, si ces deux corps, abstraction faite de leur ressort, avoient pressé entre eux une troisiéme matière capable de se rétablir; comme si, par exemple, un anneau d'acier Fig. 18. étoit frappé de part & d'autre, en même tems par deux boules A & B, suspendues à des fils; cet anneau comprimé par le double choc, repousseroit en se rétablissant, les deux corps qui l'auroient choqué à des distances proportionnelles à leurs masses; c'est-à-dire, également loin, s'ils étoient égaux, ou plus loin celui des deux qui seroit le moins pefant.

On doit encore attendre la même chose d'un corps dont le ressort antérieurement tendu viendroit à se débander entre deux mobiles; comme si l'anneau d'acier dont nous venons de parler, comprimé par un fil diamétral, venoit à se détendre contre

IV. Leçon. IV. Leçon. 360 Leçons de Physique les deux corps A& B: ils seroient tous les deux repoussés en sens contraires, & à des distances qui seroient

en raison réciproque des poids.

Ces effets, qui sont des conséquences de notre premiere proposition, doivent servir à expliquer le recul des armes à feu, celui des fusées, &c. Car on doit regarder la poudre qui s'allume entre la culasse, & la balle ou le boulet, comme un ressort qui se déploie de part & d'autre; son action produit dans les deux mobiles une vîtesse qui est d'autant plus grande dans l'un des deux, que sa masse est plus petite relativement à l'autre. Ainsi comme le canon, le mousquet, &c. (fur-tout, si l'on fait attention aux obstacles qui les retiennent,) sont beaucoup plus difficiles à mouvoir que le boulet ou la balle qui fait la charge; on conçoit aisément pourquoi ce dernier mobile reçoit de la poudre enflammée une vîtesse incomparablement plus grande.

Une autre raison contribue encore à augmenter la vîtesse de la balle, c'est une certaine longueur au canon, qui donne le tems à la poudre de s'al-

lumer

EXPÉRIMENTALE. 361 lumer, & de déployer toute son action; s'il est trop court, le plomb est IV. déja sorti avant que l'explosion soit entiérement faite : c'est une des raifons pour lesquelles les pistolets ne portent jamais aussi loin que les fufils: & l'on fait le canon de ceux-ci plus long qu'à l'ordinaire, quand on les destine à tirer de fort loin. Mais cotte longueur a ses bornes, & quand on les excéde, au lieu de procurer à la balle une plus grande vîtesse, on lui fait perdre au contraire, par un frottement inutile, une partie de celle qu'elle auroit, si le canon avoit une meilleure proportion.

Quant au recul, on peut dire en général, qu'en supposant la quantité & la qualité de la poudre égale; un fusil repousse d'autant plus, que la charge de plomb fait plus de résistance, foit par fon poids, foit par la

bourre qui le retient.

Une fusée s'éléve, parce que sa partie inférieure qui s'enflamme, fait l'office d'un ressort qui agit d'une part contre le corps de la fusée, & de l'autre contre un volume d'air qui ne céde pas aussi vîte qu'il est frap-Tome I.

LEÇON.

LECON.

362 LECONS DE PHYSIQUE pé; & comme ce ressort se renouvelle continuellement, par l'inflammation successive de toutes les parties de la fusée, il en accélère le mouvement par deux raisons: 1°. parce que résidant dans le mobile même, il ajoûte toujours à sa vîtesse; 20. parce que le poids ou la résistance de ce mobile diminue à chaque inftant, par la dissipation des parties qui brûlent.

> On pourroit demander iei, pourquoi sur le tapis d'un billard, lorsqu'une bille est poussée contre une autre en repos, il n'arrive pas la même chose que dans la premiére expérience, qui paroît être le même cas? Pourquoi, les billes étant égales, celle qui choque continue-t-elle prefque toujours de se mouvoir? ne devroit-elle pas rester sans mouvement après le choc, comme il arrive à la boule F, lorsqu'elle rencontre D en repos?

Quoique ces deux cas paroissent semblables, ils différent cependant entr'eux, en ce que la boule F de notre premiére expérience n'a qu'un mouvement simple & direct, au lieu

Expérimentale. 363 que la bille qu'on lui compare en a = deux : car non-seulement son centre est porté en ligne droite, mais en même tems elle roule sur le plan, & toutes les parties de sa surface décrivent des cercles paralléles autour de fon axe. Lorsqu'elle rencontre une bille en repos, le mouvement direct de sa masse totale est arrêté, par les raisons que nous avons rapportées; mais celui de ses parties autour de l'axe commun subsiste; de sorte que dans l'instant du choc, si le plan s'évanouissoit, & qu'elle fût soutenue par ses pôles, on la verroit tourner sans avancer ni reculer; mais si ce mouvement de rotation se fait sur un plan, il faut de nécessité qu'il porte la bille en avant ; c'est une chose qui se conçoit aisément.

IV. Leçon.

II. PROPOSITION.

Si deux corps élastiques égaux ou inégaux en masse, viennent se heurter avec des vîtesses propres qui soient égales ou inégales, après le choc ils se séparent, & leur vîtesse respective est la même qu'avant le choc.

Car si ces deux corps étoient sans Hh ij IV. Leçon, ressort, ou ils s'arrêteroient réciproquement, ou l'un des deux emporteroit l'autre, comme on l'a vû par les expériences du premier article. S'ils se séparent, c'est donc uniquement en vertu de leur réaction; mais nous avons vu aussi que cette réaction est égale à la compression, qui est comme la vîtesse respective avant le choc: celle qui en résulte après le choc doit donc être semblable, & c'est ce que l'expérience consirme.

PREMIERE EXPERIENCE.

PREPARATION.

La boule D pesant 2 onces, & la boule F autant, on les fait tomber l'une contre l'autre par des arcs de 6 dégrés chacun. C'est le cas où les masses & les vîtesses propres sont égales.

EFFETS.

Après le choc, les deux boules se séparent, & remontent chacune de son côté un arc de 6 graduations ainsi les vîtesses propres sont de 6 degrés, & la vîtesse respective de 12 a comme avant le choc.

EXPLICATIONS

IV. Leçon,

Les deux boules en s'entrechoquant à forces égales, ont perdu tout leur mouvement primitif; mais la réaction égale à la force avec laquelle elles se sont comprimées, ou (ce qui est la même chose) à leur vîtesse respective, les a remises en état de remonter les 6 espaces qu'elles avoient parcourus en descendant.

II. EXPERIENCE.

PREPARATION

Il faut donner à la boule D, 4 onces de masse, & à la boule F, 2 onces, & les faire tomber l'une contre l'autre; la premiere par un arc de 4 dégrés, & la seconde par un arc de 8; c'est un des cas où il y a inégalité de masses, & de vîtesses propres, quoique la vîtesse respective soit encore 12.

EFFETS.

Les deux boules après s'être heurtées, retournent à l'endroit d'où elles Hhiij font parties avant le choc, ce qui fait voir que la vîtesse respective est la même que devant.

EXPLICATIONS.

Si les boules D & F, de cette expérience, n'avoient point de ressort, elles s'arrêteroient réciproquement, parce que leurs forces font égales; car 4 onces de masse multipliées par 4 degrés de vîtesse, donnent 16 pour la quantité du mouvement, ce qui est égal à 8 dégrés de vîtesse, multipliés par 2 onces de masse. Mais ces deux boules sont élastiques, & leur compression est l'effet d'une vîtesse respective de 12 dégrés; la réaction est donc une pareille vîtesse appliquée d'une part à une boule de 2 onces, & de l'autre à une boule de 4 onces; mais la force qui peut transporter 2 onces au 8° dégré, n'en peut faire parcourir que 4 à une masse de 4 onces, pendant le même tems. Ainsi les deux boules après le choc ont dû revenir aux endroits d'où elles étoient parties, comme l'expérience l'a représenté.

APPLICATIONS

IV. Leçon.

Ce que nous avons enseigné touchant le choc de deux corps à reffort, a lieu aussi, quoiqu'il y en ait un plus grand nombre contigus les uns aux autres, & ces effets s'éxécutent avec une promptitude admirable. Si l'on suspend, par exemple, 7 ou 8 boules d'ivoire, de manière qu'elles ayent leurs centres dans une même ligne, comme le représente la Fig. 19, & que l'on fasse tomber la premiére par un arc de cercle contre la feconde, la huitième se séparera des autres avec une vîtesse semblable à celle qu'auroit eu la feconde après le choc, si rien ne s'étoit opposé à son passage; & si l'on en fait tomber deux ensemble contre la troisiéme, les deux derniéres se sépareront des autres qui demeureront toutes en repos.

De même aussi, que l'on fasse tomber la huitième contre la septième d'une part, & de l'autre la première contre la seconde; ces deux boules choquantes, remonteront après le choc par les mêmes arcs qu'elles auront parcourus en descendant, com-

Hhiv

368 Leçons de Physique me si leur percussion avoit été immédiate.

LEÇON.

Pour expliquer ces effets, il faut fe souvenir de ce que nous avons dit à la page 311, qu'une boule à ressort dans l'instant du choc, prend une figure ovale, par laquelle non-seulement la partie choquée est rapprochée du centre, mais encore celle qui lui est diamétralement opposée. Ces deux parties se rétablissent aussitôt, & avec des vîtesses égales à celle avec laquelle s'est faite leur compression. On conçoit donc que la seconde boule frappée par la premiére, se sépare d'abord un peu de la troisiéme, & qu'ayant pris, tant par communication que par réaction, une vîtefse égale à celle du corps qui l'a heurtée, comme nous l'avons expliqué dans la premiére expérience de la première proposition; elle fait sur la boule suivante ce que la premiére a fait sur elle. La même chose se fait de la troisiéme à la quatriéme, & ainst de suite jusqu'à la derniére, qui n'étant retenue par rien, obéit à l'impulsion qu'elle reçoit, & décrit un arc qui exprime une vîtesse semblable Expérimentale. 369

à celle du premier corps choquant. Ces exemples de mouvemens com-

LECON.

muniqués par des corps élastiques & contigus, pourront nous fervir dans la fuite, pour appuyer quelques opinions, (vraisemblables d'ailleurs) touchant certains phénoménes sur l'explication desquels les Physiciens sont encore partagés. Nous nous contentons pour le présent d'établir ces principes d'expériences, que nous rappellerons, & dont nous ferons usage à mesure que l'ordre des matiéres le permettra.

COROLLAIRE

On a pû remarquer par les expériences que nous venons de rapporter, que quand les corps à ressort se choquent de manière qu'ils aillent dans la même direction, ou que l'un des deux reste en repos après le choc, la somme des mouvemens est la même après comme avant la percuffion; car immédiatement avant le choc de la premiére expérience, tout le mouvement réside dans la boule F, & sa quantité est 12, sçavoir 6 de vîtesse multiplié par 2 de masse; & après IV. Leçon.

370 LEÇONS DE PHYSIQUE le choc pareille quantité se retrouve dans la boule D qui se meut seule.

Mais si l'un des deux retourne en arrière, la quantité du mouvement se trouve plus grande après qu'avant le choc, comme il paroît par le résultat de la troisséme expérience; car avant que la boule F rencontre la boule D en repos, sa quantité de mouvement est 12: sçavoir 6 de vîtesse multipliée par 2 onces. Et après la percussion, la somme des mouvemens est 20; sçavoir dans la boule D, 16, produit de 4 onces par 4 dégrés de vîtesse, & dans la boule F, 4, produit de 2 onces par 2 de vîtesse.

Non-feulement la fomme des mouvemens est plus grande après le choc; mais celui du corps choqué excéde même en quantité celui du corps choquant, avant le contact. Car dans la boule F avant le choc, le mouvement étoit 12, & après la percussion, il est 16 dans la boule D, comme nous venons de le remarquer.

Cet excès ou cette différence de mouvement dans le corps choqué, égale précifément la quantité de celui qui rétrograde après le choc; c'est ce EXPÉRIMENTALE. 371 qu'on appercevra d'abord, si l'on fait attention que la quantité du mouvement dans la boule F qui retourne en arrière, est 4, différence de 16 à 12.

IV. Leçon.


Ainsi les masses étant connues, si l'on sçait la vîtesse de celle qui rétrograde après le choc, on peut sçavoir la quantité du mouvement de l'autre, & quelle a été la somme du mouve-


ment primitif.

Nous ne devons pas quitter cette matiére sans avertir, qu'on ne doit point estimer l'impulsion des fluides, felon les régles que nous avons établies touchant le choc des corps folides; ceux-ci ayant leurs parties liées agissent selon toute leur masse, mais il n'en est pas de même de l'action des autres: à cause de la mobilité respective de leurs parties, il n'y a que ce qui est immédiatement & directement exposé au choc qui fasse effort; le reste ne perd point sa vîtesse, & par conféquent ne contribue point à l'effort; c'est pourquoi l'eau & le vent ne communiquent pas tout d'un coup leur vîtesse actuelle à un mobile : ce n'est qu'après un certain tems, que celui-ci reçoit tout le mouvement qui

IV. Leçon. 372 Leçons de Physique, peut lui être transmis: c'est une chose dont il est aisé de se convaincre, en observant les aîses d'un moulin à vent, ou la roue d'un moulin à l'eau, quand elles commencent à se mouvoir.

Fin du premier Volume.





法在在大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

TABLE DES MATIERES

Contenues dans le premier Volume.

PRÉFACE. Page v.

DISCOURS sur les dispositions & sur les qualités qu'il faut avoir pour faire du progrès dans l'étude de la Physique expérimentale, xlv.

Explications de quelques termes de Géométrie employés dans cet Ouvrage.

XCV.

PREMIERE LEÇON.

PRELIMINAIRE. Page 1.

PREMIERE SECTION. De l'étendue & de

la divisibilité des Corps, 5.

PREMIERE EXPERIENCE, qui prouve que la Matiere est divisible en un très-grand nombre de parties. 15,

II. Exp. pour prouver la même Proposition

par des dissolutions. 19.

III. Exp. qui prouve la même chose par les odeurs. 27:

IV. Exp. qui prouve encore la divifibilité des Corps par les parties colorantes. 33.

Preuves tirées de la dustilité des Métaux, & des procédés qui sont en usage chez les Batteurs & Fileurs d'Or. 35. & suiv.

SEC. SECT. De la figure des Corps. 45.

I. Exp. qui prouve que les plus petits

374 TABLE

grains de sable sont figurés. 50.

II. Exp. qui prouve que les différens Sels sont composés de parcies diversement figu-

rées. 52.

III. Exp. par laquelle on fait voir que les plus petits Infectes différent en figures, autant & plus que les plus grands Animaux. 56

TROIS. SECT. De la solidité des Corps.

 Exp. Que les matiéres les moins compactes sont capables de résister à d'autres Corps. 68.

II. Exp. qui prouve la même chose. 74.

II. LEÇON.

De la porosité, compressibilité & élasticité des Corps.

PREMIERE SECT. De la Porofité. 81. I. Exp. qui prouve la porofité du Bois. 83. II. Exp. qui fait voir la porofité de la peau

des Animaux. 90.

III. Exp. par laquelle on fait voir que la coque des œufs est poreuse. 95.

IV. Exp. qui prouve la porofité du papier, & de plusieurs autres Matiéres, par les

encres de sympathie. 101.

Que la quantité & la figure des pores n'est pas la même en toute matière. Preuves tirées de la Gravûre à l'eau-forte, de la teinture des Marbres & des Vernis. 107. & suiv.

SECONDE SECT. De la compressibilité & de l'élassicité des Corps. 115.

DES MATIERES. 375

I. Exp. qui prouve que l'eau n'est pas sensiblement compressible. 120.

II. Exp. qui prouve la même chose. 121.

HI. Exp. par laquelle on prouve que les Corps solides les plus durs sont sensiblement compressibles. 127.

De l'élasticité ou ressort des Corps, 131.

Remarques sur les applications qu'on a faites des Corps à ressort aux Montres, aux Pendules, aux armes à seu, aux Voitures, aux Sons, &c. 131. & suiv.

Comment les Métaux acquierent du ressort; les essets de la trempe sur l'Acier. 138.

o fuiv.

Digression sur les Sens en général. 145. Et en particulier du Toucher. 152. Du Goût. 158, Et de l'Odorat. 165.

III. LEÇON.

De la mobilité des Corps.

Du Mouvement, de ses propriétés & de ses loix. 177.

PREM. SECT. de la mobilité des Corps. *ibid*.

I. Exp. pour prouver que la force d'incrtie n'est pas la même chose que la petanteur. 186.

SECONDE SECT. Du Mouvement en général, & de ses propriétés. 190.

Distinction des Forces vives & des Forces mortes. 198.

TROISIEME SECT. Des Loix du Mouvement simple. 206.

Premiere Loi du Mouvement simple. 207. ART, I. De la résistance des Milieux. 2116 TABLE

1. Exp. qui prouve que les milieux résistent en raison de leurs densités. 213.

II. Exp. qui prouve la même chose. 218.

III. Exp. par laquelle on prouve que la réfistance des milieux est proportionnelle aux volumes des Corps qui s'y meuvent. 223.

ART. II. De la résistance des Frottemens.

230.

 Exp. qui fait connoître deux fortes de Frottemens, fort différens l'un de l'autre. 240.

 Exp. qui fait voir qu'on doit tenir compte des surfaces lorsqu'on veut évaluer les Frot-

temens. 248.

III. Exp. qui prouve que les Frottemens augmentent beaucoup plus par les pressions, que par la grandeur des surfaces. 252.

Conclusion sur le Mouvement perpétuel mé-

chanique. 255.

IV. LEÇON.

Suite des Loix du Mouvement simple.

Des causes qui changent la direction du Mouvement, 259.

Seconde Loi du Mouvement simple. 260. Troisième Loi du Mouvement simple. 261.

PREMIERE SECT. Du changement de direction occasionné par la rencontre d'une matière fluide. 262.

 Exp. pour prouver que l'obliquité d'incidence est une condition nécessaire pour la réfraction, 266.

II. Exp. pour prouver qu'il y a réfraction, lorsque

DES MATIERES. lorsque les milieux sont différens, & que le Mobile passe obliquement de l'un dans l'au-

tre. 272.

III. Exp. qui fait voir que quand l'incidence du Mobile est trop oblique, la réfraction se change en reflection. 282.

SEC. SECT. Du Mouvement réfléchi. 289. I. Exp. qui fait voir qu'il n'y a point de Mou-

vement réfléchi, quand il n'y a point de ressort dans le Mobile, ou dans le plan qui est choqué. 301.

II. Exp. qui prouve que le Mouvement devient réfléchi, quand le Corps choqué, ou celui qui choque, est élastique 306.

III. Exp. pour faire voir que l'angle de réflection est égal à celui d'incidence. 312.

TROIS. SECT. De la communication du Mouvement dans le choc des Corps. 316. ART. I. Du choc des Corps non élastiques.

I. Propos. Quand un Corps en repos est choqué par un autre Corps, la vîtesse du Corps choquant se partage entre les deux selon le rapport des masses. ibid.

I. Exp. dans laquelle on emploie des masses

égales. 323.

II. Exp. dans laquelle le Corps choqué a deux fois autant de masse que le Corps choquant. 327.

III. Exp. dans laquelle le Corps choquant a deux fois autant de masse que le Corps cho-

qué. 328.

II. PROPOS. Quand deux Corps, qui se meuvent du même sens avec des vîtesses inégales, viennent à se heurter, soit que leurs masses soient égales ou non, ils continuent de se mouvoir ensemble, & dans Tome I.

leur premiere direction, avec une vitesse commune, moins grande que celle du Corps choquant, mais plus grande que celle du Corps choqué avant la percussion. 333.

1. Exp. avec des masses égales, les vîtesses étant dans le rapport de 3 à 6. 334.

II. Exp. avec des masses, l'une double de l'autre, & des vîtesses qui sont en raison réciproque des masses. 336.

III. Exp. dans laquelle l'un des deux Corps ayant une fois moins de masse que l'autre, a deux fois autant de vîtesse que lui. 338.

III. Propos. Si les deux Corps qui doivent se choquer, se meuvent en sens directement contraires, le mouvement périra dans l'un & dans l'autre, ou au moins dans l'un des deux; s'il en reste après le choc, les deux corps iront du même sens; & la quantité de leur commun mouvement sera égale à l'excès de l'un des deux avant le choc. 341.

 Exp. avec deux Corps dont les masses & les vîtesses sont égales. ibid.

II. Exp. avec deux mobiles, dont les quantités de mouvement sont dans le rapport de 12 à 24, 343.

Corollaire, ou conséquence des Propositions précédentes, 347.

ART. II. Du choc des Corps à ressort. 349.

I. PROPOS. Quand un Corps à ressort va frapper un autre Corps à ressort qui est en repos, ou qui se meut du même sens que lui, celui-ci après le choc, se meut dans la direction du Corps qui l'a frappé, & avec une vitesse composée de celle qui lui a été donnée immédiatement, ou par communication, & de celle qu'il acquiert par sa réaction après le choc; & le Corps choquant dont le

DES MATIERES. 379 ressort agit en sens contraire, perd en tout, ou en partie, ce qu'il avoit gardé de sa vitesse première: & si son mouvement resséchi excéde le restant de sa vîtesse première, il rétrograde suivant la valeur de cet excès.

I. Exp. avec deux mobiles de même masse,

& qui ont des ressorts égaux. 352.

II. Exp. avec deux Corps également élastiques, celui qui est choqué ayant une fois moins de masse que l'autre. 354.

III. Exp. avec des corps également élaftiques, celui qui choque ayant une fois

moins de masse que l'autre. 356.

II. Propos. Si deux Corps élaftiques égaux ou inégaux en maffe, viennent se heurter avec des vîtesses propres qui soient égales ou inégales; après le choc ils se separent, & leur vîtesse respective est la même qu'avant le choc. 363.

I. Exp. avec des boules d'ivoire de même poids, & qui ont des vîtesses égales. 364.


II. Exp. avec des boules d'ivoire, dont les vîtesses & les masses sont inégales. 365. Corollaires, ou conséquences des Propositions


précédentes. 369.


Fin de la Table des Matiéres.

reference of the second of the second of particular restrict of the state of the state of the The state of the s









PHYSIQUE DE NOLLET

TOM:I

WALL TANK



centimeters		-			1 'e	P. 9	ab C
90	111110			30	29.37 54.91 43.96 82.74 52.79 50.87 L* 13.06 -38.91 52.00 3.45 50.88 -27.17 a* (12.20)	-29.46	Colors by Munsell Color Services Lab
ı	111116			29	52.79	-12.72	or Ser
	1111			28	3.45	81.29	ell Col
Ų	1118			27	43.96	10.01	Muns
ı	11111			26	191 4	3 77.0	ors by
H	11/11			25 2	13.06 -38.91	49 30	Col
ı	11111				72.95 29 16.83 13.	10 -49	
١	9 111			24	5 72.9	3 68.8	
ı	211111	-	200	23	72.46	55.93	
	11111			22	31.41	-19.43	
	1114			21	3.44	0.49	2.42
				20	-0.81 -0.23 20.98 -	0.19	2.04
	11[311				28.86 16.19	0.73	0.75 0.98 1.24 1.67 2.04
	111111			16 (M) 17 18 (B) 19	28.86	09.0	1.24
ľ	11112			17	38.62	0.04	86.0
ı	11111			(W)	49.25 38.62 -0.16 -0.18	- 100	37.5
-	011111111111111111111111111111111111111	R Gos	00 000 000 000 000 000 000 000 000 000	8 ₂	90 gs 60 s	,	hread
	11111110	R Good Good Good Good Good Good Good Goo	600 600 600 600 600 600	0 ₂	004 004	1 12 100	Golden I hread
	0	Gos Good Good Good Good Good Good Good G	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	700 Paris pa	-1.07	0.19	Golden
	0	60 GO	2 60c and	14 15	-1.07	0.19	o.s. Golden 1
	0 1	60s 60s	E SOC CONTRACTOR OF SOC CONTRA	15	72.06 62.15	0.28 0.19	0.36 0.51 Golden 1
	0 0 1	ST S	60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	15	82.14 72.06 62.15 -1.06 -1.19 -1.07	0.43 0.28 0.19	0.36 0.51 Golden 1
	11111110	600 GO	000 000 000 000 000 000	15	87.34 82.14 72.06 62.15 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	0.21 0.43 0.28 0.19	o.s. Golden 1
	1111110	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600	2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	12 13 14 15	92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	0.36 0.51 Golden 1
	11111110	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600	OF COLUMN TO SERVICE OF COLUMN	11 (A) 12 13 14 15	97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	0.36 0.51 Golden 1
	1 0 0 0 0 111111	605 605 605 605 605 605 605 605 605 605	200 may 100 ma	9 10 11(A) 12 13 14 15	82.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 48.55 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	0.36 0.51 Golden 1
	1 0 0 0 0 111111	S 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	200 and 200 an	11 (A) 12 13 14 15	39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 11.81 48.55 .0.40 .0.60 .0.75 .1.06 .1.19 .1.07	46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	+ 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden 1
	7	F Gos Go		9 10 11(A) 12 13 14 15	83.51 39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 34.26 11.81 48.55 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	59.60 46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	0.36 0.51 Golden 1
	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	OC SOLUTION OF SOL	9 10 11(A) 12 13 14 15	70.82 63.51 39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.08 62.15 33.43 34.26 11.81 48.55 0.40 0.60 0.75 -1.06 -1.19 -1.07	0.35 59.60 46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	+ 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden 1
	3	600	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	9 10 11(A) 12 13 14 15	56.56 70.82 63.51 39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 9.82 -33.43 34.28 11.81 48.55 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	-24,49 -0,35 59,60 -46,07 18,51 1,13 0,23 0,21 0,43 0,28 0,19	Density - 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden 1
	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 GOV	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	9 10 11(A) 12 13 14 15	44.26 55.56 70.82 63.51 39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 13.80 9.82 -33.43 34.28 11.81 48.55 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	22.85 -24.49 -0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density - 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden 1
	3		P ON THE P O	9 10 11(A) 12 13 14 15	49.87 44.28 55.56 70.82 63.51 39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 43.4 13.80 9.82 33.43 34.28 11.81 48.55 0.40 0.40 0.75 1.06 1.19 1.107	-22.29 22.85 -24.49 -0.35 58.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density - 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden 1
	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		R	9 10 11(A) 12 13 14 15	6549 49.87 44.28 55.56 70.82 65.51 39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 62.15 1811 4.34 15.80 9.80 33.43 34.28 11.81 48.55 0.40 0.60 0.75 1.06 1.19 1.107	1872 -22.29 22.85 -24.49 -0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	Density - 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden 1
	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		F	9 10 11(A) 12 13 14 15	46.87 44.28 55.59 70.82 63.51 39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 82.15 4.34 72.06 92.0 33.43 34.28 1181 48.55 0.40 0.60 0.75 1.06 1.19 1.07	1872 -22.29 22.85 -24.49 -0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28 0.19	+ 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden 1